



DIABEATER

ක්‍රමයට දියවැඩියාව පියගන්න

DIABEATER අත්පොත

අන්තර්ගතය

දියවැඩියාව යනු කුමක්ද	02
දියවැඩියා වර්ග	03 - 05
දියවැඩියාව හඳුනාගැනීම	06
දියවැඩියාවේ අවදානම් සාධක	07
ඔබට 2 වැනි වර්ගයේ දියවැඩියාව වළක්වා ගත හැකිය	08
දියවැඩියාව පාලනය කරගැනීම	09 - 10





දියවැඩියාවට වඩා ඔබ ශක්තිමත්

Diabeater කෙනෙක් ලෙස, ඔබගේ සෞඛ්‍යය පාලනය කරගනිමින්, නැණවත් තෝරාගැනීම් කරමින්, සහ එක් පියවරක් ඉදිරියෙන් සිටිමින් දියවැඩියා අනතුර ජයගැනීමට ඔබ තීරණය කර ඇත.

Diabeater කෙනෙක් වීම සඳහා වැදගත් වන්නේ වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවශ්‍ය වන ශක්තිය, ස්ථාවරත්වය, සහ කැපවීමයි. මෙම අත්පොත මෙසේ පිරිනමා ඇත්තේ එම ගමනේදී ඔබට සහාය වීමටය. රෝගලක්ෂණ හඳුනාගැනීමේ සිට රෝග වළක්වාගැනීම සහ වලදායී කළමනාකරණය දක්වාම වැදගත් වන පරිදි, ජාත්‍යන්තර දියවැඩියා සමුළුවෙන් සහ ශ්‍රී ලංකා දියවැඩියා සංගමයෙන් සපයා ගත් මූලාශ්‍ර කරුණුවලින් එය සමන්විතය. නිවැරදි දැනුම සහ ක්‍රියාකාරීත්වය ඔස්සේ, ඔබට මෙම තත්ත්වය පාලනය කරගනිමින් විශ්වාසයෙන් යුතුව ඉදිරියට ගමන් කළ හැකිය.

එකමුතුවට එක් වන්න.

සවිමත්ව සිටින්න.

Diabeater කෙනෙක් වන්න.



දියවැඩියාව යනු කුමක්ද?

දියවැඩියාව යනු ප්‍රමාණවත් නොවන ඉන්සියුලින් නිෂ්පාදනය හෝ ඉන්සියුලින් නිසි පරිදි භාවිත කිරීමට සිරුරේ ඇති නොහැකියාව හේතුවෙන් රුධිර සීනි (ග්ලූකෝස්) මට්ටම් මනාව පාලනය කිරීමට සිරුර අසමත් වනවිට ඇති වන නිදන්ගත තත්ත්වයකි. ඉන්සියුලින් යනු ශක්තිය ලෙස උපයෝගී කරගැනීම සඳහා සෛල තුළට ඇතුළුවීමට ග්ලූකෝස්වලට සහාය වන අග්නිකාශය විසින් නිපදවනු ලබන හෝමෝනයකි. නිසි පාලනයක් නොමැති වුවහොත්, අධි රුධිර සීනි මට්ටම් මඟින් හෘදය, වකුගඩු, ස්නායු, සහ ඇස් වැනි අවයවවලට බලපෑම් වීල්ල කරන බරපතල සෞඛ්‍ය සංකූලතා ඇති විය හැකිය.

ශ්‍රී ලංකාව තුළ දියවැඩියාව

- ශ්‍රී ලාංකිකයින් 10 දෙනෙකුගෙන් 1 අයෙකුට වැඩි පිරිසක් දියවැඩියාව සමඟ ජීවත් වන අතර, සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන ජීවන රටාවන් හේතුවෙන් වීම සංඛ්‍යාව ඉහළ යමින් පවතී.
- දියවැඩියා තත්ත්වය සහිත පිරිස අතරින් ආසන්න වශයෙන් 50%ක් පමණ හඳුනාගනු නොලැබීමෙන් තදබල සංකූලතා ඇතිවීමේ අවදානම ඉහළ යයි. (මූලාශ්‍රය: ශ්‍රී ලංකා දියවැඩියා සංගමය)



දියවැඩියා වර්ග

ප්‍රධාන දියවැඩියා වර්ග තුනක් ඇත

1 වැනි වර්ගයේ දියවැඩියාව

- ප්‍රතිශක්තිකරණ පද්ධතිය වැරදීමකින් අග්නතාශයේ ඇති ඉන්සියුලින් නිෂ්පාදනය කරන සෛලවලට පහරදීම සිදු වන ස්වයංප්‍රතිශක්ති තත්ත්වයකි.
- සාමාන්‍යයෙන් කුඩා දරුවන් සහ තරුණ වැඩිහිටි පිරිස් අතර හඳුනාගැනෙයි.
- ජීවිත කාලය පුරා ඉන්සියුලින් ප්‍රතිකාරය අවශ්‍ය වේ.



2 වැනි වර්ගයේ දියවැඩියාව

- සිරුර ඉන්සියුලින් ප්‍රතිරෝධී තත්ත්වයට පත්වන හෝ ඉන්සියුලින් ප්‍රමාණවත් පරිදි නිෂ්පාදනය නොකරන වඩාත්ම සුලබ ස්වරූපය.
- බොහෝවිට, සෞඛ්‍ය සම්පන්න නොවන ආහාර පුරුදු, ස්ථුලතාව සහ කායික ක්‍රියාකාරකම් නොමැති වීම හා සම්බන්ධ වේ.
- ජීවනරටා වෙනස්කම් මඟින් වළක්වාගැනීම හෝ පමාකිරීම කළ හැකිය.

දියවැඩියා වර්ග

3 ගර්භණී දියවැඩියාව

- ගර්භණී කාලය අතරතුර වර්ධනය වන අතර සාමාන්‍යයෙන් දරු ප්‍රසූතියෙන් පසුව නැති වී යයි.
- පීචිතයේ පසු කාලයකදී 2 වැනි වර්ගයේ දියවැඩියාව වර්ධනය වීමේ අවදානම් ඉහළ නංවයි.
- නිසි පරිදි පාලනය කර නොගතහොත් මව සහ දරුවා යන දෙදෙනාටම සංකූලතා ඇති විය හැකිය.

(මූලාශ්‍රය: ජාත්‍යන්තර දියවැඩියා සමිඵ්ව)

රෝගලක්ෂණ හඳුනාගැනීම

දියවැඩියාව සාර්ථක ලෙස පාලනය කරගැනීමට කල්තියා හඳුනාගැනීම ඉතා වැදගත්ය.

පොදු රෝගලක්ෂණවලට පහත තත්ත්වයන් ඇතුළත් වේ:



නිතර මුත්‍රාතිරීම



අධික පිපාසය හා කුසගින්න



හදිසි බර අඩුවීම



පෙනීම බොඳවීම



තෙහෙට්ටුව



තුවාල සුවවීමේ මන්දගාමීත්වය



අත්පා කැසීම සහ හිරිවැටීම

ඔබට මේ රෝගලක්ෂණ කිසිවක් ඇත්නම්, දියවැඩියා තිරපරීක්ෂාවක් සඳහා වෛද්‍යවරයකු හමුවන්න.



දියවැඩියාව කඳුහා වන අවදානම් කාඩක

අවදානමට ලක්වන්නේ කවුරුන්ද?

පහත දැක්වෙන තත්ත්වයන් ඇත්නම් ඔබ ඉහළ අවදානමට ලක්විය හැකිය:

- දියවැඩියාව හා සම්බන්ධ පවුල් ඉතිහාසයක් තිබීම
- බර වැඩිවීම හෝ ස්ප්‍රූලතාව තිබීම
- එක තැන වාඩිවී සිටින ජීවනරටාවක් ගතකිරීම
- අධි රුධිර පීඩනය හෝ කොලෙස්ටරෝල් තිබීම
- ගර්භණී දියවැඩියාව හා සම්බන්ධ ඉතිහාසයක් තිබීම
- වයස අවුරුදු 40ට වැඩිවීම



ඔබට 2 වැනි වර්ගයේ දියවැඩියාව වළක්වා ගත හැකිය

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර

- පෝෂ්‍යදායී ධාන්‍ය වර්ග, පලතුරු, වළවළු, සහ මේද රහිත ප්‍රෝටීන තෝරාගන්න.
- සීනි, සැකසූ ආහාර, සහ අසංතෘප්ත මේද අමුල අඩු කරන්න.
- නිතර පලය පානය කරන අතර, සීනිමය පාන වර්ග ලබාගැනීමෙන් වළකින්න.



කායික ක්‍රියාකාරකම්

සතියකට අවම වශයෙන් විනාඩි 20ක කාලයක් සැහැල්ලු ව්‍යායාම කිරීමට ඉලක්ක කරගන්න. (උදා. ඉක්මනින් කෙටි අඩි තබමින් ඇවිදීම, බයිසිකල් පැදීම)



බර පාලනය කරගැනීම

- සිරුරේ බර 5-10%කින් අඩුකර ගැනීමෙන් දියවැඩියා අවදානම විශාල වශයෙන් අවම කරගත හැකිය.
- නිතිපතා පරීක්ෂාවන්.
- වාර්ෂික තිරපරීක්ෂා මඟින් දියවැඩියාව කල්තියා හඳුනාගනිමින් සංකූලතා වැළැක්වීමට කටයුතු කළ හැකිය.



දියවැඩියාව පාලනය කරගැනීම

1. ආහාර සහ පෝෂණය

රුධිර සීනි මට්ටම් ස්ථායීව පවත්වා ගැනීමට සමතුලිත ආහාර වේල් සැලසුමක් ඉතා වැදගත් වෙයි. පිඟන් ක්‍රමය අනුගමනය කරන්න:

- පිඟානෙන් 1/2: පිණිස රහිත චුළුවළු (කොළ වර්ග, කැරට්, තක්කාලි).
- පිඟානෙන් 1/4: මේද රහිත ප්‍රෝටීන (මාළු, කුකුල් මස්, ටෝෆු).
- පිඟානෙන් 1/4: ධාන්‍ය ඇට වර්ග (දුඹුරු සහල්, කිනුවා).



2. කායික ක්‍රියාකාරකම්

ව්‍යායාම මඟින් රුධිර සීනි අඩුකරන අතර, ඉන්සියුලින් සංවේදීතාව ඉහළ නංවයි. පඩිපෙළ නැඟීම හෝ ආහාර ගැනීමෙන් පසු ඇවිදීම වැනි කුඩා දෛනික චලන පවා වැදගත් වේ!



3. ඖෂධ සහ ඉන්සියුලින්

- 1 වැනි වර්ගයේ දියවැඩියාව සඳහා දිනපතා ඉන්සියුලින් චිත්තේ අවශ්‍ය වේ.
- ජීවන රටා වෙනස්කම් ප්‍රමාණවත් නොවන්නේ නම්, 2 වැනි වර්ගයේ දියවැඩියාව සඳහා මුඛ ඖෂධ හෝ ඉන්සියුලින් අවශ්‍ය වනු ඇත.
- ඔබේ වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් නොමැතිව ඖෂධ මග නොතර්න්න.



පාලනය කළ නොහැකි දියවැඩියාවේ සංකූලතා

හිසි පාලනයක් නොමැති වුවහොත්, දියවැඩියාව මඟින් බරපතළ සෞඛ්‍ය ගැටලු ඇති විය හැකිය:

- **හෘද රෝග** - හෘදයාබාධ සහ ආසාදන අවදානම ඉහළ නංවයි.
- **වකුගඩු හානි** - වකුගඩු ආබාධ සහ ඩයලිසිස් තත්ත්වය ඇති විය හැකිය.
- **ස්නායු හානි** - වේදනාව, හිරවැටීම, සහ ආසාදන ඇති කරයි.
- **අක්ෂි දෝෂ** - අන්ධතාවය ඇති විය හැකිය. (දියවැඩියාමය රෙටිනොපති තත්ත්වය)
- **පාද සංකූලතා** - දුර්වල රුධිර සංසරණය හේතුවෙන් පාදය කපා ඉවත්කිරීමට අවශ්‍ය තත්ත්වය ඇති වීමට ඉඩ තිබේ.

කල්තියා හඳුනාගැනීම සහ හිසි පාලනය මඟින් මෙම සංකූලතා වළක්වා ගත හැකිය!

හිනිපතා නිරපරීක්ෂාවන් සිදුකිරීමේ වැදගත්කම

හිනිපතා සෞඛ්‍ය පරීක්ෂාවන් මඟින් දියවැඩියාව කල්තියා හඳුනාගෙන සංකූලතා වළක්වා ගත හැකිය.

හිරිදේශිත පරීක්ෂාවන්:

- **නිරාහාර රුධිර සීනි පරීක්ෂාව**
- **HbA1c පරීක්ෂාව** (මාස 3ක සාමාන්‍ය රුධිර සීනි මට්ටම)
- **කොලෙස්ටරෝල් සහ රුධිර පීඩන පරීක්ෂාව**

ඔබ ඉහළ අවදානමක සිටින්නේ නම්, සෑම වසරකම පරීක්ෂාකර ගන්න!

වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න අනාගතයක් සඳහා ජීවනරටාවට වැදගත් වන ඉඟි

- **ක්‍රියාශීලීව සිටින්න** : ව්‍යායාම දිනපතා පුරුද්දක් කරගන්න.
- **කල්පනාකාරීව ආහාර ගන්න** : ආහාර ප්‍රමාණය පාලනය කරගන්නා අතරම තන්තුමය ආහාර වැඩියෙන් ගන්න.
- **ජලන තත්ත්වය පවත්වා ගන්න** : ඇති තරම් ජලය පානය කරන්න.
- **දුම්පානයෙන් මිදෙන අතරම මද්‍යසාර සීමා කරන්න** : මෙම පුරුදු දෙකෙන්ම දියවැඩියා අවදානම ඉහළ නැංවෙයි.
- **ආතතිය අඩුකර ගන්න** : භාවනා, යෝග අභ්‍යාස හෝ ගැඹුරු හුස්ම ගැනීමේ ව්‍යායාම කරන්න.



සටහේ යෙදෙන්න, නිරතුරු දිනන්න.

Diabeater කෙනෙක් වීම යනු කිසිදු පසු නොබැසීමය. එයින් අදහස් වන්නේ බිය වෙනුවට ශක්තිය, සැකය වෙනුවට දැනුම, සහ පැකිලීම වෙනුවට ක්‍රියාකාරීවීම තෝරාගැනීමය. වඩාත් සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවනරටාවක් වෙනුවෙන් ඔබ තබන සෑම පියවරක්ම ජයග්‍රහණයකි. පෙරමුණේ රැඳී සිටීමට ඔබ කරන සෑම තෝරාගැනීමකින්ම කියැවෙන්නේ ඔබ පාලනයෙන් යුතුව සිටින බවය. මෙම ගමන දියවැඩියාව පාලනය කිරීම සඳහා පමණක්ම වුවක් නොවේ. එය සටන් වැදීම, ජයගැනීම, සහ ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ජීවත්වීම සඳහා වූවකි. කැපවීමෙන් රැඳෙමින්, සවිබල ගැන්වී සිටින අතරම, දියවැඩියාවට වඩා ඔබ ශක්තිමත් බව සැමවිටම මතක තබාගන්න.



දියවැඩියාවට එරෙහි සටන ඇරැඹෙන්නේ ඔබ සමඟයි!

Diabeater ප්‍රතිඥාව ලබාගෙන, වැඩසටහනට සම්බන්ධ වන්න.

ප්‍රතිඥාව
ලබාගැනීමට
කේතය
සේකෂ් කරන්න





📍 යුනියන් ඇෂුරන්ස් පී.වීල්.සී. (PQ 12)
අංක 20, ශාන්ත මයිකල් පාර,
කොළඹ 03, ශ්‍රී ලංකාව.

☎ 1330 (24x7 ක්ෂණික ඇමතුම්)
011 2990 990

🌐 unionassurance.com
✉ info@unionassurance.com

අප හා සම්බන්ධ වන්න

