

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM  
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN  
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---

## Bài tập 2

Đề tài: Qubit, Hệ nhiều Qubit

---

Môn học: Nhập môn Tính toán lượng tử

*Sinh viên thực hiện:*

Lưu Thượng Hồng (23122006)

*Giáo viên hướng dẫn:*

ThS. Vũ Quốc Hoàng

Ngày 7 tháng 11 năm 2025



## Mục lục

<b>1</b>	<b>Bài 1</b>	<b>1</b>
1.1	(a) . . . . .	1
1.2	(b) . . . . .	2
1.3	(c) . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Bài 2</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Bài 3</b>	<b>6</b>
3.1	(a) . . . . .	6
3.2	(b) . . . . .	7
3.3	(c) . . . . .	8
3.4	(d) . . . . .	8
<b>4</b>	<b>Bài 4</b>	<b>9</b>
4.1	(a) . . . . .	9
4.2	(b) . . . . .	9
4.3	(c) . . . . .	10
<b>5</b>	<b>Bài 5</b>	<b>10</b>
5.1	(a) . . . . .	10
5.2	(b) . . . . .	10
5.3	(c) . . . . .	10
5.4	(d) . . . . .	11
<b>6</b>	<b>Bài 6</b>	<b>12</b>
6.1	(a) . . . . .	12
6.2	(b) . . . . .	12
6.3	(c) . . . . .	12
6.4	(d) . . . . .	12
6.5	(e) . . . . .	12

<b>7 Bài 7</b>	<b>12</b>
7.1 (a) . . . . .	12
7.2 (b) . . . . .	12
7.3 (c) . . . . .	13
7.4 (d) . . . . .	13
<b>8 Bài 8</b>	<b>13</b>
8.1 (a) . . . . .	14
8.2 (b) . . . . .	14
8.3 (c) . . . . .	14

## 1 Bài 1

**Đề bài:** Khảo sát phép đo theo các cơ sở  $B_Z = \{|0\rangle, |1\rangle\}$ ,  $B_X = \{|+\rangle, |-\rangle\}$ ,  $B_Y = \{|i\rangle, |-i\rangle\}$  của các trạng thái lượng tử sau.

### 1.1 (a)

**Đề bài:**  $|\psi_1\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle$ .

**Bài làm:**

**Cơ sở  $B_Z$ :**  $[|\psi_1\rangle]_{B_Z} = \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}\right)$ .

Khi đo  $|\psi_1\rangle$  theo cơ sở  $B_Z$  thì sẽ được  $|0\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{\sqrt{3}}{2}\right|^2 = \frac{3}{4}$ , được  $|1\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{1}{2}\right|^2 = \frac{1}{4}$ .

**Cơ sở  $B_X$ :** Trạng thái  $|\psi_1\rangle$  biểu diễn theo cơ sở  $B_X$  như sau:

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= \langle +|\psi_1\rangle|+\rangle + \langle -|\psi_1\rangle|-\rangle \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right)|+\rangle + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right)|-\rangle \\ &= \frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}|-\rangle \end{aligned}$$

Khi đo  $|\psi_1\rangle$  theo cơ sở  $B_X$  thì sẽ được  $|+\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{\sqrt{3}+1}{2\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{2+\sqrt{3}}{4}$ , được  $|-\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{\sqrt{3}-1}{2\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{2-\sqrt{3}}{4}$ .

**Cơ sở  $B_Y$ :** Trạng thái  $|\psi_1\rangle$  biểu diễn theo cơ sở  $B_Y$  như sau:

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= \langle i|\psi_1\rangle|i\rangle + \langle -i|\psi_1\rangle|-i\rangle \\ &= \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{-i}{\sqrt{2}}\right)|i\rangle + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{2} \cdot \frac{i}{\sqrt{2}}\right)|-i\rangle \\ &= \frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt{2}}|i\rangle + \frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{2}}|-i\rangle \end{aligned}$$

Khi đo  $|\psi_1\rangle$  theo cơ sở  $B_Y$  thì sẽ được  $|i\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{\sqrt{3}-i}{2\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$ , được  $|-i\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{\sqrt{3}+i}{2\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$ .

## 1.2 (b)

**Đề bài:**  $|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{i\frac{\pi}{6}}|1\rangle)$ .

**Bài làm:**

**Cơ sở  $B_Z$ :**  $[|\psi_2\rangle]_{B_Z} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{6}}\right)$ .

Khi đo  $|\psi_2\rangle$  theo cơ sở  $B_Z$  thì sẽ được  $|0\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{1}{2}$ , được  $|1\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{6}}\right|^2 = \frac{1}{2}$ .

**Cơ sở  $B_X$ :** Trạng thái  $|\psi_2\rangle$  biểu diễn theo cơ sở  $B_X$  như sau:

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= \langle +|\psi_2\rangle|+\rangle + \langle -|\psi_2\rangle|-\rangle \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right)|+\rangle + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{6}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right)|-\rangle \\ &= \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}\right)|+\rangle + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}\right)|-\rangle \end{aligned}$$

Khi đo  $|\psi_2\rangle$  theo cơ sở  $B_X$  thì sẽ được  $|+\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{1}{2} + \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}\right|^2 = \frac{2+\sqrt{3}}{4}$ , được  $|-\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{1}{2} - \frac{1}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}\right|^2 = \frac{2-\sqrt{3}}{4}$ .

**Cơ sở  $B_Y$ :** Trạng thái  $|\psi_2\rangle$  biểu diễn theo cơ sở  $B_Y$  như sau:

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= \langle i|\psi_2\rangle|i\rangle + \langle -i|\psi_2\rangle|-i\rangle \\ &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{6}} \cdot \frac{-i}{\sqrt{2}}\right)|i\rangle + \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{6}} \cdot \frac{i}{\sqrt{2}}\right)|-i\rangle \\ &= \left(\frac{1}{2} - \frac{i}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}\right)|i\rangle + \left(\frac{1}{2} + \frac{i}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}\right)|-i\rangle \end{aligned}$$

Khi đo  $|\psi_2\rangle$  theo cơ sở  $B_Y$  thì sẽ được  $|i\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{1}{2} - \frac{i}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}\right|^2 = \frac{3}{4}$ , được  $|-i\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{1}{2} + \frac{i}{2}e^{i\frac{\pi}{6}}\right|^2 = \frac{1}{4}$ .

## 1.3 (c)

**Đề bài:**  $|\psi_3\rangle = \frac{2}{3}|0\rangle + \frac{1-2i}{3}|1\rangle$ .

**Bài làm:**

**Cơ sở  $B_Z$ :**  $[|\psi_3\rangle]_{B_Z} = \left(\frac{2}{3}, \frac{1-2i}{3}\right)$ .

Khi đo  $|\psi_3\rangle$  theo cơ sở  $B_Z$  thì sẽ được  $|0\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{2}{3}\right|^2 = \frac{4}{9}$ , được  $|1\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{1-2i}{3}\right|^2 = \frac{5}{9}$ .

**Cơ sở  $B_X$ :** Trạng thái  $|\psi_3\rangle$  biểu diễn theo cơ sở  $B_X$  như sau:

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \langle +|\psi_3\rangle|+\rangle + \langle -|\psi_3\rangle|-\rangle \\ &= \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1-2i}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right)|+\rangle + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1-2i}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}\right)|-\rangle \\ &= \left(\frac{3-2i}{3\sqrt{2}}\right)|+\rangle + \left(\frac{1+2i}{3\sqrt{2}}\right)|-\rangle \end{aligned}$$

Khi đo  $|\psi_3\rangle$  theo cơ sở  $B_X$  thì sẽ được  $|+\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{3-2i}{3\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{13}{18}$ , được  $|-\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{1+2i}{3\sqrt{2}}\right|^2 = \frac{5}{18}$ .

**Cơ sở  $B_Y$ :** Trạng thái  $|\psi_3\rangle$  biểu diễn theo cơ sở  $B_Y$  như sau:

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= \langle i|\psi_3\rangle|i\rangle + \langle -i|\psi_3\rangle|-i\rangle \\ &= \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1-2i}{3} \cdot \frac{-i}{\sqrt{2}}\right)|i\rangle + \left(\frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1-2i}{3} \cdot \frac{i}{\sqrt{2}}\right)|-i\rangle \\ &= \left(-\frac{\sqrt{2}}{6}i\right)|i\rangle + \left(\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{\sqrt{2}}{6}i\right)|-i\rangle \end{aligned}$$

Khi đo  $|\psi_3\rangle$  theo cơ sở  $B_Y$  thì sẽ được  $|i\rangle$  với xác suất là  $\left|-\frac{\sqrt{2}}{6}i\right|^2 = \frac{1}{18}$ , được  $|-i\rangle$  với xác suất là  $\left|\frac{2\sqrt{2}}{3} + \frac{\sqrt{2}}{6}i\right|^2 = \frac{17}{18}$ .

## 2 Bài 2


**Đề bài:** Viết dạng Bloch và mô tả trên mặt cầu Bloch các trạng thái lượng tử ở Câu 1.

**Bài làm:**

**Trạng thái  $|\psi_1\rangle$ :**

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= \frac{\sqrt{3}}{2}|0\rangle + \frac{1}{2}|1\rangle = \cos \frac{\pi}{6}|0\rangle + e^{i0} \sin \frac{\pi}{6}|1\rangle \\ \implies \theta &= \frac{\pi}{3}, \phi = 0 \end{aligned}$$

Hình vẽ:




Hình 1: Trạng thái  $|\psi_1\rangle$  trên mặt cầu Bloch

**Trạng thái  $|\psi_2\rangle$ :**

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} e^{i\frac{\pi}{6}} |1\rangle = \cos \frac{\pi}{4} |0\rangle + e^{i\frac{\pi}{6}} \sin \frac{\pi}{4} |1\rangle$$

$$\implies \theta = \frac{\pi}{2}, \phi = \frac{\pi}{6}$$

Hình vẽ:




Hình 2: Trạng thái  $|\psi_2\rangle$  trên mặt cầu Bloch

**Trạng thái  $|\psi_3\rangle$ :**

$$\begin{aligned}
 |\psi_3\rangle &= \frac{2}{3} |0\rangle + \frac{1-2i}{3} |1\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \\
 \Rightarrow &\begin{cases} \cos \frac{\theta}{2} = \frac{2}{3} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} = \frac{1-2i}{3} \end{cases} \\
 \Rightarrow &\begin{cases} \cos \frac{\theta}{2} = \frac{2}{3} \\ e^{i\phi} = \frac{\frac{1-2i}{3}}{\sqrt{1-\cos^2 \frac{\theta}{2}}} = \frac{\frac{1-2i}{3}}{\sqrt{1-(\frac{2}{3})^2}} = \frac{\frac{1-2i}{3}}{\sqrt{\frac{5}{9}}} = \frac{1-2i}{\sqrt{5}} \end{cases} \\
 \Rightarrow &\begin{cases} \theta = 2 \arccos \frac{2}{3} \approx 0.841 \\ \phi = \arg \frac{1-2i}{\sqrt{5}} = \arctan(-2) \approx -1.107 \end{cases}
 \end{aligned}$$

Hình vẽ:





Hình 3: Trạng thái  $|\psi_3\rangle$  trên mặt cầu Bloch

### 3 Bài 3

**Đề bài:** Cho  $U$  là một toán tử tuyến tính trên  $\mathbb{C}^2$ , biết  $U|0\rangle = \frac{\sqrt{2}-i}{2}|0\rangle - \frac{1}{2}|1\rangle$ ,  $U|1\rangle = \frac{1}{2}|0\rangle + \frac{\sqrt{2}+i}{2}|1\rangle$ .

Ma trận biểu diễn của  $U$  theo cơ sở tính toán là:

$$U = \begin{bmatrix} U|0\rangle & U|1\rangle \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i & 1 \\ -1 & \sqrt{2}+i \end{bmatrix}$$

#### 3.1 (a)

**Đề bài:** Chứng minh  $U$  là một cổng lượng tử.

**Bài làm:** Vì  $U$  là toán tử tuyến tính trên  $\mathbb{C}^2$  nên đã thỏa điều kiện:

$$U(\alpha|\phi\rangle + \beta|\psi\rangle) = \alpha U|\phi\rangle + \beta U|\psi\rangle, \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \forall |\phi\rangle, |\psi\rangle \in \mathbb{C}^2$$

Ta cần chứng minh:

$$\begin{aligned} \|U|\phi\rangle\| &= \|\phi\|, \quad \forall |\phi\rangle \in \mathbb{C}^2 \\ \implies U &\text{bảo toàn chuẩn, hay } U \text{ là ma trận unita} \\ \implies U^\dagger U &= I \end{aligned}$$

Ta có:

$$\begin{aligned} U^\dagger &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2}+i & -1 \\ 1 & \sqrt{2}-i \end{bmatrix} \\ \implies U^\dagger U &= \frac{1}{4} \begin{bmatrix} \sqrt{2}+i & -1 \\ 1 & \sqrt{2}-i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i & 1 \\ -1 & \sqrt{2}+i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I \end{aligned}$$

Vậy  $U$  là ma trận unita, tức là  $U$  là một cổng lượng tử.

### 3.2 (b)

**Đề bài:** Cho biết kết quả biến đổi  $U$  trên các trạng thái  $|+\rangle, |-\rangle, |i\rangle, |-i\rangle$ .

**Bài làm:** Ta có:

$$\begin{aligned} U|+\rangle &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i & 1 \\ -1 & \sqrt{2}+i \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i+1 \\ \sqrt{2}+i-1 \end{bmatrix} \\ U|-\rangle &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i & 1 \\ -1 & \sqrt{2}+i \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i-1 \\ -\sqrt{2}-i-1 \end{bmatrix} \\ U|i\rangle &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i & 1 \\ -1 & \sqrt{2}+i \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sqrt{2} \\ -2+i\sqrt{2} \end{bmatrix} \\ U|-i\rangle &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i & 1 \\ -1 & \sqrt{2}+i \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-2i \\ -i\sqrt{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

### 3.3 (c)

**Đề bài:** Cho biết kết quả biến đổi  $U$  trên các trạng thái của Câu 1.

**Bài làm:** Ta có:

$$\begin{aligned} U|\psi_1\rangle &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i & 1 \\ -1 & \sqrt{2}+i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{bmatrix} = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1+\sqrt{6}-i\sqrt{3} \\ -\sqrt{3}+\sqrt{2}+i \end{bmatrix} \\ U|\psi_2\rangle &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i & 1 \\ -1 & \sqrt{2}+i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}}e^{i\frac{\pi}{6}} \end{bmatrix} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i+e^{i\frac{\pi}{6}} \\ -1+(\sqrt{2}+i)e^{i\frac{\pi}{6}} \end{bmatrix} \\ U|\psi_3\rangle &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i & 1 \\ -1 & \sqrt{2}+i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1-2i}{3} \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 1+2\sqrt{2}-4i \\ \sqrt{2}+(1-2\sqrt{2})i \end{bmatrix} \end{aligned}$$

### 3.4 (d)

**Đề bài:**  $U$  tương ứng với phép quay quanh trục nào với góc bao nhiêu trên mặt cầu Bloch?

**Bài làm:**

Vì  $U$  unita nên luôn tìm được 2 vector riêng  $|u_1\rangle, |u_2\rangle$  lập thành một cơ sở trực chuẩn với các trị riêng tương ứng là  $e^{i\theta_1}, e^{i\theta_2}$ , khi đó:

$$U|u_1\rangle = e^{i\theta_1}|u_1\rangle \equiv |u_1\rangle, \quad U|u_2\rangle = e^{i\theta_2}|u_2\rangle \equiv |u_2\rangle$$

Ta cần tìm 2 trị riêng và vector riêng của  $U$ .

Ta có ma trận đặc trưng:

$$\begin{aligned} U - \lambda I &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \sqrt{2}-i-2\lambda & 1 \\ -1 & \sqrt{2}+i-2\lambda \end{bmatrix} \\ \det(U - \lambda I) &= \frac{1}{4}[(\sqrt{2}-i-2\lambda)(\sqrt{2}+i-2\lambda)+1] \\ &= \frac{1}{4}[4\lambda^2 - 4\sqrt{2}\lambda + 4] = 0 \\ &\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = \frac{\sqrt{2}+\sqrt{2}i}{2} = e^{i\frac{\pi}{4}} \\ \lambda_2 = \frac{\sqrt{2}-\sqrt{2}i}{2} = e^{-i\frac{\pi}{4}} \end{cases} \end{aligned}$$

Tìm vector riêng tương ứng với trị riêng:

$$\text{Với } \lambda_1 : (U - \lambda_1 I) |u_1\rangle = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -i(1 + \sqrt{2}) & 1 \\ -1 & i(1 - \sqrt{2}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -i(1 + \sqrt{2})a + b = 0 \\ -a + i(1 - \sqrt{2})b = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = i(1 + \sqrt{2}) \end{cases} \Rightarrow |u_1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ i(1 + \sqrt{2}) \end{bmatrix}$$

$$\text{Với } \lambda_2 : (U - \lambda_2 I) |u_2\rangle = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -i(1 - \sqrt{2}) & 1 \\ -1 & i(1 + \sqrt{2}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} -i(1 - \sqrt{2})c + d = 0 \\ -c + i(1 + \sqrt{2})d = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = 1 \\ d = i(1 - \sqrt{2}) \end{cases} \Rightarrow |u_2\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ i(1 - \sqrt{2}) \end{bmatrix}$$

Vậy  $U$  tương ứng với phép quay quanh trục tạo bởi  $|u_1\rangle, |u_2\rangle$  với góc  $\theta$  trên mặt cầu Bloch, trong đó:

$$\theta = \theta_2 - \theta_1 = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}$$

## 4 Bài 4

**Đề bài:** Từ trạng thái đầu vào  $|0\rangle$ ,

### 4.1 (a)

**Đề bài:** Vẽ mạch mô tả tính toán HYTHX. **Bài làm:**

### 4.2 (b)

**Đề bài:** Tính đầu ra của Câu (a). **Bài làm:**

### 4.3 (c)

**Đề bài:** Thêm phép đo  $\sigma$  cuối mạch của Câu (a) và tính xác suất được 1. **Bài làm:**

## 5 Bài 5

**Đề bài:** Cho biết các trạng thái sau là tách được hay vướng, nếu tách được thì biểu diễn trên mặt cầu Bloch.

### 5.1 (a)

**Đề bài:**  $\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$ . **Bài làm:**

### 5.2 (b)

**Đề bài:**  $\frac{1}{\sqrt{2}}(|10\rangle + i|11\rangle)$ . **Bài làm:**

(Lời giải được lấy từ Bài 7(c) trong file `bailam.tex`)

$$\begin{aligned} |\phi_3\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}} (|10\rangle + i|11\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [|1\rangle \otimes (|0\rangle + i|1\rangle)] \\ &= |1\rangle \otimes \left( \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}}|1\rangle \right) \\ &= |1\rangle \otimes |i\rangle \end{aligned}$$

Vậy  $|\phi_3\rangle$  tách được.

### 5.3 (c)

**Đề bài:**  $\frac{1}{4}(3|00\rangle - \sqrt{3}|01\rangle + \sqrt{3}|10\rangle - |11\rangle)$ . **Bài làm:**

## 5.4 (d)

**Đề bài:**  $\frac{1}{\sqrt{3}}|0\rangle|+\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1\rangle|-\rangle$ . **Bài làm:**

(Lời giải được lấy từ Bài 7(d) trong file `bailam.tex`)

$$\begin{aligned} |\phi_4\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}}|0+\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}}|1-\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} + \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Giả sử  $|\phi_4\rangle$  tách được, tức là tồn tại  $|\psi_1\rangle = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$  và  $|\psi_2\rangle = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$  sao cho  $|\phi_4\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle$

Ta có:

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle &= \begin{bmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{bmatrix} \\ |\phi_4\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_2\rangle &\implies \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Từ đó ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} ac = \frac{1}{\sqrt{6}} \\ ad = \frac{1}{\sqrt{6}} \\ bc = \frac{1}{\sqrt{3}} \\ bd = -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{cases} \implies \begin{cases} \frac{ac}{ad} = \frac{c}{d} = 1 \\ \frac{bc}{bd} = \frac{c}{d} = -1 \end{cases} \quad (\text{Mâu thuẫn})$$

Vậy  $|\phi_4\rangle$  không tách được.

## 6 Bài 6

**Đề bài:** Cho hệ 2 qubit với trạng thái  $|\psi\rangle = \frac{1}{2}|00\rangle - \frac{i}{2}|10\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$ . Khảo sát các phép đo sau.

### 6.1 (a)

**Đề bài:** Đo đồng thời 2 qubit. **Bài làm:**

### 6.2 (b)

**Đề bài:** Đo qubit 0. **Bài làm:**

### 6.3 (c)

**Đề bài:** Đo qubit 1. **Bài làm:**

### 6.4 (d)

**Đề bài:** Đo qubit 0 rồi đo qubit 1 và so kết quả với Câu (a). **Bài làm:**

### 6.5 (e)

**Đề bài:** Đo qubit 1 rồi đo qubit 0 và so kết quả với Câu (a). **Bài làm:**

## 7 Bài 7

**Đề bài:** Khảo sát phép toán 2 qubit  $U = H \otimes X$ .

### 7.1 (a)

**Đề bài:** Cho biết tác động của  $U$  lên các vector của cơ sở tính toán. **Bài làm:**

### 7.2 (b)

**Đề bài:** Xác định ma trận biểu diễn của  $U$  từ Câu (a). **Bài làm:**

### 7.3 (c)

**Đề bài:** Xác định ma trận biểu diễn của U bằng phép tích tensor. **Bài làm:**

(Lời giải được lấy từ phần đầu Bài 8(a) trong file `bailam.tex`)

$$\begin{aligned}
 H &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\
 \Rightarrow H \otimes X &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & 1 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \\ 1 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} & -1 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

### 7.4 (d)

**Đề bài:** Cho biết tác động của U lên trạng thái  $|\psi\rangle = \frac{1}{4}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|10\rangle + \frac{\sqrt{3}}{4}|11\rangle$ . **Bài làm:**

(Lời giải được lấy từ phần sau Bài 8(a) trong file `bailam.tex`, sử dụng trạng thái  $|\phi\rangle$  giống hệt  $|\psi\rangle$  trong đề)

$$(H \otimes X)|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{1}{2} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{\sqrt{3}}{4} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{4} \\ \frac{1}{4} + \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{4} \\ \frac{1}{4} - \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

## 8 Bài 8

**Đề bài:** Xét trạng thái 3 qubit  $|GHZ\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|000\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|111\rangle$ .



### 8.1 (a)

**Đề bài:** Chứng minh  $|GHZ\rangle$  là trạng thái vướng. **Bài làm:**

### 8.2 (b)

**Đề bài:** Khảo sát phép đo riêng qubit 0, qubit 1, qubit 2 và nhận xét. **Bài làm:**

### 8.3 (c)

**Đề bài:** Thiết kế mạch 3 qubit để tạo trạng thái  $|GHZ\rangle$ . **Bài làm:**