

Evaluación estadística

Ivonne Yáñez Mendoza

Módulo: Estadística

Profesor: Conrado Manuel García

Master big data & business analytics, Universidad Complutense de Madrid

31 de mayo de 2022

Resumen

Este estudio estadístico ha sido realizado para observar medidas de anchura de cráneo segun el periodo historico observado, los cuales son predinástico temprano y predinástico tardío.

La finalidad de este estudio es poder responder en forma estadística a la pregunta planteada de si existen diferencias en la longitud de anchura de los cráneos egipcios según el paso del tiempo.

Ejercicio 1

Para resolver este ejercicio se han creado dos dataframes a partir del libro excel que contiene los datos tanto para el grupo predinástico temprano como el predinástico tardío.

Con estos datos por separado se han analizado cada uno de estos dos periodos históricos, generando las respectivas mediciones y gráficos pertinentes.

Ejercicio 1.a

Se deben obtener con R las diferentes medidas de centralización y dispersión, asimetría y curtosis además de obtener el gráfico de caja y bigotes para cada submuestra.

Apartado periodo predinástico temprano

Medidas de centralización, dispersión, asimetría y curtosis para el periodo predinástico temprano o grupo 1.


Table 1: Anchura de craneo periodo predinastico temprano

Epoca	N	Media	Mediana	Moda	Rango	Desviacion	Pearson	Fisher	Curtosis
1	30	131.5	131.5	131	4	0.82	0.0062	0.624	1.0222
1	30	131.5	131.5	132	4	0.82	0.0062	0.624	1.0222


Table 2: Cuartiles periodo predinástico temprano

Epoca	N	0%	25%	50%	75%	100%
1	30	130	131	131.5	132	134

Boxplot predinastico temprano



Histograma predinastico temprano



Observaciones periodo predinástico temprano

1. Para el periodo histórico 1 con 30 casos observados, el promedio de la anchura de cráneos es de 131.5 mm, siendo su mediana del mismo valor.
2. En el caso de la moda los valores mas repetidos son 131mm y 132mm.
3. En el caso de la desviación estándar el valor de 0.82 indica
4. El coeficiente de variación de Pearson al ser su valor de 0.0062 indica que los datos suelen ser homogéneos.
5. En el caso del coeficiente de asimetría de Fisher, el valor es de 0.624 lo que indica que la distribución es asimétrica hacia la izquierda, siendo observado en el apartado del histograma, de forma gráfica.
6. Curtosis: La medición de la curtosis arroja como resultado 1.022 y siendo este valor inferior a 3 se considera como distribución de tipo leptocúrtica.
7. Cuartiles: Al analizar tanto la tabla de cuartiles como el gráfico de caja y bigotes se observa que los datos están agrupados entre el cuartil 0 y 50, siendo el cuartil 50 donde se posiciona la mediana de 131.5mm.

Apartado periodo predinástico tardío


Medidas de centralización, dispersión, asimetría y curtosis para el periodo predinástico tardío o grupo 2.

Table 3: Anchura de cráneo periodo predinástico tardío

Epoca	N	Media	Mediana	Moda	Rango	Desviacion	Pearson	Fisher	Curtosis
2	30	132.5	133	133	4	1.01	0.0076	0.185	-0.3707

Table 4: Cuartiles periodo predinástico tardío

N	Casos	0%	25%	50%	75%	100%
2	30	131	132	133	133	135



Observaciones apartado predinástico tardío

1. Para el periodo histórico 2 con 30 casos observados, el promedio de la anchura de craneos es de 132.5 y el valor de la mediana es de 133 mm.
2. En el caso de la moda la anchura de craneo que mas se repite es de 133 mm.
3. En el caso de la desviación estándar el valor de 0.82 indica


4. El coeficiente de variación de Pearson indica al ser su valor de 0.0076 que los datos suelen ser homogéneos.
5. En el caso del coeficiente de asimetría de Fisher, el valor es de 0.185 lo que indica que la distribución es asimétrica hacia la izquierda. En el apartado de histograma, esto se puede constatar de forma gráfica.
6. Curtosis: La medición de la curtosis arroja como resultado -0.3707 y se considera esto como distribución de tipo **platicúrtica**.
7. Cuartiles: Al analizar tanto la tabla de cuartiles como el gráfico de caja y bigotes se observa que los datos están agrupados entre el cuartil 0 y 50, siendo el cuartil 50 donde se posiciona la mediana de 133 mm.


Ejercicio 1.b

Estudio preliminar de la normalidad

Determinar si cada una de las dos submuestras sigue una distribución normal utilizando el test de Kolmogorov-Smirnov.

En primer lugar se han creado dos gráficos uno de tipo histograma y el otro de tipo *Quantile-Quantile plot* o qqplot para observar si se evidencia distribución normal, o no, de los datos procesados.





Los gráficos contrastados indican que las muestras no seguirían una distribución normal y para comprobar esto se contrastan los datos con una prueba estadística que asegure fiabilidad.

Pruebas para comprobar si los datos siguen una distribución normal

En un principio se ha aplicado la prueba de **Kolmogorov-Smirnov** para distribución normal tal y como lo indica el enunciado de este ejercicio, arrojando los siguientes resultados:

1. Periodo predinástico temprano:

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

```
data: pre_temprano$Anchura.del.cráneo
D = 0.24246, p-value = 0.05877
alternative hypothesis: two-sided
```

Siendo **P-value(0.05877) > (0.05)**: No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no se puede rechazar que la muestra siga una distribución normal.

1. Periodo predinástico tardío:

One-sample Kolmogorov-Smirnov test

```
data: pre_tardio$Anchura.del.cráneo
D = 0.23496, p-value = 0.07285
alternative hypothesis: two-sided
```

Siendo **P-value(0.07285) > (0.05)**: No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis

nula. Por lo tanto, no se puede rechazar que la muestra siga una distribución normal.

El problema con esta prueba es la cantidad relativamente pequeña de datos además de una alerta en R que habla de empate en la muestra.

Conociendo entonces los problemas asociados a la prueba de Kolmogorov-Smirnov para este ejercicio en particular y entendiendo que las muestras de este estudio son pequeñas (30 casos por submuestra) se ha decidido utilizar el test de **Shapiro-Wilk** para normalidad, obteniendo los siguientes resultados:

1. Periodo predinástico temprano

Shapiro-Wilk normality test

```
data: pre_temprano$Anchura.del.cráneo  
W = 0.83781, p-value = 0.0003481
```

Siendo **P-value(0.0003481) < (0.05)**: Existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto la muestra para el periodo predinástico temprano **no sigue una distribución normal**.

2. Periodo predinástico tardío

Shapiro-Wilk normality test

```
data: pre_tardio$Anchura.del.cráneo  
W = 0.8832, p-value = 0.003341
```

Siendo **P-value(0.0003341) < (0.05)**: Existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto la muestra para el periodo predinástico tardío **no sigue una distribución normal**.

Ejercicio 2

Ejercicio 2.a Intervalos de confianza e interpretacion de resultados

Se necesita obtener un intervalo de confianza (0.9, 0.95 y 0.99) para la diferencia de medias de la anchura de la cabeza en ambos periodos historicos.

Two Sample t-test

```
data: pre_temprano$Anchura.del.cráneo and pre_tardio$Anchura.del.cráneo
t = -3.9354, df = 58, p-value = 0.0002248
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
90 percent confidence interval:
 -1.3297600 -0.5369067
sample estimates:
mean of x mean of y
 131.5333  132.4667
```

Two Sample t-test

```
data: pre_temprano$Anchura.del.cráneo and pre_tardio$Anchura.del.cráneo
t = -3.9354, df = 58, p-value = 0.0002248
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -1.4080621 -0.4586046
sample estimates:
mean of x mean of y
 131.5333  132.4667
```

Two Sample t-test

```
data: pre_temprano$Anchura.del.cráneo and pre_tardio$Anchura.del.cráneo
t = -3.9354, df = 58, p-value = 0.0002248
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
99 percent confidence interval:
 -1.5649604 -0.3017063
sample estimates:
mean of x mean of y
 131.5333  132.4667
```

Se obtienen los intervalos de confianza con la funcion t.test especificando los intervalos requeridos.

En base a la informacion entregada con la aplicación de la funcion se concluye lo siguiente:

- Con cada uno de los intervalos de confianza calculados, el p value para los tres grupos entrega el mismo valor, esto se debe al tamaño de la muestra que es pequeña.
- Dado lo anterior y con un intervalo de confianza de 90%, 95% y 99% se evidencia

que si existe diferencia entre las medias de la anchura del cráneo en ambos periodos historicos. Siendo la media de anchura mayor en el periodo predinástico tardio al periodo predinástico temprano.


Ejercicio 2.b

Aplicacion del test-t para contrastar la igualdad de medias

Siguiendo los apuntes vistos en la asignatura, para poder aplicar un t-test en muestras independientes se deben dar ciertas condiciones para la fiabilidad de la prueba.

Condiciones t-test:

1. Independencia de los datos: Para este analisis en particular se asume que ambas muestras son independientes.
2. Normalidad: Los datos deben seguir una distribucion normal, pero en este caso y en base a las pruebas aplicadas con el test de Shapiro-Wilk, los datos tanto en el periodo temprano como en el tardio **no** siguen una distribucion normal.
3. Variazas iguales: La ultima condicion a cumplir es que los grupos independientes deben tener varianzas iguales. Para ver si esta condicion se cumple, en primer lugar, se crea un grafico de caja y bigote para constatar de forma visual la igualdad. Observando el grafico se deduce que las varianzas podrían ser iguales, pero al igual que en las pruebas anteriores además de gráficos, es preciso aplicar una prueba estadistica para afirmar o rechazar tal afirmacion, para esto se aplica el Levene Test siendo este test el mas adecuado al no tener las submuestras una distribucion normal (vistas con el test de Shapiro-Wilk)



Aplicado el levene test, se observan los siguientes resultados:

```
Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
      Df F value Pr(>F)
group  1  0.6195 0.4344
      58
```

Siendo **P-value(0.4344) > (0.05)**: No hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no se puede rechazar que las varianzas de ambas muestras son iguales. Es entonces que al no poder rechazar la hipótesis nula se asume que las varianzas son iguales para efectos del t-test.

Notas sobre la aplicacion de la prueba

A pesar de que no se cumplen completamente las condiciones para aplicar el t-test en el enunciado de este ejercicio de evaluación se pide aplicar de todas formas el test y comentar conclusiones.

Siendo la condición de normalidad la que no se cumple (siguiendo los resultados de Shapiro-Wilk) una alternativa para comprobar si las media de las muestras son iguales, es utilizar una prueba de inferencia no paramétrica donde no se asume la normalidad, como es el Test de Wilcoxon Mann Whitney.

Expuesto lo anterior se aplica el t-test:

Two Sample t-test

```
data: pre_temprano$Anchura.del.cráneo and pre_tardio$Anchura.del.cráneo
t = -3.9354, df = 58, p-value = 0.0002248
alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -1.4080621 -0.4586046
sample estimates:
mean of x mean of y
 131.5333  132.4667
```

Siendo **P-value(0.0002248) < (0.05)**: Existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto las muestras evidencian diferencias entre la media del ancho de los craneos para ambos periodos, siendo en el periodo predinástico tardío donde se evidencia mayor anchura.