

GUIA PARA EL

ENTREVISTADOR

PARA USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL DE SALUD

ESTE MATERIAL REALIZADO POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL INSTITUTO
DE HEMOTERAPIA DE LA PROV. DE BS. AS. "DRA. NORA ETCHENIQUE"
**REFUERZA CONCEPTOS DE LA ENTREVISTA PRE-DONACIÓN Y UNIFICA
LOS CRITERIOS DE DIFERIMIENTO.**



DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL
INSTITUTO DE HEMOTERAPIA
de la Provincia de Buenos Aires
"DRA. NORA ETCHENIQUE"

MINISTERIO DE
SALUD



GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE
**BUENOS
AIRES**

» INTRODUCCIÓN

Este material es una guía orientativa para quienes entrevisten al donante de sangre.

Va acompañado de un anexo con los códigos de diferimiento y otro de los medicamentos y vacunas a tener en cuenta.

Debemos utilizar un lenguaje claro y conciso; dar lugar para preguntas, consultas y dudas que tengan los donantes.

Objetivos:

A. Tiene la finalidad de guiar al entrevistador para no omitir datos de relevancia para detectar posibles motivos que no hagan al donante apto para dicha acción

B. Informar sobre aspectos técnicos vinculados a la donación de sangre. Concientizar sobre la necesidad de comprometerse con la donación de sangre.

C. Fomentar la donación de sangre voluntaria y habitual para fortalecer la red social.

D. Incorporar hábitos saludables vinculados a la donación de sangre.

Como todo actor en la cadena de la Hemodonación, el entrevistador deberá también aprovechar el momento de intimidad con el probable donante de:

1. Concientizar: dar a conocer que la sangre es un recurso insustituible para el tratamiento de muchas personas. No se puede fabricar y solo se obtiene de aquellas y aquellos que estén dispuestos a donarla. Necesitamos transformar la donación de sangre hacia una práctica habitual que nos permitirá disponer de sangre segura y de calidad.

2. Convocar: invitar, reunir a una población para que se acerque a donar en forma repetida y habitual.

3. Fidelizar: conseguir donantes con un compromiso duradero a lo largo del tiempo.



» SOBRE LA ENTREVISTA PRE-DONACIÓN:

1. La Hemodonación es un proceso de Responsabilidad Médica, si no hay un médico a cargo de esa posta el responsable es el Director Médico de la Institución.

2. El día de la donación, personal capacitado y conocedor de estas Normas, evaluará los antecedentes y el estado actual del donante, para determinar si se encuentra apto para realizar la extracción.

3. El donante deberá tener aspecto saludable y manifestar sentirse bien. Si demostrara signos de enfermedad, malnutrición, alcoholismo, adicciones, excitación o cansancio, no podrá ser aceptado como donante en ese momento.

4. En todo momento, pese a existir normas generales, se evalúa el riesgo individual. Es por ello que prevalece el Principio de Precaución, siempre en favor del futuro paciente (receptor de la sangre o sus hemocomponentes).

5. La entrevista pre-donación debe siempre ser individual, personalizada y confidencial. Todas sus preguntas están destinadas a proteger tanto al donante como al potencial receptor. El entrevistador deberá investigar sobre enfermedades recientes y/o pasadas y la recuperación y/o tratamiento instituido.

6. Se deberá mantener un registro de los donantes diferidos por no satisfacer cualquiera de los requisitos establecidos para donar sangre, de forma tal que la información esté accesible al personal encargado de la calificación y admisión.

7. A cada donante se le deberá explicar en términos sencillos las características del proceso de donación de sangre. Se le deberá dar información respecto a:

a. Condiciones previas a la donación, indicaciones y potenciales

situaciones post donación.

b. Reacciones adversas a la donación (RAD).

c. Existencia y significado del periodo ventana de una infección, llamado también pre-serológico o seronegativo. (Se documentará que el donante ha recibido esa información).

d. Enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión y la posible citación ante resultados dudosos o reactivos a fin de cumplimentar exámenes de laboratorio.

e. La responsabilidad que le cabe al ocultar o falsear cualquier información que se le solicite.

f. Se le debería ofrecer la posibilidad de consulta telefónica post donación.

g. Se ha de garantizar que toda la información relacionada con los donantes y receptores será recogida, tratada y custodiada en la más estricta confidencialidad. En ningún caso podrán facilitarse ni divulgarse informaciones que permitan la identificación del donante ni del receptor. Se deberá otorgar al donante la oportunidad de efectuar consultas sobre el procedimiento y de denejar su consentimiento. (Ley Nacional 26529)

h. El donante deberá dejar constancia escrita, validada por su firma, de haber comprendido dicha información, de que se le ha dado la oportunidad de efectuar consultas y de que ha provisto información segura de acuerdo a su leal saber y entender. (Ley Nacional 26529).

i. Se le informará al donante del derecho que le asiste a revocar el consentimiento oportunamente otorgado, en cualquier momento del proceso de la donación.

j. El donante debe tener la oportunidad de hacer preguntas y de negarse o abstenerse de donar. El consentimiento informado, deberá ser suscripto por el donante.

k. Se deberá brindar a cada donante la oportunidad de indicar confidencialmente que la unidad recolectada puede ser inadecuada para transfusión a través de la Planilla HEMO 3. Se aclarará que debe contestar por SÍ o por NO, marcando con una cruz.

l. El donante deberá ser informado sobre los cuidados a observar luego de la extracción y alertado sobre las posibles reacciones adversas (RAD). La información deberá incluir el cuidado del sitio de la venopunción y una o más formas de comunicación post donación con el centro de extracción.

m. Se deberá recordar al donante la importancia y posibilidad de volver a donar (fidelización).

» SOBRE LA FRECUENCIA:

El período mínimo de tiempo que deberá transcurrir entre dos donaciones de sangre entera será de 8 semanas para los hombres, 12 semanas para las mujeres y 6 meses para los menores de entre 16 y 17 años.

Un varón podrá donar sangre hasta cinco veces en el período de un año, una mujer hasta cuatro veces y ambos -de tener entre 16 y 17 años- 2 veces en el mismo tiempo. La donación de sangre total debe ser diferida durante por lo menos 48 horas luego de una sesión de aféresis. En casos especiales, con consentimiento del donante, se puede establecer un programa para proveer transfusiones de un solo donante a un paciente determinado.

La frecuencia de las donaciones de aféresis puede ser programada durante la extracción de unidades recolectadas en plazos no más frecuentes que cada tres días.

» SOBRE LA EDAD:

El donante de sangre o componentes sanguíneos deberá tener entre 16 y 65 años de edad. Los donantes no incluidos entre estos límites, para su aceptación, deberán ser previamente evaluados por el médico especialista en Hemoterapia.

Los mayores de 65 años deberán concurrir con certificado de su médico de cabecera autorizando la extracción.

Para los procedimientos de aféresis los donantes deberán tener entre 18 y 65 años.

» SOBRE EL RIESGO LABORAL:

La entrevista será minuciosa y exhaustiva para definir y recordar posibles accidentes de trabajo o exposiciones a riesgo. En caso afirmativo se diferirá la donación de sangre por el término que se determine a partir de dicha entrevista, momento en el cual deberá realizarse serología previa a la donación, en casos de resultar negativa se incorporará como donante.

» SOBRE EL ESTADO DE SALUD:

Hemoglobina o Hematocrito

Se deberá determinar la concentración de hemoglobina o el hematocrito en una muestra de sangre obtenida por punción digital o venopuntura. La concentración de hemoglobina deberá estar comprendida entre 12,5 y 17 gr/dl. El hematocrito deberá estar comprendido entre 38 y 52%.

Pulso

El pulso deberá presentar características normales y su frecuencia no deberá ser menor de 60 ni mayor de 100 latidos por minuto. En los atletas con alta tolerancia al ejercicio, una frecuencia menor puede ser aceptable. Parámetro sujeto a evaluación médica.

Tensión arterial

La tensión sistólica no deberá ser mayor de 170 mmHg y no menor de 100 mmHg, la tensión diastólica no deberá ser mayor de 100 mmHg ni menor de 60 mmHg. Parámetro sujeto a evaluación médica.

Embarazo

El embarazo contraindica la hemodonación. Serán excluidas por seis meses todas las mujeres que hayan tenido parto normal, cesárea o aborto (ver GO 4) o un año (ver GO 3).

Lactancia

Transcurridos los 6 meses del parto/cesárea y cumpliendo con los requisitos básicos de estado de salud, peso y Hb se podrá admitir.

Período menstrual

Durante el período menstrual se puede donar sangre. La hipermenorrea u otras patologías de la menstruación deberán ser evaluadas por el profesional.

Peso

Las personas que pesan 50 kg o más podrán donar 450 ± 45 ml de sangre. La toma adicional para muestras no excederá 30 ml. Quienes pesen menos de 50 kg NO podrán donar.

Alimentación

Se recomienda que el donante ingiera antes de la donación un desayuno o almuerzo habitual. Se desaconseja el ayuno.

Temperatura

La temperatura corporal no deberá exceder los 37°C.

Medicamentos

La terapéutica con medicamentos puede hacer que la donación sea perjudicial para el donante y/o para el receptor, por cuyo motivo deberá evaluarse el tipo de droga y el cuadro clínico que determinó la indicación.

(ver anexo de drogas y cuadros clínicos)

» SOBRE CONDUCTAS DE RIESGO:

Independientemente del género u orientación sexual, la evaluación individual de conductas de riesgo, hace foco en la siguiente situación:

Parejas nuevas en los últimos 6 meses con quienes hayan tenido conductas sexuales específicas orales, vaginales y/o anales sin utilizar métodos de protección de barrera (ej: preservativo, campo de látex). Difiere 6 meses la donación.

Uso de PREP, PEP, ART diferir 6 meses si fue VO y 2 años si fue inyectable.

» ANEXO MEDICAMENTOS:

1- DE DIFERIMIENTO PERMANENTE:

Digoxina

Vasodilatadores

Insulina

Anticoagulantes

Oncológicos

Antipsicóticos (ej: Quetiapina - Risperidona - Olanzapina - Haloperidol - etc.)

Anticonvulsivantes -si es para tratamiento de epilepsia-. **Ver excepción en inciso 3 ***

Betabloqueantes: con FC menor a 60 x'. **Ver excepción en inciso 3 ****

Hormona de crecimiento hipofisaria humana (la recombinante NO tiene diferimiento)

Etretinato (tigason)

2- DE DIFERIMIENTO TRANSITORIO:

(una vez suspendido el mismo)

Acitretina (neotigason) 3 años

Dutasteride 6 meses

Testosterona 6 meses

Clomifeno 3 meses

Isotretinoína (roacutan) - Finasteride 1 mes

Antibióticos 7 días

Corticoides sistémicos 48 hs

3- SIN MOTIVO DE DIFERIMIENTO:

Antitabaco

Adelgazantes

Anticonceptivos

Hormonales sustitutivos

Anticolesterol

Antihemorroidales

Descongestivos nasales y broncodilatadores

Cortisona interarticular

Vitaminas y minerales suplementarios

Tranquilizantes, ansiolíticos y antidepresivos

Analgésicos menores

Relajantes musculares

Diuréticos

Profilaxis antiviral

Antiespasmódicos

Agentes uricosúricos

Laxantes

Antifúngicos tratamiento de micosis ungueal

*** Antiepilépticos/Anticonvulsivantes:** tratamiento por dolor crónico

**** Betabloqueantes:** tratamiento de cefaleas con FC mayor a 60'

EL RESTO DE LOS MEDICAMENTOS SERÁN EVALUADOS EN LA CONSULTA PREDONACIÓN EN FUNCIÓN DE LA ENFERMEDAD PARA LA CUAL SE PRESCRIBIERON Y NO POR EL MEDICAMENTO EN SÍ MISMO.



» ANEXO VACUNAS:

1- DIFERIR 1 MES:

VACUNAS A VIRUS O BACTERIAS VIVAS Y ATENUADAS

Polio oral (Sabin)

Fiebre tifoidea oral

Parotiditis

Triple viral (Paperas, sarampión y rubéola)

Doble viral (sarampión y rubéola)

Fiebre amarilla

Sarampión

BCG

Rubeola

Varicela / Herpes zoster

Rotavirus

Dengue

FHA

2- DIFERIR 1 AÑO:

Antirrábica: si hubo mordedura

3- SIN DIFERIMIENTO SI EL DONANTE ESTÁ CLÍNICAMENTE BIEN:

VACUNAS A VIRUS O BACTERIAS INACTIVADAS, TOXOIDES O RECOMBINANTES

Polio (Salk) inyectable

Doble Adulto – dT (difteria y tétanos)

DTPa (difteria, tétanos y coqueluche acelular)

Tetra (difteria, tétanos, coqueluche y haemophilus influenzae tipo b)

Tétano

Cólera

Fiebre Tifoidea inyectable

Meningitis

Coqueluche

Neumococo

Leptospirosis

Haemophilus influenzae tipo b

Hepatitis A sin exposición (posexposición diferir por seis semanas)

Hepatitis B recombinante sin exposición (posexposición diferir 12 meses)

HPV

Influenza



» ANEXO MOTIVOS Y TIEMPO DE DIFERIMIENTO:

POR ORDEN ALFABÉTICO

CARDIOVASCULAR

CÓDIGO **CV**

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
CV 1	Permanente		FC MENOR A 60X' sin entrenamiento deportivo
CV 2	Permanente		CORONARIOPATIA
CV 3	Permanente		ENDOCARDITIS
CV 4	Permanente		VALVULOPATIAS / ARTERITIS / ARTERIOPATÍA
CV 5	Permanente		FIBRILACION AURICULAR salvo con autorización del cardiólogo
CV 6	Permanente		HTA GRAVE: + DE 2 HIPOTENSORES Y FC MENOR A 60 X
CV 7	Transitorio	1 año	PERICARDITIS VIRAL SIN SECUELA
CV 8	Transitorio	6 meses	FLEBITIS / TVP sólo SI está tomando anticoagulantes
CV 9	Transitorio	6 meses	CATETERISMO / ESTUDIOS HEMODINÁMICOS
CV 10	Transitorio	1 mes	HTA al momento de la donación con o sin medicación / DERIVAR
CV 11	Transitorio	1 mes	TAQUICARDIA más de 100 x min. sin causa / DERIVAR
CV 12	Transitorio	15 días	ESCLEROSIS DE VARICES
CV 13	Transitorio	7 días	HIPOTENSIÓN al momento de la donación (aconsejar medidas higiénico dietéticas)

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
	No diferir		CARDIOPATÍA CONGÉNITA OPERADA CIA/CIV
	No diferir		ARRITMIAS extrasístoles / palpitaciones aisladas



DERMATOLOGÍA

CÓDIGO **DR**

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
DR 1	Permanente		MICOSIS FUNGOIDE / SINDR. DE SÉZARY / SARCOMA de KAPOSÍ
DR 2	Permanente		MELANOMA EXTENDIDO
DR 3	Permanente		ENF. DE VON REKLINHAUSEN
DR 4	Transitorio	5 años	EPITELIOMA ESPINOCELULAR
DR 5	Transitorio	3 años	TRATAMIENTO DE PSORIASIS c/ACITRETINA, TIGASON
DR 6	Transitorio	1 año	MELANOMA IN SITU - con alta médica en seguimiento
DR 7	Transitorio	1 año	TATUAJES / MAQUILLAJE PERMANENTE / ACUPUNTURA CON INSTRUMENTAL NO PROPIO - profundizar cómo y con qué materiales (6 meses si se realiza NAT)
DR 8	Transitorio	6 meses	PIERCING / TATUAJE / MAQUILLAJE PERMANENTE / ACUPUNTURA CON MATERIAL PROPIO (evaluar infección local dónde, cómo y con qué materiales)
DR 9	Transitorio	6 meses	TRATAMIENTO COSMÉTICO INVASIVO / ESCARIFICACIÓN (3 meses si se realiza NAT)
DR 10	Transitorio	6 meses	EPITELIOMA BASOCELULAR
DR 11	Transitorio	6 meses	PSORIASIS (LUEGO DE UN BROTE NO TRATADO CON ACITRETINA / TIGASON - DR5)
DR 12	Transitorio	1 mes	TRAT. DEL ACNE CON ROACUTAN / TRAT. ALOPECIA CON FINASTERIDE

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
DR 13	Transitorio	1 mes	LESIONES MULTICAUSAL EN ZONA DE VENOPUNCIÓN RESUELTA
DR 14	Transitorio	15 días	ERISPELA desde el alta
	No diferir		HERPES SIMPLE ORAL / GENITAL



ENDOCRINOLOGÍA Y GASTROENTEROLOGÍA

CÓDIGOS

ED

Y

GE

ENDOCRINOLOGÍA

CÓDIGO

ED

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
ED 1	Permanente		DIABETES INSULINO DEPENDIENTE - TIPO 1 / INSÍPIDA
ED 2	Permanente		ENF. DE LAS GLAND. SUPRARRENALES / CUSHING / ADDISON / etc.
ED 3	Permanente		INSUF. HIPOFISARIA / ENANISMO tratado con hormona de crecimiento
ED 4	Permanente		HIPERTIROIDISMO / ENF. DE GRAVES BASEDOW
ED 5	Transitorio	7 días	CENTELLO TIROIDEO CON RESULTADO NORMAL

GASTROENTEROLOGÍA

CÓDIGO

GE

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
GE 1	Permanente		CIRROSIS
GE 2	Permanente		ENF. DE CROHN
GE 3	Permanente		SINDROME ASCITICO EDEMATOSO (SAE)
GE 4	Permanente		HEMOCROMATOSIS SI TIENE ASOCIADO OTROS CRITERIOS
GE 5	Permanente		PANCREATITIS ALCOHÓLICA O CRÓNICA
GE 6	Permanente		HIPERTENSIÓN PORTAL
GE 7	Transitorio	1 año	PANCREATITIS AGUDA luego de curada
GE 8	Transitorio	1 año	ÚLCERA GASTRODUODENAL curada si recibió transfusión
GE 9	Transitorio	6 meses	DIVERTICULITIS TRATADA-CURADA
GE 10	Transitorio	6 meses	ENDOSCOPIAS con o sin biopsia - resultado normal (VEDA-VCC)
GE 11	Transitorio	15 días	DIARREA DESDE EL ALTA

GINECO-OBSTETRICIA Y HEMATOLOGÍA

CÓDIGOS **GO** Y **HE**

GINECO-OBSTETRICIA

CÓDIGO **GO**

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
GO 1	Permanente		HISTERECTOMIA X NEOPLASIAS CERVICALES o ENDOMETRIALES
GO 2	Permanente		TRAT. CON GONADOTROFINAS x PROBABLE CREUTZFELD JACOB
GO 3	Transitorio	1 año	PARTO / CESAREA / ABORTO CON transfusiones
GO 4	Transitorio	6 meses	PARTO / CESAREA / ABORTO SIN transfusiones
	No diferir		CA. IN SITU de CERVIX

HEMATOLOGÍA

CÓDIGO **HE**

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
HE 1	Permanente		ANEMIAS HERED. O CONGÉNITAS: TALASEMIA MAYOR / DREPANOCITOSIS / etc.
HE 2	Permanente		COAGULOPATÍAS / HEMOFILIA
HE 3	Permanente		CRIOGLOBULINEMIA
HE 4	Permanente		LEUCEMIAS / LINFOMAS
HE 5	Permanente		PORFIRIAS
HE 6	Transitorio	1 año	TRANSFUSIONES de HEMOCOMPONENTES
HE 7	Transitorio	6 meses	HB BAJA menos de 12,5 gr/dl - derivar para estudio y tratamiento
HE 8	Transitorio	6 meses	HB ALTA mayor a 17,5 gr/dl - derivar para estudio y reevaluar con resultados
HE 9	Transitorio	1 mes	TRAT. ANTICOAGULANTE LUEGO DE SUSPENDIDO - ver causas
	No diferir		TALASEMIA MENOR SIN ANEMIA (candidatos a donación de plaquetoféresis)
	No diferir		PTI sin recaídas en remisión curada más de 5 años
	No diferir		TROMBOFILIA SIN TRATAMIENTO
	No diferir		POLIGLOBULIAS secundarias (descartada Policitemia Vera)

INFECTOLOGÍA

CÓDIGO

IN

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
IN 1	Permanente		TOXICOMANÍA IV
IN 2	Permanente		ALCOHOLISMO CRONICO - más de 1 litro día
IN 3	Permanente		ITT - infeccion de transmision x transfusión - Chagas / Brucelosis / Sífilis / Hep B / Hep C / VIH / HTLV
IN 4	Permanente		LEPRA
IN 5	Permanente		PALUDISMO / PARASITOSIS SISTEMICAS
IN 6	Transitorio	3 años	PALUDISMO O MALARIA para residente de zona endémica, por ej. Venezuela, Colombia y Brasil.
IN 7	Transitorio	2 años	Uso inyectable de PREP, PEP, ART (profilaxis pre y post exposición y terapia antiretroviral)
IN 8	Transitorio	2 años	TBC - desp. de la curación
IN 9	Transitorio	2 años	OSTEOMIELITIS CRÓNICA - curada
IN 10	Transitorio	1 año	EXPOSICIÓN A MORDEDURA (animal desconocido)
IN 11	Transitorio	1 año	ABUSO DE SUSTANCIAS NO IV. + otros factores de riesgo
IN 12	Transitorio	1 año	ENFERM. DE TRANSMISIÓN SEXUAL
IN 13	Transitorio	1 año	TOXOPLASMOSIS - luego de curada
IN 14	Transitorio	6 meses	RIESGO INDIVIDUAL CON PAREJAS NUEVAS (ver guía dif. contactos) USO PREP, PEP ORAL (profilaxis pre y post exposición)

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
IN 15	Transitorio	6 meses	MONONUCLEOSIS INFECCIOSA
IN 16	Transitorio	4 meses	DENGUE HEMORRÁGICO
IN 17	Transitorio	3 meses	CMV
IN 18	Transitorio	3 meses	BOTULISMO
IN 19	Transitorio	3 meses	PALUDISMO, viaje a zona endémica
IN 20	Transitorio	2 meses	OSTEOMELITIS AGUDA - curada
IN 21	Transitorio	1 mes	PAROTIDITIS / RUBEOLA / SARAMPIÓN / ERISPELA
IN 22	Transitorio	1 mes	VARICELA / HERPES ZOSTER
IN 23	Transitorio	1 mes	DENGUE / FIEBRE AMARILLA
IN 24	Transitorio	15 días	FIEBRE DE ORIGEN DESCONOCIDO. Evaluar con estudios.
IN 25	Transitorio	15 días	ESTAFILO CUTÁNEA / FORÚNCULO / ÁNTRAX LUEGO DE CURADA
IN 26	Transitorio	15 días	INF. BACTERIANAS COMUNES NO COMPLICADAS: Sinusitis / Otitis / Inf. urinaria baja - con alta médica
	No diferir		HERPES LABIAL



MEDICAMENTOS Y NEFRO-UROLOGÍA

CÓDIGOS

MD

Y

NU

MEDICAMENTOS (ver anexo)

CÓDIGO

MD

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
MD 1	Permanente		Digoxina / QT / Insulina / Antipsicóticos / Anticoagulantes / etc. (ver anexo)
MD 2	Transitorio	3 años	Acitretina (neotigason)
MD 3	Transitorio	6 meses	Dutasteride / Testosterona
MD 4	Transitorio	3 meses	Clomifeno
MD 5	Transitorio	1 mes	Finasteride / Isotretinoína (roacutan)
MD 6	Transitorio	7 días	Antibióticos (excepto Tetraciclina, Doxyciclina y Eritromicina sin diferimiento)
MD 7	Transitorio	2 días	Corticoides sistémicos

NEFRO-UROLOGÍA

CÓDIGO

NU

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
NU 1	Permanente		IRC / NEFROPATÍAS CRÓNICAS
NU 2	Permanente		TUMORES MALIGNOS DEL SISTEMA URINARIO / PRÓSTATA
NU 3	Transitorio	6 meses	PROCEDIMIENTOS INVASIVOS ENDOSCÓPICOS
NU 4	Transitorio	1 mes	PIELONEFRITIS AGUDA / PROSTATITIS LUEGO DEL ALTA
NU 5	Transitorio	1 mes	NEFROLITOTOMÍA EXTRACORPÓREA
NU 6	Transitorio	1 mes	UROGRAMA EXCRETOR / estudios con contraste
NU 7	Transitorio	15 días	CÓLICO RENAL / INFECCIÓN URINARIA

OTROS Y QUIRÚRGICAS

CÓDIGOS

OT

Y

QX

OTROS

CÓDIGO

OT

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
OT 1	Transitorio	1 año	AE - autoexcluido en donación anterior, aclarar los motivos por si persiste situación de riesgo.
OT 2	Transitorio	1 año	ACCIDENTE PUNZO CORTANTE CON MAT. DE RIESGO
OT 3	Transitorio	6 meses	ENTREVISTA NO CONFIABLE - se descarta la bolsa post donación
OT 4	Transitorio	1 mes	FRACTURAS SIN TRAT. QUIRURGICO
OT 5	Transitorio	15 días	MALA RED VENOSA
OT 6	Transitorio	15 días	YESO luego de retirado
OT 7	Transitorio	1 día	LIPOTIMIA transitoria
OT 8	Transitorio	1 día	AGUJA TAPADA
OT 9	Transitorio	1 día	BOLSA ROTA
OT 10	Transitorio	1 día	SE RETIRÓ SIN DONAR
OT 11	Transitorio	1 día	ESCASO VOLUMEN DE EXTRACCIÓN
OT 12	Transitorio		PESO < 50 KG.
OT 13	Transitorio		PERDIDA DE PESO INEXPLICABLE > 10% EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES HASTA LA RESOLUCIÓN

QUIRÚRGICAS

CÓDIGO

QX

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
QX 1	Permanente		CX POR CÁNCER
QX 2	Permanente		CX CARDÍACA (excepto: CARDIOPATÍA CONGÉNITA OPERADA CIA / CIV)
QX 3	Permanente		CX ANEURISMA O TROMBOSIS ARTERIALES
QX 4	Permanente		GASTRECTOMÍA (NO incluye cx bariátrica)
QX 5	Permanente		NEUMONECTOMIAS / LOBECTOMÍAS
QX 6	Permanente		SUPRARRENALECTOMÍA
QX 7	Permanente		ESPLENECTOMÍA salvo post - trauma
QX 8	Permanente		NEUROCIRUGÍAS
QX 9	Transitorio	1 año	CX con transfusiones CON ALTA MÉDICA
QX 10	Transitorio	6 meses	IMPLANTE DENTAL - fase remoción ósea
QX 11	Transitorio	6 meses	CX sin transfusiones CON ALTA MÉDICA y YA EN ACTIVIDAD
QX 12	Transitorio	2 meses	CX DE MIOPIA / CATARATAS hasta el ALTA oftalmológica
QX 13	Transitorio	15 días	CX ODONTOLÓGICA / SUTURAS / ABSCESOS con ATB - luego de suspendido
QX 14	Transitorio	3 días	EXTRACCIÓN DENTAL sin ATB

REUMATOLOGÍA Y SISTEMA NERVIOSO

CÓDIGOS **RM** Y **SN**

REUMATOLOGÍA

CÓDIGO **RM**

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
RM 1	Permanente		COLAGENOPATÍA / LES / AR / REITER / ESCLERODERMIA / etc.
RM 2	Permanente		FIEBRE REUMÁTICA CON SECUELAS (VALVULOPATÍA / NEFROPATÍA)
RM 3	Transitorio	1 año	FIEBRE REUMÁTICA TRATADA, CURADA, SIN SECUELAS CARDIACAS
RM 4	Transitorio	2 meses	GOTA - luego de una crisis.

SISTEMA NERVIOSO

CÓDIGO **SN**

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
SN 1	Permanente		ENF. CRÓNICAS: ELA / PARKINSON / EM -MIOPATÍAS / MIASTENIA
SN 2	Permanente		EPILEPSIA en tratamiento
SN 3	Permanente		HEMATOMA SUBDURAL / EXTRADURAL CON SECUELAS
SN 4	Permanente		ACV
SN 5	Transitorio	2 años	GUILLEN BARRE asintomático y sin recaídas
SN 6	Transitorio	1 mes	TEC CON PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO Y SIN SECUELAS
SN 7	Transitorio	1 mes	SIND. VESTIBULAR PERIFÉRICO sin tratamiento
	No diferir		ANT. DE EPILEPSIA sin tratamiento. Sin crisis en los últimos 3 años

SISTEMA RESPIRATORIO Y VACUNAS

CÓDIGOS

SR

Y

VC

SISTEMA RESPIRATORIO

CÓDIGO

SR

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
SR 1	Permanente		ASMA SEVERO con uso diario de BRONCODILATADORES
SR 2	Permanente		EPOC
SR 3	Permanente		EDEMA AGUDO DE PULMÓN / EMBO-LIA PULMONAR
SR 4	Permanente		PNEUMOCONIOSIS / SARCOIDOSIS
SR 5	Transitorio	15 días	ASMA LEVE que recibió CORTICOIDES
SR 6	Transitorio	15 días	NAC luego de terminado el tratamiento
	No diferir		ASMA LEVE en tratamiento de man-tenimiento SIN corticoides orales

VACUNAS (ver anexo)

CÓDIGO

VC

CÓDIGO	TIPO	PLAZO	DETALLE
VC 1	Transitorio	1 año	VAC. ANTIRRÁBICA
VC 2	Transitorio	1 mes	VACUNAS A VIRUS O BACTERIAS VIVAS Y ATENUADAS
	No diferir		VACUNAS A VIRUS O BACTERIAS INACTIVADAS, TOXOIDES O RECOM-BINANTES

» CUESTIONARIO ORIENTATIVO

ESTE MATERIAL ES ÚNICAMENTE PARA USO DEL PERSONAL QUE REALIZA LA ENTREVISTA PREDONACIÓN.
Se debe aclarar al potencial donante que todas las preguntas que se le realizarán son para proteger su salud y la del futuro receptor.

- ¿Se siente bien y “sano” hoy?
- ¿Está en ayunas?
- ¿Está tomando alguna medicación? Medicación de tipo crónico como así también aspirina, analgésicos y/o antibióticos.
(si toma AAS se lo difiere como donante de plaquetoaféresis, si dona sangre entera se debe marcar en la bolsa triple “AAS”)
- Si donó sangre en otra oportunidad: ¿Sufrió algún inconveniente con posterioridad a la donación?
- ¿Lo han rechazado como donante de sangre o le dijeron que no puede donar?
- ¿Ha padecido o padece enfermedades del corazón: infarto, angina de pecho, etc.?
- ¿Ha padecido o padece enfermedades renales crónicas?
- ¿Ha tenido enfermedad en los pulmones, tuberculosis o asma bronquial?
- ¿Ha tenido convulsiones, desmayos, ausencias o pérdidas de conocimiento? ¿Padeció alguna vez epilepsia?
- ¿Alguna vez le diagnosticaron cáncer? ¿Cuál?
- ¿Recibió quimioterapia y/o radiaciones?
- ¿Ha recibido tratamiento con hormonas de crecimiento o hipofisarias?
- ¿Ha tenido hemorragias y/o problemas de coagulación?
- ¿Es diabético insulín dependiente?
- ¿Tiene o conoce la Enfermedad de Chagas, estuvo de viaje por zonas endémicas?

- ¿Tiene presión alta? ¿Está medicado?
- ¿Tomó medicación para el Acné, Psoriasis o para la Próstata: Accutane, Proscar, Tengison o similar?
- ¿Ha tenido fatiga, sudoración nocturna o pérdida de peso inexplicable en los últimos 6 meses?
- ¿Ha tenido ganglios, lesiones en la piel o mucosas: boca, nariz, pene, ano?
- ¿Ha tenido ictericia, color amarillo de piel, hepatitis o pruebas positivas para Hepatitis o enfermedad del hígado?
- ¿Ha recibido tratamiento odontológico? ¿Cuál? ¿Cuándo?
- ¿Ha tenido diarrea o fiebre en las últimas 72 hs.?
- ¿Ha tenido Brucelosis, Malaria o Paludismo, recibió tratamiento o viajó a zonas endémicas?

» SI ES MUJER (sexo biológico):

- ¿Cuántos embarazos tuvo?

IMPORTANTE: se tienen en cuenta los abortos; la mujer con 3 o + gestas NO es elegible para plaquetoaféresis por razones inmunológicas y se considera “múltipara”, si dona sangre entera se marca en la bolsa triple como “MULTIPARA”.

- ¿Está embarazada?
- ¿Cuánto tiempo transcurrió del último parto - aborto - cesárea?
- ¿Presenta o presentó alguna enfermedad no mencionada? ¿Cuál?



Las siguientes preguntas son también importantes porque existe lo se llama PERÍODO VENTANA: tiempo transcurrido desde el momento que el agente infeccioso entra al organismo hasta el momento en que es factible su detección por las pruebas de laboratorio. Es importante explicar esto al donante y pedir que responda con sinceridad.

» ALGUNA VEZ...

- ¿Usó una aguja para inyectarse alguna droga, aunque sea una sola vez?
- ¿Usó drogas como cocaína, paco, éxtasis, tusi, etc.?
- ¿Toma bebidas alcohólicas? ¿Cuánto? ¿Con qué frecuencia?
- ¿Se ha realizado tatuajes, pinchazos en la piel (piercing) o tratamiento de acupuntura, estéticos (botox - plasma rico en plaquetas - sustancias de relleno)? ¿Con material propio descartable?
- ¿Ud. o su pareja han recibido transfusiones de sangre o trasplante de órganos o tejidos? Si fue su pareja: ¿Se cuidaron con preservativos u otros métodos de barrera?
- ¿Ha tenido contacto accidental con sangre humana, secreciones o realiza tareas quedando expuesta/o a la misma?
- ¿Le han realizado algún procedimiento de cirugía mayor, menor, laparoscopia o endoscopia? ¿Cuándo?
- ¿Ha tenido contacto sexual de riesgo: sin uso de preservativo o método de barrera-campo de látex (vía oral, anal o vaginal) con alguien que haya estado expuesto/a al virus del VIH o que esté infectado/a con el virus del VIH, Hepatitis B o C?

- ¿Ha tenido relaciones sexuales con varias parejas sin uso de preservativo o método de barrera-campo de látex?

- ¿Ha recibido tratamiento PREP / PEP / ART? (medicación pre y post exposición o antiretrovirales) ¿Inyectable o comprimidos?

- ¿Ha tenido contacto íntimo con un/a paciente en plan de diálisis o que reciba sangre o componentes sanguíneos sin usar preservativo u otros métodos de barrera?

- ¿Ha sido tratado/a por sífilis, gonorrea u otra enfermedad venérea?

- ¿Tiene VIH o pruebas positivas para VIH?

- ¿Ha estado detenido en instituciones carcelarias o policiales?

- ¿Ha recibido tratamiento contra la rabia?

- ¿Ha recibido Inmunoglobulina anti-hepatitis B (no vacuna)?

- ¿Ha recibido vacunas? ¿Cuáles?

» ¿Entendió todas las preguntas que se le formularon?

Aclararle que va a firmar un consentimiento informado, y que si alguna determinación del laboratorio da REACTIVA será contactado vía mail, carta o telefónica.

» ¿Tiene alguna duda sobre el procedimiento de la donación?

Contarle que se le hará un control de la TA, T° y Nivel de Hb para saber si está apto y que luego el procedimiento de donación dura aprox. 10 minutos y no se le extraerán más de 450 ml.