



2024-2025 学年研究生数值分析 期末考试试题(A)

一、简答题：(每题 5 分，共 30 分)

1. 设 $\sqrt{2001} \approx 44.733$, $\sqrt{1999} \approx 44.710$ 分别具有 5 位有效数字，计算

$\sqrt{2001} - \sqrt{1999}$ 的近似值，使其计算结果至少具有 5 位有效数字，说明理由

2. 证明：矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 不存在 LU 分解.

3. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. 对于线性方程组 $Ax=b$, 请分析 Jacobi 迭代法的收敛性

4. 设 α 是非线性方程 $f(x)=0$ 的单根，试说明收敛的迭代格式

$x_{k+1} = x_k - m(x_k)f(x_k)$, 当 $m(\alpha) \neq f'(\alpha)^{-1}$ 时是一阶收敛; 当 $m(\alpha) = f'(\alpha)^{-1}$ 时至少是二阶收敛.

5. 分别利用 Simpson 求积公式 S 和 $n=2$ 的复化梯形求积公式 T_2 计算定积分

$$\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx \text{ 的近似值.}$$

6. 求积公式 $\int_0^2 f(x)dx \approx \frac{3}{2}[f(1)+f(2)]$ 是否为插值型求积公式，说明理由.

二、解答题 (10 分)

某次实验中测得两个变量 x, y 以及权函数 ρ 之间关系如下:

| | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| x_i | 4 | 3 | 2 | 1 |
| y_i | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 1/3 |
| ρ_i | 1 | 2 | 1 | 3 |

试用最小二乘法求形如 $y = \frac{1}{a+bx^2}$ 的拟合曲线.

三、解答题 (10 分) 设函数 $f(x) = (x^5 - a)^2 (a \neq 0)$, 写出求解 $f(x) = 0$ 实根 $\sqrt[5]{a}$ 的

牛顿迭代格式和带参数 m (其中 m 为方程 $f(x) = 0$ 根的重数) 的牛顿迭代格式, 并证明迭代格式的收敛阶.

四、解答题 (10 分) 设函数 $f(x) = \cos x$, 将 $[0, 1]$ 区间 n 等分 (n 为正整数), 记

$$h = \frac{1}{n}, x_k = kh \quad (k = 0, 1, \dots, n).$$

1. 求 $f(x)$ 以 $x_k (k = 0, 1, \dots, n)$ 为节点的 n 次 Lagrange 插值多项式 $L_n(x)$;

2. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - L_n(x)| = 0$.

五、解答题 (10 分) 已知 $f(x) \in C^4[-1, 1]$, 求积公式

$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx C[f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)]$$

代数精度为 3, 试确定参数 C, x_1, x_2, x_3 .

六、解答题 (15 分) 给定一阶常微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{dy}{dx} = f(x, y(x)), & a \leq x \leq b, \\ y(a) = 0, \end{cases}$$

其中 $f(x, y)$ 连续并且关于 y 满足 Lipschitz 条件. 已知求解上述常微分方程初值问题的差分方法

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{5}(2K_1 + 3K_2), \\ K_1 = f(x_n, y_n), \\ K_2 = f(x_n + \alpha h, y_n + \beta h K_1), \\ y_0 = 0, \end{cases}$$

为二阶方法, 试确定参数 α 和 β 的值并判定此方法的收敛性.

七、解答题 (15 分) 对于解线性方程组 $Ax=b$ 的迭代格式 $x^{(k+1)} = Mx^{(k)} + g$, 设 $\rho(M)$ 为迭代矩阵 M 的谱半径.

1. 求证: 当且仅当 $\rho(M) < 1$ 时, 对于任意初始向量 $x^{(0)}$, 以上迭代格式收敛;

2. 多选题: 对于 1 中命题的理解, 以下合理的选项有哪些? (请将所有合理选项的标号写在答题卡上对应的题号处)

(A) 当 $\rho(M) \geq 1$ 时, 有可能存在初始向量 $x^{(0)}$ 使迭代收敛.

(B) 当 $\rho(M) \geq 1$ 时, 不可能存在初始向量 $x^{(0)}$ 使迭代收敛.

(C) 当 $\rho(M) < 1$ 时, 有可能存在初始向量 $x^{(0)}$ 使迭代发散.

(D) 当 $\rho(M) < 1$ 时, 不可能存在初始向量 $x^{(0)}$ 使迭代发散.