

PROTOCOLE DE TRAITEMENT DU VIH PAR LES ARV

1. Schéma de traitement chez l'adulte ; l'adolescent et la femme enceinte :
SCHEMA DE 1 ère LIGNE DE TRAITEMENT ARV (Utilisation de 2 INRT+1Inhibiteur de l'Intégrase)

CATEGORIE DE POPULATION	OPTION DE 1 ère RECOMMANDE DANS TOUTES LES FORMATIONS SANITAIRES	ALTERNATIVE DE TRAITEMENT POUR LA 1 ère LIGNE
Adulte, adolescent et femme en âge de procréer ou femme enceinte	TENOFOVIR/LAMIVUDINE/DOLUTEGRAVIR (TDF+3TC+DTG)	ZIDOVUDINE/LAMIVUDINE+DOLUTEGRAVIR (AZT/3TC+DTG)

Précautions particulières chez la femme enceinte ou en âge de procréer

- Exclure une grossesse avant de prescrire un schéma contenant DTG et proposer une contraception chez une femme en âge de procréer
- En cas de grossesse, il faut prescrire un schéma contenant le Dolutégravir et supplémenter la femme enceinte en **Acide folique (1 Cp/jr)** durant toute la durée de la grossesse
- Si une grossesse survient chez une femme sous schéma contenant le DTG,il faut continuer le même schéma et **supplémenter la femme en Acide folique**

2. Schéma de 1 ère ligne recommandé chez le NOURRISSON et l'ENFANT

Tranches d'âge	Option de 1 ère ligne	Alternative
Nouveau-Né (Moins de 4 Semaines)	AZT+3TC+RALTEGRAVIR	AZT/3TC+Nvp
1mois-6ans(3-20Kg)	ABC/3TC+DTG10mg	AZT/3TC+DTG10mg
Sup à 6ans-10ans(20-30kg)	ABC/3TC+DTG50mg	ABC/3TC+ LPv/ritonavir ou AZT/3TC+DTG 50mg
Plus de 10 ans et Poids Supérieur ou égal 30Kg	TDF/3TC/DTG	AZT/3TC+DTG 50mg

3 Traitement prophylactique

A prophylaxie primaire contre les Infections opportunistes

Chez les enfants nés exposés ; la prophylaxie au COTRIMOXAZOLE est recommandé à partir de 6 semaines à 18 mois si sa sérologie devient négative à 18 mois

Chez l'adulte, il faut instaurer une prophylaxie au COTRIMOXAZOLE dès que la sérologie au VIH est positive ,

B Prévention de la Tuberculose chez PVVIH

-Faire le screening de la TB pour toute PVVIH nouvellement dépistée afin d'éliminer une TB active

-Mettre sous prophylaxie à l'INH si le screening est NEGATIF(10-15 mg/Kg/jr pendant 6 mois)

-Si le screening est POSITIF, il faut rechercher la TB active (Recherche des BK et Test GeneXpert)