

ADMINISTRATION D'UN BRONCHO-DILATATEUR L'AIDE D'UNE CHAMBRE D'INHALATION ET D'UN MASQUE

DONNER SALBUTAMOL INHALE POUR UNE RESPIRATION SIFFLANTE

UTILISATION D'UNE CHAMBRE D'INHALATION

Une chambre d'inhalation est un moyen d'administrer efficacement les médicaments bronchodilatateurs dans les poumons. Aucun enfant de moins de 5 ans ne doit recevoir un inhalateur sans chambre d'inhalation. Une chambre d'inhalation fonctionne aussi bien qu'un nébuliseur si elle est correctement utilisée^e. Répétez jusqu'à 3 fois toutes les 15 minutes avant de classer la pneumonie.

Posologie: 2 bouffées par prise 3 fois toutes les 15 minutes.

Les chambres d'inhalations peuvent être réalisées de la manière suivante :

- Utilisez une bouteille de boisson de 500 ml ou similaire.
 - Découpez un trou dans le fond de la bouteille de la même forme que l'embout buccal de l'inhalateur. Cela peut être fait à l'aide d'un couteau bien aiguisé.
 - Couper la bouteille entre le quart supérieur et le 3/4 inférieur et ne pas tenir compte du quart supérieur de la bouteille.
 - Coupez un petit V à la frontière de la grande partie ouverte du biberon pour l'adapter au nez de l'enfant et être utilisé comme un masque.
 - Couvrir le bord de la bouteille coupée avec une bougie ou du sparadrap pour l'adoucir.
- Chez un petit bébé, un masque peut être fabriqué en faisant un trou similaire dans une tasse en plastique (pas en polystyrène).
Il faudrait, dans la mesure du possible, utiliser les chambres d'inhalation appropriées commercialisées



Administration d'un bronchodilatateur à l'aide d'une chambre d'inhalation et d'un masque. Une chambre d'inhalation peut être fabriquée localement avec une bouteille en plastique.

Comment utiliser une chambre d'inhalation ?

- Retirez le capuchon de l'inhalateur.
- Secouez bien l'inhalateur.
- Insérez l'embout buccal de l'inhalateur dans le trou de la bouteille ou du gobelet en plastique.
- L'enfant doit mettre l'ouverture du biberon dans sa bouche et inspirer et expirer par la bouche.
- Un soignant appuie ensuite sur l'inhalateur et pulvérise dans la bouteille pendant que l'enfant continue de respirer normalement.
- Attendez trois à quatre respirations et répétez.
- Pour les jeunes enfants, placez la tasse sur la bouche de l'enfant et utilisez-la comme entretoise de la même manière.

* Si une chambre d'inhalation est utilisée pour la première fois, elle doit être amorcée par 4 à 5 bouffées supplémentaires de l'inhalateur