



DEPAARDENTHERAPEUT

voor een fysiek & mentaal gezond paard

Rapportage Nemo

NAW

Naam eigenaar	Annemieke Dijk	Datum: 02/08/2022
Naam dier	Nemo	
Leeftijd dier	24-05-2015 (7 jaar)	
Ras + geslacht dier	Haflinger ruin	
Gecastreerd? Op welke leeftijd?	Bij de hengstenhouder gecastreerd voor hij naar Annemieke kwam (feb '18), wond goed hersteld.	

Hulpvraag:

Nemo bouwt moeilijk conditie op. Is vaak traag. Zwaar ademen bij inspanning. Paard is weinig soepel, is traag en in het werk snel vermoeid. Heeft veel aanmoediging nodig. Oogt verder wel vrolijk en blij. Kan na het werk zwaar ademen.

Geschiedenis hulpvraag:

Niet helemaal duidelijk. Traag en flegmatisch is hij altijd geweest. Vorig jaar begonnen met langere buitenritten en dan valt op dat hij dit moeilijk volhoudt. Op de terugweg gaan de meeste paarden vlotter, maar nemo sloft de laatste kilometers naar huis.

(Medische) geschiedenis:

Eerste levensjaren

Nemo komt uit Italië en heeft de eerste twee jaar van zijn leven in Italië in de kudde gelopen. Eerst met de merries, daarna in de jonge hengsten groep. Is op 2,5 jarige leeftijd naar Nederland verkocht met het idee dat hij hier naar de hengstenkeuring zou kunnen. Bleek niet goed genoeg voor de keuring (weet niet waarom), is toen ingereden en aan Annemiek verkocht. Heeft in het eerste jaar bij mij overdag op het land gestaan en 's nachts op stal. Info moeder onbekend.

Paar jaar geleden op de röntgen geweest ivm kreupelheidsklachten en daar kwam een verbening van het hoefkraakbeen naar voren in beide voorvoeten en een vermoeden van beginnende hoefbevangenheid. Wordt standaard een keer per jaar behandeld door osteo. Zijn dan eigenlijk geen opvallende zaken. Is onder behandeling geweest van den Hoek. Heeft geen spectaculaire verbetering opgeleverd.

Nemo heeft een aangeboren afwijking in zijn gelaat. Een kuil onder zijn oog, langs het neusbot.

Juli 2019 vage kreupelheid

Juni 2020 mijt (byemite)

Juli 2020 den hoek

2021 hart, longen en bloedonderzoek ivm slechte conditie, geen bijzonderheden.

Vaccinaties/ontwormen

Influenza jaarlijks en tetanus 1x per drie jaar. Vorig jaar geënt tegen Rhino. Geen zichtbare reactie na vaccineren. 2x pj mestonderzoek; meestal goed uit de bus. In de 1e jaren wel eens wormen gehad, maar laatste 2j in mestonderzoek niks meer. Om het jaar preventief ontwormen. December '21 equest gekregen. Geen zichtbare reactie.

Huidige situatie:

Onderhoud gebit/hoeven/zadel

Jaarlijks elektrisch met verdoving (07/07/2022). Nemo heeft wat tandschade door het gebruik van hooinetten. Waarschijnlijk vanwege zijn woeste manier van eten.

Bekapper elke 6 weken Verbening, gevoelige zolen. Lange steunsels en hoofwand en vrij platte zool.

→ **Ik vermoed dat andere en meer frequentie bekapping hem zal kunnen verbeteren. Denk bijv. aan Saskia Versluis (0616171837).**

Zadelmaker komt 1x per jaar, aanpassen aan groei Nemo, verder geen bijzonderheden.

Bezigheden, huisvesting

Samen met 2 andere pownies in inloopstal met paddock, het hele jaar rond zo'n 5-8 uur per dag weidegang. Allemaal ruinen (7, 17 en 22). De interactie naar elkaar is duidelijk, respectvol maar niet onvriendelijk. Ze zijn met z'n drieën wel een echt hecht clubje. Als er een weg is, vinden ze dat moeilijk. Annemiek denkt dat Nemo een maatje mist om mee te spelen (andere twee zijn niet erg speels). Geen pestgedrag.

Verschillende weides in gebruik. Een aantal zijn ingezaaid met speciaal paardengras, maar niet allemaal.

1u per dag "werk"; van alles wat. Buitenritten, dressuurmatig, longeren en grondwerk 4-5x per week. Gemiddelde intensiteit moeite met aan galopperen, moeite met door galopperen, aan de volte moeite op de linkerhand.

Conditie/training

Nemo heeft periodes gehad dat hij te zwaar was. Nu Annemiek dit helemaal zelf kan controleren, gaat dit een stuk beter (door o.a. weidebeleid en zonodig inzet graasmasker).

Bloedonderzoek 2021

Aangevraagd ivm slechte conditie.

LDH en CK sterk verhoogd (kan zowel bij KPU als bij IR).

Waarschijnlijk omdat lichaam afvalstoffen opslaat in bindweefsel/fascia wat omringt is met spieren (typisch bij paarden die lang stijf zijn / met de handrem erop lopen).

LDH < 400 (=596)

CK < 130 (=294)

Selenium sterk verhoogd >40 en <120 (= 160)

Bij hoog selenium is er vaak organisch selenium gevoerd in het verleden wat nu wordt losgelaten in het bloed. Verhoogd de kans op IR.

Hemoglobine en rode bloedcellen allebei aan de lage kant, maar niet onder grenswaarde (kan KPU zijn). Dit zorgt vaak voor slechte conditie opbouw.

Glucose niet getest.

→ Er zijn wel indicatoren die mogelijk zouden kunnen wijzen op insuline resistentie, maar het bloedonderzoek is niet volledig en wat verouderd. De klachten en het klinische beeld passen hier wel ook bij. Dit evt gecombineerd met KPU (disbalans in de darmen waardoor de biotransformatie van de lever wordt verstoord). Nieuw bloedonderzoek en evt KPU urinetest kunnen hier meer duidelijkheid geven als je dat prettig vindt. Ondersteuning van de stofwisseling en de organen is sowieso iets wat we meenemen in het protocol.

Als je op IR wil testen:

Dikgedrukte is noodzakelijk, de rest is handig maar niet essentieel.

- Algemeen bloedbeeld, nieren en lever waarden.
- Mineralen: **Zink, selenium**, koper, ijzer, magnesium
- **Suiker: glucose en insuline**

Let op, de DA moet het bloed wel in NaF bloed verwerken en niet in serum om juiste glucosewaarde te krijgen. Glucose kan na het bloed trekken verminderen in het sample als het niet snel genoeg (het moet plusminus 30 min na trekken worden verwerkt in het lab/ingevroren) wordt verwerkt. Als er te lange tijd overheen gaat krijg je een vals negatieve waarde. Bespreek dit op voorhand met de DA anders kan het zijn dat de DA een route rijdt na jouw bezoek en dan gaat er te lange tijd overheen. Voor de glucose test hoeft het paard niet nuchter te zijn (sommige DA's vertellen dat), maar je mag wel maar alleen hooi geven 24 uur van te voren. De laatste 12 uur mag ook echt geen gras, bijvoeding of snoep meer.

Vraag vooraf even wat de kosten zijn van de bloedafname waarbij deze waardes worden meegenomen. Zodat je niet voor verrassingen komt te staan qua prijs.

Voeding, drinken, ontlasting en urine

Drinkt leidingwater. Urine iets troebel. Ontlasting wat nat, geen winderigheid.

Bij Annemieke altijd onverpakt hooi gegeten. Kruidenhooi en graszaad of weidehooi uit slowfeeders van 3 cm in porties. Wat kleinere porties als ze van het land komen en dan voor de nacht wat extra.

→ **Allerbelangrijkste is dat ze nooit langer dan 3-4u zonder hooi staan.**

Daarnaast Viitalbix daily complete timothee met een flinke hand vitalbix fibermix.

In de avond vitalbix active plus met een flinke hand fibermix.

1x per twee maanden een zandkuur psyllium gemengd met vitalbix nutrimash

PN steen en himalaya zoutsteen

In de wintermaanden elke dag een flinke winterwortel en af en toe ook snoepjes.

Een paar keer in de week een salade bar met bijv. wilgentakken, berk, brandnetel, kleeftkruid, etc. wat er maar aan eetbaars te vinden valt in de omgeving

Supplementen: horseflex magnesiumcitraat, horseflex glucose support, horseflex jointpower, ijslandszeewier (merk onbekend)

→ **Stoppen met vitalbix. Voornamelijk omdat het organische mineralen bevat.**

Anorganisch betekent dat het lichaam zelf kan reguleren of er behoefte is om het mineraal op te nemen in het bloed. Hierdoor vind geen verstoring plaats in de stofwisseling van het paard, want het

zijn mineralen die van nature ook in het paardenlichaam zouden voorkomen. Bij organisch gebonden mineralen kan er geen regulatie van het lichaam plaatsvinden en worden alle mineralen zonder controle opgenomen in het bloed. Organisch gebonden mineralen zijn gebonden aan een aminozuur en aminozuren wil het lichaam altijd opnemen. Dit kan op lange termijn voor gezondheidsproblemen zorgen en zelfs zeer giftig kan zijn voor je paard. Selenium is zo'n mineraal dat vaak in organische vorm aan heel veel voeders toegevoegd wordt en giftig kan worden bij overschot (met als mogelijk resultaat IR, slechte/zwakke hoeven, overbelasting lever enz). Dit soort problemen ontstaan vaak pas op langere termijn, kan wel een jaar overheen gaan. Mocht er een aangetoond tekort zijn is organisch gebonden dus juist goed, omdat je zeker weet dat het paard het mineraal dan gaat opnemen, maar in andere gevallen niet. **Voor alle paarden relevant, maar een paard dat richting IR neigt nog belangrijker om dit echt ten allen tijde te vermijden in basisvoeding.**

→ **Stoppen met gehakseld ruwvoer geven (fibermix)**

Deze zijn vrijwel altijd gehakt in stengels van 1-3 cm welke te kort zijn om goed op te kunnen kauwen, maar te lang voor een goede passage door de darm. De stengels blijven daardoor tot wel een week (!) in de darmpassage, waardoor er een verkeerde fermentatie ontstaat in de dikke darm met gisting en verzuring tot gevolg. Paardenvoeders verkopen bovendien vaak alleen de stengels zonder blad en bloem, waardoor je eigenlijk gewoon cellulose voert (maw duur hooi & ellende).

→ **Stoppen met nutrimash** (*Timothee, Luzerne, Cichoreipulp (inuline vezels), Appelpulp (pectine vezels), Lijnzaad geplet (met natuurlijke anti-oxidanten), Lijnzaadolie, Erwtenvlokken, Brandnetel, Venkelzaad, Kamillekruid, Monocalciumfosfaat, B-vitaminen*)

→ **Appelpulp:** Is het restproduct uit de appelsap productie. Het wordt enkel toegevoegd als vulmateriaal en om het voer lekkerder te maken. Bestaat uit pectines en fructose die de dikke darm verzuren. Pectine zorgt voor de groei van bacteriën in de dikke darm die je juist niet wilt omdat ze de dikke darm zuur maken.

→ **Olie:** In het eerste deel van de dunne darm (duodenum) komen de alvleesklier en de lever uit en worden gal en alvleeskliersappen uitgescheiden. Een paard heeft geen galblaas zoals wij mensen hebben, al het gal wat een paard aanmaakt komt dus direct in de dunne darm terecht. Ook wordt er alvleeskliersap aangemaakt.

Alvleeskliersap bevat o.a. het enzym Lipase wat zorgt voor de vertering van vetten. Gal bevat galzuren en galzouten. Met name de galzouten zorgen voor het wateroplosbaar maken van vetten/vetzuren, zodat de enzymen weer hun werk kunnen doen. Echter wordt er veel te weinig gal aangemaakt om een scheut/plasje olie te kunnen emulgeren (fijnkneden). Dus wordt de olie niet voldoende wateroplosbaar gemaakt, kan het niet voldoende worden afgebroken door lipase en wordt dus gezien als gifstof en moet het via de huid worden uitgescheiden. Vandaar dat de vacht mooi gaat glanzen van veel olie voeren, niet omdat het werkelijk gezond is van binnenuit zoals veel mensen denken.

Olie verstoort daarnaast ook de opname van andere voedingsstoffen via de darmwand. Door de oliefilm kunnen ook de andere spijsverteringsenzymen hun werk niet goed uitvoeren en wordt de totale nutriënten opbrengst verminderd van al het gevoerde voer. Onverteerde olie die in de dikke darm terecht komt, beschadigt de darmflora. Met andere woorden: vetten kunnen maar heel slecht opgenomen worden door het paardenlichaam.

→ **Ik zou niet continu kruiden willen voeren vanuit zakvoeding. Af en toe een stopweek en liever nog kruiden gericht op het specifieke paard is effectiever en beter.**

→ **Stoppen met Horseflex glucose support** (*Artisjok, Brandnetel, Broccoli, Ceylon kaneel, Curcuma, Fenegriek, Gember, Hibiscus, Mariadistel, Monnikspeper, Peterselieblad, Rozemarijn, Saccharomyces cerevisiae (biergist), Salie, Spinazieblad, Varkensgras, Venkelzaad, Zoethout, Zwarte peper, Magnesium (als-chelaat)*)

Bevat artisjok en mariadistel welke echt gevaarlijk kunnen zijn om te voeren aan een paard waarbij de normale detoxificatie mogelijk niet goed verloopt. Bevat daarnaast ook biergist (zorgt voor verzuring). De PankrEMS uit protocol heeft deels hetzelfde doel als dit supplement.

→ IJslands zeewier los aanbieden in bakjes ipv door basisvoeding.

→ Magnesiumcitraat en jointpower lijken ok. Let op dat je stopperiodes inlast.

Wat extra uitleg over de maag

De paardenmaag 'verwacht' gedurende de hele dag een constante aanvoer van kleine beetjes voedsel. Volledig aangepast aan een natuurlijke situatie scheidt de maag daarom continu maagzuur af. Wanneer de maag langer dan 4-5u achter elkaar leeg is wordt door de continue maagzuurproductie en het gebrek aan minder zure inhoud de pH in de maag zo laag dat de maagwand aangetast raakt. Daarnaast wordt er door te weinig kauwactiviteit te weinig speeksel geproduceerd. Het speeksel van het paard bevat grote hoeveelheden natriumbicarbonaat (NaHCO_3), een stof die voor de maag belangrijke bufferende eigenschappen heeft. De speekselklieren van paarden worden alleen gestimuleerd door kauwen (mechanische stimulatie). Omdat het zoveel kauwactiviteit vraagt is ruwvoer dus een erg belangrijke en efficiënte manier om maagzweren te voorkomen! Per kilogram voer is een paard namelijk aanzienlijk langer bezig met ruwvoer dan met krachtvoer, waardoor de maag langer gevuld is. Dit is van belang, omdat er in de een lege maag een terugloop kan ontstaan. Hierbij stromen galzouten vanuit de dunne darm terug naar de maag en veroorzaken daar, in combinatie met het maagzuur, ernstige schade aan de maagwand.

Voor sommige paarden beginnen de maagproblemen al op veulenleeftijd; veel paarden ervaren heel veel stress bij het afspenen. Stress vermindert de bloedtoevoer naar de maag en zorgt bovendien voor de aanmaak van bepaalde stoffen die de maagwand gevoeliger maken. Doordat er minder bloed naar de maagwand gaat, is deze al gevoeliger voor het maagzuur. Paarden met langdurige stress hebben daarom meer kans op maagzweren.

Na een maagzweer (al dan niet in het verre verleden) blijft littekenweefsel over wat op zichzelf weer kwetsbaarder is dan een gezonde maagwand. Allerbelangrijkste is vastperiodes hanteren van max 3-4u.

Gedurende alle stappen

1. De allerbelangrijkste basis is +/- 2kg DS hooi per 100kg lichaamsgewicht onverpakt ruwvoer met maximaal 3-4u leegstand in de maag. Voor 500kg Nemo zou dat neerkomen op 10kg DS hooi per dag.

Op een (vol) grasland eet een pony ca. 2,5 – 3,5 kg vers gras per uur. Er zit 85% water en 15% DS in gras. Volgens voervergelijk eet een paard met graasmasker ca. 0,14% van zijn lichaamsgewicht in drie uur. Voor een pony van 500 kg betekent dit dus 0,70 kg droge stof in 3u. Voor 8u op het gras = 1.87kg droge stof.

Voor de aanbevolen 10kg DS - 1.87kg aan gras = nog 8.13kg DS hooi resterend.

Hooi bevat 80% DS dus dat zou nog 10kg gewogen hooi in het hooinet erbij zijn. Zonder graasmasker is de rekensom dus weer anders (ong. 3.6kg DS gras in 8u, dus dan nog ong. 8kg hooi gewogen in het hooinet erbij). Dit geeft je denk ik een goede richtlijn. Dit heeft een paard nodig om voldoende energie uit te kunnen halen en is veel belangrijker dan bijvoeding.

2. Omdat ons hooi in Nederland niet meer alle voedingsstoffen bevat is het daarnaast belangrijk om dit aan te vullen. Dat kan met een goede volwaardige vitamine/mineralenbrok zonder toevoegingen. Je zou 2/3x per jaar van soort kunnen wisselen, meng oud en nieuw voer dan wel altijd om langzaam over te gaan gedurende 2-3 weken.

Het is belangrijk dat je een balancer uitzoekt met anorganische mineralen (zie uitleg iets verderop).

Daarvan zijn er nog maar weinig op de markt, maar degene hieronder wel:

- [Timothee superfit Broxxx](#)

- [Mineraal puur p](#)

- [Esparcette superfit Broxxx](#)

3. Als vervanging van de nutrimash/fibremix als je iets extra wil/moet geven om de producten uit het protocol doorheen te mengen:

Om te weken:

- [Timotexxx](#)

- [Esparcette korrel](#)

Om structuur te bieden:

- [Luzerne](#)

Voor Nemo proberen onder de <7% totaal suiker&zetmeel gehalte te blijven!

Deze producten zijn dus, wanneer voorzien is 2-3kg hooi per 100kg lichaamsgewicht, niet nodig voor de voedingswaarden, maar mág je wel geven om het protocol beter te laten eten. Zo veel als nodig (ongeveer 300gr per dag aanhouden als max), maar zo min mogelijk. Ook dit voer weer langzaam introduceren over een week of 2.

Deze producten geef je het best geweekt zodat er een slobber ontstaat, op die manier wordt het protocol altijd het best gegeten. De bovenstaande gekozen balancer voeg je hier dan bij, maar als je die los geeft zonder één van bovenstaande toevoegingen week je deze ook om de producten uit het protocol goed te kunnen mengen.

4. **Extreem terughoudend zijn met voeren van suikers zoals fruit (appel/wortels) en snoepjes. Gedurende het protocol geen appel, banaan, meloen en ander suikerrijke beloningen.** Gezonde vervangers zijn bijvoorbeeld [rozenbottels](#) of [hennep bites](#) of denk aan een stukje komkommer, pastinaak of bleekselderij. Alles met mate!

Protocol Nemo

Het volgende advies is opgesteld adhv de anamnese:

Let op! Dit is een voorlopig advies en kan tussentijds nog aangepast/bijgestuurd worden.

Alle producten zijn voorzien van een hyperlink waardoor je direct naar een webshop gaat als je erop klikt.

Stap 1: Maag verzorgen en suikerstofwisseling ondersteunen

Week 1 t/m 6

Psylliumzaad (niet husk!) + bakingsoda (natriumbicarbonaat) Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater!	De slijmvorming geeft een beschermend laagje in de maag. Hierdoor wordt het maagslijmvlies beschermt tegen de invloeden van evt. stress en maagzuur. Daarnaast heeft vlozaad een positief effect op de bloedsuikerspiegel. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0737080611000748)	150gr psylliumZAAD + 1 eetlepel baking soda (natriumbicarbonaat) geven voor 6 weken door geweekte grasbrokjes van punt 3 hierboven en/of over de gekozen balancer (nat gemaakt), maar de kans is aanwezig dat die verhouding alleen nog niet lekker genoeg is en dat je ook iets uit punt 3 nodig hebt om te mengen. - Na 2 weken de bakingsoda verlagen naar ¾ eetlepel - Na 4 weken bakingsoda verlagen naar 0,5 eetlepel
---	--	---

Week 1 t/m 8

Kleefkruid + paardenbloem + weegbree <i>Dit is nog naast wat je dagelijks vers plukt en aanbieden ter vrije selectie</i>	Deze combinatie ondersteund onder andere de slijmvliezen, darmen, lymfen en bij het doorspoelen van dode afbraak cellen.	Dagelijks ca. 10-15 gram gedroogd per kruid gedurende 8 weken. <i>De paardenbloem + weegbree zijn grof gesneden dus zullen in volume meer zijn/liker dan het fijner gesneden kleefkruid.</i> <i>Zorg dat je steeds een combi van paardenbloem wortel/blad/bloem aan het bakje toevoegt!</i>
Schüsslerzout nr. 10 en nr. 27 (te koop bij online drogisterijen)	Bevorderen de spijsvertering en ondersteunt stofwisseling, de lever en de nieren.	De eerste 4 weken 2x daags 4 tabletten. De laatste 4 weken 2x daags 2 tabletten per dag. <i>Deze worden vaak goed uit de hand gegeten, dus je zou de eerste dosering uit de hand kunnen geven als je aankomt op stal en de andere door de voeding voordat je weggaat (of andersom).</i>

Zwavel (MSM) of deze variant	Ondersteund huid, haar en hoeven. Ondersteund pezen, banden, bindweefsel en kraakbeen. Draagt bij aan het behouden van de elasticiteit van het bindweefsel en kraakbeen.	1x daags 10gr over het voer. Totaal 8 weken geven door dagelijkse voeding. <i>Eerste 2 dagen ½ dosering, daarna gedurende de rest v/d week ophogen tot aanbevolen dosering.</i>
--	--	--

Week 2 t/m 13

PankrEMS	Ondersteunt de suikerstofwisseling.	1x daags 15 gram gedurende 3 maanden
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------

Hierna overleggen over door naar stap 2 of verlengen stap 1.


De PankrEMS blijf je langere tijd doorgeven, maar is nog geen eindstation.

Behandeling


Ik ben de behandeling begonnen door het openen van de blaasmeridiaan.

Je mag deze ook 2x per week zelf gaan afstrijken:

De blaasmeridiaan begint achter het oog, loopt dan over de poll (tussen de poll en het oor) en loopt vanaf daar langs de nek naar de schouders tot de croupe. Vanaf daar verlaat de blaasmeridiaan de toplijn en loopt hij verder over de achterhand, langs het achterbeen naar het tingpunt op de kroonrand. Om deze energiebaan te ondersteunen kan je met een vlakke hand de gehele lijn afstrijken. Ter hoogte van de rug splitst de blaasmeridiaan zich op, hier werk je dan ook met twee handen. Doe dit drie keer per kant, dit helpt de bloedsomloop in de blaasmeridiaan te activeren en te optimaliseren.



Daarna ben ik doorgegaan naar de cranio sacraal therapie. Het gedeelte van het zenuwstelsel dat zorgt voor actie, fight/flight reacties en dat ook bij stress actief is heet het sympatische zenuwstelsel. Dit is het tegenovergestelde van het parasympatische zenuwstelsel die onder andere zorgt voor ontspanning, herstel van het lichaam, afvoeren van afvalstoffen en het verteren van spijs. Deze twee kunnen niet tegelijk actief zijn. Dat betekent zodoende dat een paard onder invloed van (chronische) stress, onrust en nervositeit minder goed spijs zal verteren, minder goed werkt aan celvernieuwing, het afvoeren van afvalstoffen en herstel. De CST behandeling heeft (onder andere) als doel om de balans tussen deze twee systemen weer te herstellen en dus het parasympatische systeem te activeren. Ik heb de gehele core link (zie plaatje) behandeld.



Essentiële oliën

Aangeboden Marjolein (++), citroen (+/-), eucalyptus (--), ceder (--), jeneverbessolie (+/-)

Marjolein olie achtergelaten. Die mag je dagelijks laten ruiken zolang het zijn interesse heeft. Het kan gebeuren dat dat na een paar dagen ineens weg is, dat is prima. Dan even wegzetten en over een tijdje weer aanbieden.

Verwachting komende weken:

Deze eerste stap is heel erg opbouwend/ondersteunend. Ik verwacht in de eerste 6-8 weken nog geen (grote) verandering tov de meeste hulpvragen omdat dit de opstartfase is. Mijn advies zou zijn om met hem een Health Boost Traject te starten (duurt 3 maanden incl. verlenging protocol en ik kom ook 2x behandelen voor €597,- excl. reiskosten) óf in week 7 een digitaal consult te doen waarna ik het protocol weer voor 6-8 weken verleng voor €175,-).

Vervolgadvies:

- Voedingadviezen + protocol starten.
- Let op, er lopen verschillende stappen door elkaar heen, dus schrijf even goed uit wat je wanneer moet geven en voor hoe lang!
- Zelf wekelijks de blaasmeridiaan afstrijken
- Als je wil doorgaan in het health boost traject zou ik begin september weer willen behandelen. Laat dat even op tijd weten ivm volle agenda.
- Contact opnemen met bijv. Saskia Versluis voor de voeten.