



DEPAARDENTHERAPEUT
voor een fysiek & mentaal gezond paard

STITCH

Naam eigenaar	Rowie Bauer
Naam dier	Stitch
Ras en geslacht	KWPN, ruin, geboren 20 mei 2022 (4 jaar)
Gewicht en maat	Geschat 500-550kg, 167 cm
Conditie	Slank gebouwd, aan de dunne kant

HULPVRAAG

Sterke vermoedens van maagproblemen. De wens is om Stitch de juiste richting op te krijgen, zodat hij over 6 maanden zo gezond mogelijk is en geen last meer heeft van zijn maag. De signalen op een rij:

- Onrust in de vroege ochtend op vorige stal: rondjes lopen, veel gapen, alles in de mond stoppen;
- Boos of afwerend bij het opleggen van het zadel;
- Poging tot luchtzuigen (tanden op de waterleiding);
- Afvallen en periodes van een doffe vacht;
- Zijn lijf naar links gebogen houden, lijkt de maag te willen ontlasten;
- Snel mentaal vol tijdens training, in zichzelf keren en gapen.

(MEDISCHE) GESCHIEDENIS

Stitch is geboren op 20 mei 2022 en stond tot 6-7 maanden 24/7 buiten in een merriekudde. Hij is waarschijnlijk in één keer afgespeend toen de eigenaresse de moeder dichterbij wilde verhuizen. Daarna 5 a 6 maanden in de opfok, met ruwvoer en wat gras, op een terrein dat modderig en nat was. Rowie heeft hem sinds 3,5 jaar in bezit.

Belangrijk detail: de moeder had waarschijnlijk ook maagproblemen en deed veel gapen en luchtzuigen. Door de jaren heen is er al vaker vermoeden van maagzweren geweest bij Stitch. Op 23 juni 2026 is Stitch behandeld door een osteopaat, die spanning in de maagregio vaststelde. Sinds 20 juni staat hij op omeprazol (Ulcergold) en is zijn huisvesting aangepast naar 24/7 buiten.

Overige voorgeschiedenis

- 1x milde koliek, ongeveer 1,5 jaar geleden, bij de eerste koude nacht. Colosan gegeven, snel over;
- Rond oktober jaarlijks 2 weken wisselend dikke achterbenen, met beweging minder, binnen een week over;
- Eerder Mastic Horse gegeven (leek te werken bij het opzadelen) en een leverdetox met Phytonics, waarna lever strepen en singelnijd verdwenen;
- Laatste enting (influenza) begin/half mei viel zwaar: apathisch, hals niet kunnen buigen, na ca. 3 dagen hersteld;
- Gebit 2x per jaar, laatst 12 juni (iets scherp). Bekapper elke 7 a 8 weken, geen bijzonderheden, niet op ijzers.

HUDIGE SITUATIE

Voeding en vocht

Onbeperkt onverpakt hooi (kruidig, veel verschillende grassen, wat grover materiaal en bloemetjes ertussen, ingekocht, niet geanalyseerd), aangeboden in grote hooinetten met maas 5 cm. Daarnaast sinds kort 24/7 gras. Als bijvoeding Metazoa Fit Right Timothee (250 gram) en sinds de start van de omeprazol geen muesli of gastro-brok meer. Leidingwater in speciekuipen, hele dag toegang, geen bijzonderheden qua inname.

De grond wordt als arm omschreven, met veel uitgebloeide grassen en kruiden als zuring en duizendblad. Langs het land staan eiken en een den. Het perceel is 6000 m², waarvan ze nu de helft gebruiken.

Huisvesting en beweging

Sinds kort 24/7 buiten op gras inclusief hooi, samen met een leeftijdsgenoot (ruin, 4 jaar). Daarvoor overdag op de weide en 's nachts op stal (op stal nooit zonder hooi). Beweging ligt nu stil vanwege de verhuizing en het vermoeden op maagproblematiek. Er werd 1 a 2x per week rustig getraind, met lage intensiteit, tot 13 juni. Buitenlucht kalmeert hem opvallend snel: binnen 5 minuten op de paddock rustig, soms zelfs slapend.

Gedrag en karakter

Energiek, vrolijk, gevoelig, een echte clown. Stitch is de dominante van de twee, maar staat vaak samen te spelen en te kriebelen met zijn maatje. Loopt tijdens training snel mentaal vol, alles moet in kleine stapjes. Sinds de verhuizing naar buiten en de start van de omeprazol is de onrust en het gapen sterk afgenomen.

WAARSCHIJNLIJKHEIDSCONCLUSIE

Bij Stitch wijzen de signalen sterk in de richting van maagproblematiek, mogelijk in combinatie met een verminderde darmgezondheid. De onrust in de vroege ochtend, het veelvuldig gapen, de pogingen tot luchtzuigen, het afwerende gedrag bij het opzadelen en het naar links gebogen staan om de maagregio te ontlasten passen binnen dit beeld. Ook het snel mentaal vollopen tijdens de training, waarna hij zich afsluit en begint te gapen, kan erop wijzen dat lichamelijk ongemak en spanning elkaar versterken.

Sinds hij 24/7 buiten staat en omeprazol krijgt, zijn de onrust en het gapen duidelijk verminderd. Dat maakt het aannemelijk dat zowel maagzuur als stress, huisvesting en voermanagement een rol spelen. Rust, vrije beweging, sociaal contact en vrijwel constante toegang tot ruwvoer geven zijn maag en zenuwstelsel duidelijk meer stabiliteit.

Mogelijk ontstaan tijdens de opfok

Waarschijnlijk is er niet één losse oorzaak aan te wijzen, maar is Stitch op meerdere momenten belast geraakt. Zijn moeder liet vergelijkbare signalen zien, zoals gapen, luchtzuigen en vermoedelijke maagproblemen. Dat betekent niet dat maagzweren rechtstreeks erfelijk zijn, maar Stitch kan wel een aangeboren gevoeligheid hebben voor stress of een kwetsbaarder maagdarmstelsel hebben meegekregen.

Daar komt bij dat hij waarschijnlijk in één keer is afgespeend. Afspenen is voor een veulen een grote lichamelijke en emotionele overgang. De merrie valt weg, de voeding verandert en vaak veranderen tegelijkertijd de kudde, leefomgeving en dagelijkse routine. Door deze stress kunnen veulens tijdelijk minder eten, waardoor zij minder kauwen en minder speeksel produceren. Omdat speeksel het maagzuur helpt bufferen, kan de maagwand hierdoor sneller geïrriteerd raken.

In het bovenste, klierarme deel van de maag ontstaan beschadigingen vooral wanneer maagzuur de onbeschermdde maagwand bereikt. Lange eetpauzes, te weinig ruwvoer, onvoldoende kauwen en verkeerd voermanagement spelen daar vrijwel altijd een belangrijke rol in.

Ook in het onderste, klierrijke deel kunnen bij paarden maagbeschadigingen voorkomen. Dit deel van de maag is weliswaar gebouwd om met zuur om te gaan, maar is daarbij afhankelijk van een gezonde beschermlaag, een goede doorbloeding en voldoende herstelvermogen. Langdurige of hevige stress kan deze bescherming onder druk zetten. Glandulaire maagzweren kunnen daardoor hardnekkiger zijn en minder eenvoudig herstellen met alleen het onderdrukken van maagzuur.

We kunnen achteraf niet vaststellen of Stitch tijdens het afspenen daadwerkelijk maagzweren heeft ontwikkeld. Wel is het aannemelijk dat het abrupte afspenen een eerste grote belasting voor zijn maagsysteem is geweest. De periode met grof en arm hooi, waarvan hij te weinig at, kan deze kwetsbaarheid verder hebben vergroot. Zijn maag kreeg in die periode waarschijnlijk te weinig constante buffering en onvoldoende kwalitatief passend ruwvoer.

Een zichzelf versterkende cirkel

Maagpijn en stress kunnen vervolgens een vicieuze cirkel vormen. Pijn maakt een paard alerter, prikkelbaarder en gevoeliger voor zijn omgeving. Die spanning kan de eetlust, de maagbeweging en het herstel van het maagslijmvlies opnieuw negatief beïnvloeden. Ook tijdens het trainen kan Stitch daardoor sneller mentaal vollopen. Wat aan de buitenkant als gevoeligheid of afwerend gedrag wordt gezien, kan dus voor een belangrijk deel voortkomen uit lichamelijk ongemak.

Als er eerder langdurige of ernstige beschadigingen van de maagwand zijn geweest, kan bovendien littekenvorming zijn ontstaan. Niet iedere maagzweer laat blijvend littekenweefsel achter, maar een paard met een vermoedelijk maagzweerverleden blijft vaak wel gevoeliger wanneer dezelfde omstandigheden terugkeren. Lange eetpauzes, stress, pijn, voerveranderingen of onvoldoende passend ruwvoer kunnen dan sneller opnieuw klachten uitlokken.

Daarom is onbeperkte toegang tot geschikt ruwvoer bij Stitch geen tijdelijke maatregel, maar een essentieel onderdeel van zijn verdere management. Idealiter staat hij helemaal nooit zonder ruwvoer en zeker niet langer dan maximaal één uur. Iedere keer dat hij kauwt, maakt hij speeksel aan dat helpt om het maagzuur te bufferen.

Doel van het protocol

Een gezonde maag begint uiteindelijk niet bij medicatie, maar bij een stabiel maagdarmstelsel en management dat past bij de natuurlijke behoeften van het paard. Omeprazol verlaagt tijdelijk de zuurproductie en kan de maag daarmee de rust geven om te herstellen. Het herstelt echter niet automatisch de natuurlijke bescherm laag van de maag en neemt factoren als stress, pijn, een verstoorde darmgezondheid of lange eetpauzes niet weg.

Na het stoppen met omeprazol kan de zuurproductie tijdelijk weer sterker op gang komen. Dit wordt het reboundeffect genoemd. Hierdoor kunnen maagklachten kort na het stoppen opnieuw opspelen, terwijl de maagwand nog onvoldoende hersteld of beschermd is. Daarom stoppen we bij Stitch niet van de ene op de andere dag, maar bouwen we de omeprazol geleidelijk. Het doel hiervan is om de overgang zo rustig mogelijk te laten verlopen en de kans op terugkerende klachten zo veel mogelijk te beperken. Hoewel nog niet wetenschappelijk is aangetoond dat afbouwen dit reboundeffect bij paarden volledig kan voorkomen, kies ik hier vanuit voorzorg wel voor.

Het doel van dit protocol is daarom tweeledig. We beschermen en verzorgen het maagslijmvlies, terwijl we tegelijkertijd werken aan het voorkomen van omstandigheden die opnieuw de maag kunnen triggeren. Daarbij richten we ons op ruwvoer, darmgezondheid, rust, vrije beweging, sociale veiligheid en het uitsluiten van lichamelijke pijn.

Mocht een onderdeel van het advies praktisch niet haalbaar zijn, laat het dan weten. Dan kijken we samen welke aanpassing mogelijk is en wat dat betekent voor het verwachte herstel.

HET ADVIES, OPGESTELD AAN DE HAND VAN DE ANAMNESE

Let op: dit is een voorlopig advies en kan tussentijds aangepast of bijgestuurd worden.

Alle producten zijn voorzien van een hyperlink. je gaat direct naar de webshop als je erop klikt.

Gedurende alle stappen

1. De allerbelangrijkste basis is onbeperkt onverpakt ruwvoer zonder ruwvoervastperiodes (inclusief de nachten). Dit is bij een paard met een gevoelige maag echt méga belangrijk. Stitch staat nu 24/7 buiten met hooi, dat is super. Houd dit zo en zorg dat er nooit een gat valt.
2. Laat het hooi analyseren of vraag de analyse op. De streefwaarden zijn **7% suiker en eiwit 6 tot 9%**. Het kruidige hooi dat hij nu heeft klinkt goed, maar meten = weten. Zie bijlage voor extra uitleg over de opties, mogelijkheden en beperkingen van hooi analyseren.
3. In de afgelopen jaren heeft Sticht verschillende soorten bijvoer gekregen. Hoewel deze producten vaak als gezond worden gepresenteerd, bevatten ze ingrediënten die ik binnen mijn visie liever beperk of vermijd, zoals bietenpulp, grasmeel, luzerne, lijnzaadolie, gist en afhankelijk van het product ook granen of melasse. Bij een gevoelig paard kunnen deze ingrediënten mogelijk bijdragen aan een minder stabiele darmgezondheid. Ik zie dit niet als dé oorzaak van de klachten, maar wel als een factor die hebben meegespeeld binnen het totaalplaatje. Super goed dus dat je hiervan al bent overgestapt naar Metazoa!

4. Je huidige [Metazoa Fit Right Timothee](#) balancer kan gewoon blijven, circa 250 gram per dag. Dit is een prima basis met anorganische mineralen, wat betekent dat het lichaam zelf reguleert wat het opneemt.
5. Om het protocol doorheen te mengen kan je (indien nodig) [Metazoa Digestfit Esparcette](#), de timothee variant of [Okapi Heucobs](#) gebruiken, geweekt tot een slobber. Zo veel als nodig tot ca. 250-300 gram, maar zo min mogelijk.
6. Gedurende het protocol geen fruit, wortels of snoepjes. Suikers prikkelen de maag en verstoren de darmflora.
7. Vers groen toevoegen in [snacknetjes](#) of tijdens snackwandelingen: wilgentakken, weegbree, brandnetel, kamille. Wilg werkt van nature verzachtend op de maag. En de wandeling zelf is precies de rustige beweging en mentale ontspanning die Stitch goed doet.
8. Osteopaat of fysiek onderzoek blijven inzetten waar nodig. De spanning in de maagregio en het naar links gebogen staan mogen we blijven volgen. Als het opzadelgedrag na maagherstel blijft, is nader onderzoek naar de rug, lage hals of het zadel zinvol.

PROTOCOL STITCH

Start met een kwart tot halve dosering en bouw elk product rustig op naar de aanbevolen dosering gedurende de eerste week.

Direct starten: maag beschermen

Product	Waarom	Hoe geven
GasterCare forte	Beschermt en verzorgt het maagslijmvlies en ondersteunt het natuurlijke herstel van de maag.	2x, en als het lukt 3x, daags de aanbevolen dosering voor minimaal 3 maanden .
Psylliumzaad en Bio lijnzaad <i>Zorg altijd voor voldoende vers drinkwater.</i>	De slijmvorming legt een beschermend laagje in de maag tegen stress en maagzuur. Lijnzaad bevat naast slijmstoffen ook omega 3-vetzuren en lignanen, waardoor het breder ondersteunt dan alleen de slijmvorming.	Ochtend: 80-85 g biologisch lijnzaad (ongekookt gewogen). Avond: 80-85 g psylliumzaad laten meeweken met warm (niet kokend) water / timothee/esparcettebrok. Gedurende 8 weken.

Belangrijk voor de overgangperiode:

Geef de GasterCare en het psyllium- of lijnzaad in een **andere voerbeurt dan de omeprazol**. Minimaal 1 tot 2 uur na de omeprazol, omdat de slijmvormende gel de opname van het geneesmiddel kan beïnvloeden.

Neem direct contact op bij terugkerende signalen

Blijf tijdens en na het afbouwen goed kijken. Neem meteen contact op wanneer je opnieuw een of meer van deze signalen ziet:

- Verminderde eetlust, gapen, flemen of tandenknarsen;
- Kolieksymptomen of mestveranderingen;
- Duidelijk meer spanning of prikkelbaarheid;
- Luchtzuigen of singelnijd.

Los van de overige stappen

Week 2 t/m 9

Product	Waarom	Hoe geven
Zwavel (MSM) of deze variant	Ondersteunt pezen, banden, bindweefsel en kraakbeen. Draagt bij aan de elasticiteit van het bindweefsel. Ondersteunt daarnaast huid, haar en hoeven.	Aanbevolen dosering van de leverancier aanhouden voor een paard. Gedurende 8 weken.
Zink (Okapi Zinkchelaat Plus)	Ondersteunt de hoeven en de huid. Enzymen hebben zink nodig en ook het immuunsysteem is er sterk van afhankelijk.	1x daags 40 gram gedurende 8 weken.

Stap 1: Maagslijmvliesen verzorgen

Start met een kwart tot halve dosering en bouw elk product rustig op naar de aanbevolen dosering gedurende de eerste week.

Met code Paardentherapeut krijg je 5% korting boven de 35 euro bij D-tails.

Week 2 t/m 7

Product	Waarom	Hoe geven
Malva (blauwe kaasjeskruidbloemen) en Heemstwortel	Beide bevatten veel slijmstoffen die ontstekingsremmend en verzachtend werken op de spijsvertering. Heemst beschermt geïrriteerde maag- en darmslijmvlies, neutraliseert maagzuur en inactieveert galzouten. Precies wat een gevoelige maag als die van Stitch nodig heeft.	15 gram per kruid laten weken in circa 200 ml heet (net niet kokend) water, 20 tot 30 minuten, regelmatig doorroeren. Vocht plus restant kruid door de bijvoeding, bij voorkeur verdeeld over 2 voerbeurten. Gedurende 6 weken.

Stap 2: darmgezondheid ondersteunen

Week 3 t/m 4

Product	Waarom	Hoe geven
<u>Veendrenkstof</u> of de gedroogde variant <u>Colobalance</u> <i>Kies wat jij makkelijker vindt om te voeren (nat of droog).</i>	Versterkt de darmflora, legt een bescherm laag op het darmslijmvlies en ondersteunt de reinigende functie van de lever. Ideaal om het acute mestwater te kalmeren.	Veendrenk: 4el per dag. Colobalance: 50 gram per dag door de bijvoeding. Gedurende 14 dagen.

Week 4 t/m 9

Product	Waarom	Hoe geven
<u>Gemalen lapachoschors</u>	Ondersteunt het natuurlijke darmmilieu en helpt de darmflora zich te herstellen na jaren van verzuring.	1x daags 20 gram over het voer gedurende 6 weken.
<u>Smalle weegbree</u>	Ontlasting regulerend. Helpt overtollig vocht en afvalstoffen af te voeren.	1x daags 30 gram gedroogd door het voer. Gedurende 6 weken.
<u>Kamille</u>	Kamille werkt koelend en ontspannend op het zenuwstelsel, wat helpt ontkrampen. Daarnaast pakt het ontstekingen van de slijmvliezen aan draagt het daardoor bij aan herstel van maag en darmen.	1x daags 30 gram samen met de malva en heemstwortel mee laten weken. Vocht met restant kruiden gebruiken om de bijvoeding aan te maken. Gedurende 6 weken.
<u>Boswellia Serrata</u>	Werkt ontstekingswerend en anti-ulcerogeen op maagdarmslijmvliezen.	Ca. 6 gr per dag door de bijvoeding. Gedurende 6 weken.

In week 6 contact opnemen over de voortgang. Op basis daarvan bepalen we de vervolgstappen.

VERWACHTING EN VERVOLG

We werken op twee sporen tegelijk: de maag beschermen en verzachten met GasterCare, slijm uit de zaden en kruiden en tegelijk de onderliggende oorzaak aanpakken via ruwvoer, rust, ruimte en darmgezondheid.

De onrust en het gapen zijn sinds de verhuizing naar buiten al verdwenen. Dat is een belangrijk positief signaal en laat zien dat de verandering in huisvesting en management Stitch duidelijk goed doet. De focus ligt nu vooral op het ondersteunen van de maag- en darmgezondheid en het opbouwen van een stabiel systeem. Dat herstel kost meestal meerdere maanden. Geduld, rust en consistentie blijven daarom belangrijk.

Gun Stitch de komende weken vooral de tijd om lichamelijk verder tot rust te komen. Blijf samen leuke, laagdrempelige dingen doen, zoals wandelen, grondwerk of hersenwerk waarbij geen druk op presteren ligt. Wanneer je merkt dat hij hierin ontspannen blijft en zijn lichaam goed blijft aanvoelen, kun je het werk stap voor stap weer gaan opbouwen. Laat daarbij steeds zijn gedrag en herstel het tempo bepalen, niet de kalender.

Elke verandering die je ziet is waardevolle informatie, dus deel die vooral met me via Trello!

SAMENGEVAT DE ADVIEZEN

- Onbeperkt ruwvoer zondeer, ook 's nachts, dit is de kern;
- Hooi laten analyseren: suiker onder de 7%, eiwit 6 tot 9%;
- GasterCare en zaad altijd 1 tot 2 uur in een aparte voerbeurt van de Omeprazol geven;
- Omeprazol afbouwen volgens het schema in Trello;
- Direct contact opnemen bij terugkerende signalen (gapen, flemen, luchtzuigen, singelnijd, koliek, mestveranderingen);
- In week 6 een update sturen. Vragen tussendoor gewoon stellen en vergeet me niet te taggen. Succes!

Liefs, **Shelley**

WEEKPLANNER: WAT GEEF JE WANNEER

Print deze pagina en hang hem op stal. Elke bolletje-kleur vertelt je meteen wat je die week doet: licht = opbouwweek (kwart tot halve dosering), vol = volledige dosering. GasterCare loopt door minimaal 3 maanden, dus ook na week 9 gewoon doorgeven.

Product	Dosering	1	2	3	4	5	6	7	8	9
GasterCare forte	2-3x daags advies	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Psyllium / lijnzaad	2x 80-85g / dag	•	•	•	•	•	•	•	•	
MSM	advies leverancier		•	•	•	•	•	•	•	•
Zink	40g / dag		•	•	•	•	•	•	•	•
Malva + Heemstwortel	15g per kruid / dag		•	•	•	•	•	•		
Kamille	30g / dag		•	•	•	•	•	•		
Veendrenk / Colobalance	4 el. / 50g / dag			•	•					
Lapachoschors	20g / dag				•	•	•	•	•	•
Smalle weegbree	30g / dag				•	•	•	•	•	•
Boswellia Serrata	6g / dag				•	•	•	•	•	•

Omeprazol afbouwen: pas starten na twee weken volledige dosering GasterCare, volgens het 14-daagse schema in het protocol.

GasterCare en zaad altijd 1 tot 2 uur na de omeprazol, in een aparte voerbeurt.

Contactmoment: update in week 6.