

wooclay

①

Bij een willekeurige  $y = f(x)$  zal de beste benadering voor

$\int_a^b f(x) dx$  bereikt worden via

Answer submitted

$$\frac{b-a}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

$$(b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

$$\frac{b-a}{2} f(a+b)$$

Trapeziumregel

②

Hoeveel evaluatiepunten worden gebruikt bij een uitgebreide 3/8ste regel bij numerieke integratie? ( $n$  is een natuurlijk getal)


Answer submitted

$$3n$$

$$1 + 4n$$

$$4n$$

$$1 + 3n$$



7 40 oef (5)

bepaal de gewichten  $w_1$  en  $w_2$  zodat de benadering van de integraal van 0 tot 1  $\frac{1}{\sqrt{x}} f(x) dx$  door ... exact is voor de polynomen van graad 0 en 1

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} f(x) dx \approx w_1 f(0) + w_2 f(1)$$

$$\text{exact voor } f(x) = x^0 \Rightarrow \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x}} dx = w_1 + w_2$$

$$\text{exact voor } f(x) = x^1 \Rightarrow \int_0^1 \frac{x}{\sqrt{x}} dx = w_1 \cdot 0 + w_2 \cdot 1$$

$$\begin{cases} w_1 + w_2 = \left[ \frac{\sqrt{x}}{1/2} \right]_0^1 \\ w_2 = \left[ \frac{x^{3/2}}{3/2} \right]_0^1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} w_1 + w_2 = 2 \\ w_2 = \frac{2}{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} w_1 = \frac{4}{3} \\ w_2 = \frac{2}{3} \end{cases}$$

$$\textcircled{6} f'(x) \approx \frac{1}{2h} (f(x+h) - f(x-h))$$

$$f(x+h) = f(x) + hf'(x) + \frac{h^2}{2!} f''(x) + \frac{h^3}{3!} f'''(x) + \dots$$

$$f(x-h) = f(x) - hf'(x) + \frac{h^2}{2!} f''(x) - \frac{h^3}{3!} f'''(x) + \dots$$

$$\Rightarrow \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

$$= \frac{1}{2h} (2hf'(x) + \frac{2}{6}h^3 f'''(x) + \dots)$$

$$= f'(x) + \frac{h^2}{6} f'''(x) + \dots$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\text{fout}}$

$$\textcircled{3} \quad \int_0^1 e^{-\frac{x^2}{2}} dx$$

\* Trapeziumregel

$$(b-a) \frac{f(a) + f(b)}{2}$$

$$= 1 \cdot \frac{1 + \frac{1}{\sqrt{e}}}{2} = 0,80326.$$

\* Parabelregel

$$\left(\frac{b-a}{2}\right) \frac{f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)}{3}$$

$$x_0 = a \quad x_2 = b$$

$$x_1 = \frac{b-a}{2} + a$$

$$\frac{1}{6} \left( 1 + \frac{4}{e^{1/2}} + \frac{1}{\sqrt{e}} \right) = 0,856086... = \frac{1}{2}$$

\* 3/8 regel

$$\frac{3h}{8} (f(x_0) + 3f(x_1) + 3f(x_2) + f(x_3))$$

$$h = \frac{b-a}{3}$$

$$h = \frac{1}{3}$$

$$= \frac{1}{8} \left( 1 + \frac{3}{e^{1/2}} + \frac{3}{e^{4/2}} + \frac{1}{\sqrt{e}} \right)$$

$$x_1 = \frac{1}{3}$$

$$\approx 0,8558$$

$$x_2 = \frac{2}{3}$$

