

Falls $0 \leq b_n \leq a_n$, konvergiert auch $\sum b_n$.
Falls $a_n \geq 0$ und $\sum a_n$ divergent: $\sum a_n = \infty$.

Absolute Konvergenz

Def. $\sum a_k, a_n \in \mathbb{C}$, heisst **absolut konvergent**, falls $\sum |a_k|$ konvergiert.

Satz. Eine absolut konvergente Reihe ist konvergent, und $|\sum_{k=1}^\infty a_k| \leq \sum_{k=1}^\infty |a_k|$ (verallg. Dreiecksungl.).

Bem. bedingt konvergent: konvergiert, aber nicht absolut.

Konvergenzkriterien

Kor. (Vergleichssatz) $0 \leq a_k \leq b_k \forall k \geq K$:
i) $\sum b_k$ konv. $\implies \sum a_k$ konv.
ii) $\sum a_k$ div. $\implies \sum b_k$ div.
(Majoranten- / Minorantenkriterium)

Satz. (Leibniz) (a_n) monoton fallend, $a_n \geq 0$, $\lim a_n = 0$. Dann konvergiert $S := \sum_{k=1}^\infty (-1)^{k+1} a_k$ und $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$. Restglied: $|\sum_{k=n+1}^\infty (-1)^{k+1} a_k| \leq a_{n+1}$.

Def. Eine Umordnung von $\sum a_k$ ist $\sum a_{\sigma(k)}$ mit einer Bijektion $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$.

Satz. (Dirichlet) Konvergiert eine Reihe absolut, so konvergiert jede Umordnung mit demselben Grenzwert ($\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ bijektiv).

Satz. (Riemann) Konvergiert die Reihe bedingt (d.h. konvergent, aber nicht absolut), so gibt es zu jedem $x \in \mathbb{R}$ eine Anordnung mit $\sum a_{\sigma(k)} = x$.

Quotientenkriterium: $a_n \neq 0$, $\limsup |\frac{a_{n+1}}{a_n}| < 1 \implies$ abs. konv.; $\liminf |\frac{a_{n+1}}{a_n}| > 1 \implies$ div. Äquiv. mit lim.

Wurzelkriterium: $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \implies$ abs. konv.; $> 1 \implies$ div.

Verdichtungskriterium (Cauchy): (a_n) monoton fallend, $a_n \geq 0$: $\sum a_n$ konv. $\iff \sum 2^n a_{2^n}$ konv.

Bsp. $a_n = \frac{z^n}{n!}$: $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| = |\frac{z}{n+1}| < 1$ für $n > |z| \implies \sum \frac{z^n}{n!}$ konvergiert.

Potenzreihen

Form $\sum_{k=0}^\infty c_k (x-a)^k = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$ (Entwicklungspunkt a).

Def. Der Konvergenzradius R entspricht:
$$R = \begin{cases} +\infty & \text{falls } \rho = 0 \\ 1/\rho & \text{falls } \rho > 0 \\ 0 & \text{falls } \rho = \infty \end{cases} \quad \rho = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}$$

Alternativ: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} |c_n|/|c_{n+1}|$.

Kor. $\sum c_k (x-a)^k$ konvergiert absolut für $|x-a| < R$, divergiert für $|x-a| > R$.

Fall $|x-a| = R$ separat prüfen.

Satz. Potenzreihe $f(x) = \sum c_k x^k$ mit $R > 0$ konvergiert gleichmässig auf $[-r, r]$ für alle $r < R$; $f : (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig.

Doppelreihen

Bei $(a_{ij})_{i,j \geq 0}$ können $\sum_i \sum_j a_{ij}$ und $\sum_j \sum_i a_{ij}$ verschiedene Grenzwerte haben.

Konvergiert $\sum_{i,j} a_{ij}$ absolut, sind beide gleich und jede Anordnung konvergiert dazu.

Das Cauchy Produkt

Def. Cauchy-Produkt von $\sum a_i, \sum b_j$:
$$\sum_{n=0}^\infty \sum_{j=0}^n (a_{n-j} b_j) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) + \dots$$

Konvergiert (mind.) eine der beiden Reihen absolut, konvergiert auch das Produkt gegen $(\sum a_i)(\sum b_j)$.

Satz. Sei $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ mit
i) $f(j) := \lim_n f_n(j)$ existiert $\forall j$
ii) $\exists g : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty)$ mit $|f_n(j)| \leq g(j)$ und $\sum g(j)$ konv.
Dann $\sum_j f(j) = \lim_n \sum_j f_n(j)$.

Integral Test

Sei f stetig, positiv, monoton fallend auf $[k, \infty)$, $f(n) = a_n$:

$$\int_k^\infty f(x) dx \text{ konv. } \iff \sum_{n=k}^\infty a_n \text{ konv.}$$

(Analog für Divergenz.)

Strategie – Konvergenz von Reihen

- Spezielle Reihe? (Geometrisch, Teleskop, Harmonisch, Zeta)
- $\lim a_n = 0$? (Nullfolgenkriterium)
- Fakultäten oder Exponentialausdrücke: Quotientenkriterium.
- Terme mit einer n -ten Potenz: Wurzelkriterium.
- Positive Terme: Vergleichs- oder Integraltest.
- Alternierende Reihe: Leibnizkriterium.
- Konvergenter Majorant / divergenter Minorant?
- Integral Test?
- Danach immer absolute Konvergenz separat prüfen.

Stetigkeit und Funktionen

Definitionen

Def. $D \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in D$. $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist **stetig** in x_0 , falls $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $\forall x \in D$:
$$|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

Alternativ (Folgenstetigkeit): $\forall (a_n) \rightarrow x_0$ gilt $f(\lim a_n) = f(x_0) = \lim f(a_n)$.

Def. f ist **stetig**, falls sie in jedem Punkt von D stetig ist.

Gleichmässige Stetigkeit: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D : |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Auf kompaktem Intervall stetig $\implies$ dort gleichmässig stetig.

Rechnen mit Stetigkeit

f, g in x_0 stetig, $\lambda \in \mathbb{R}$:

- i) $f + g, \lambda f, f \cdot g$ stetig in x_0
- ii) $g(x_0) \neq 0 \implies \frac{f}{g}$ stetig in x_0
- iii) $|f|, \max(f, g), \min(f, g)$ stetig
- iv) Polynome sind auf ganz $\mathbb{R}$ stetig
- v) $\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig
- vi) e^x auf ganz $\mathbb{R}$ stetig
- vii) P, Q Polynome, $Q \neq 0$, Nullstellen $x_1, \dots, x_m$: $\frac{P}{Q}$ stetig auf $\mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_m\}$
- viii) f in x_0, g in $f(x_0)$ stetig $\implies g \circ f$ in x_0 stetig

Zwischenwertsatz

Satz. Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $a, b \in I$. Für jedes c zwischen $f(a)$ und $f(b)$ gibt es z zwischen a, b mit $f(z) = c$.

Anwendungen:

- i) $f(a)f(b) < 0 \implies \exists c : f(c) = 0$
- ii) Polynom mit ungeradem Grad hat mind. eine reelle Nullstelle

Min-Max Satz

Def. $I \subseteq \mathbb{R}$ **kompakt**, falls $I = [a, b]$ mit $a \leq b$.

Satz. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\implies \exists u, v \in I$ mit $f(u) \leq f(x) \leq f(v) \forall x \in I$. Insbesondere ist f beschränkt.

Satz der Umkehrabbildung

Satz. $I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, streng monoton. Dann ist $f(I) =: J$ ein Intervall und $f^{-1} : J \rightarrow I$ stetig, streng monoton.

Bsp. $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), x \mapsto x^n$ hat Umkehrung $x \mapsto \sqrt[n]{x}$.

Konvergenz von Funktionenfolgen

Def. Eine **Funktionenfolge** ist eine Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^D, n \mapsto f_n$ (d.h. jedes $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}; \mathbb{R}^D =$ Menge aller Funktionen $D \rightarrow \mathbb{R}$). Für festes $x \in D$ ist $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ eine gewöhnliche Folge.

(f_n) konvergiert **punktweise** gegen f , falls $\forall x : f(x) = \lim f_n(x)$, d.h. $\forall \varepsilon, \forall x, \exists N, \forall n \geq N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

(f_n) konvergiert **gleichmässig** gegen f , falls $\forall \varepsilon, \exists N, \forall n \geq N, \forall x : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Bem. gleichmässig $\implies$ punktweise, nicht umgekehrt.

Satz. f_n stetig und gleichmässig $\rightarrow f \implies f$ stetig. (Für punktweise i.A. nicht.)

Strategie – Konvergenz von Funktionenfolgen

1. Punktweisen Limes f auf D finden.
2. Auf gleichmässige Konvergenz prüfen:
 - Indirekt: f unstetig $\Rightarrow$ nicht gleichmässig; f_n & f stetig, (f_n) monoton in n , D kompakt $\Rightarrow$ gleichmässig (Dini).
 - Direkt: $\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)|$ berechnen (evtl. Ableitung = 0), dann $\lim_{n \rightarrow \infty}$; ist er 0, konvergiert f_n gleichmässig.

Konvergenz von Funktionenreihen

Def. $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ konvergiert gleichmässig, falls $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$ gleichmässig konvergiert.

Satz. (Weierstrass-M) f_n stetig, $|f_n(x)| \leq c_k \forall x$. Konvergiert $\sum c_k$, so konvergiert $\sum f_k(x)$ gleichmässig gegen eine stetige Funktion f .

Differentialrechnung

Grenzwerte von Funktionen

$x_0 \in \mathbb{R}$ ist **Häufungspunkt** von D falls $\forall \delta > 0 : ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) \cap D \neq \emptyset$.

Sei x_0 Häufungspunkt von D . $A \in \mathbb{R}$ ist **Grenzwert** von $f(x)$ gegen x_0 , falls $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $\forall x \in D \cap ((x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}) : |f(x) - A| < \varepsilon$

Satz. (a_n) beschränkt:

- i) hat mind. einen Häufungspunkt
- ii) genau einer $\Rightarrow$ konvergiert dagegen

Bem.

- i) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \iff \forall (a_n) \in D \setminus \{x_0\}, a_n \rightarrow x_0 : f(a_n) \rightarrow A$
- ii) $x_0 \in D: f$ stetig $\iff \lim_{x \rightarrow x_0} f = f(x_0)$
- iii) $\lim(f + g) = \lim f + \lim g$
- iv) $\lim(fg) = \lim f \cdot \lim g$
- v) $f \leq g \Rightarrow \lim f \leq \lim g$
- vi) Sandwich

Satz. $y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, g stetig in $y_0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(y_0)$.

Linksseitiger / Rechtsseitiger Grenzwert

Existiert der Grenzwert von f eingeschränkt auf $D \cap (x_0, +\infty)$ für $x \rightarrow x_0$, heisst er $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ (rechtsseitig). Analog linksseitig. Erweiterung: $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f = +\infty$ falls $\forall \varepsilon \exists \delta \forall x \in D \cap (x_0, x_0 + \delta) : f(x) > \frac{1}{\varepsilon}$ (analog $-\infty$).

Differenzierbarkeit

Sei $x_0 \in D$ Häufungspunkt. f ist in x_0 **differenzierbar**, falls

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

existiert; Wert $f'(x_0)$ bzw. $\frac{df}{dx}(x_0)$.

Satz. (Weierstrass) Äquivalent zur Differenzierbarkeit: $\exists c \in \mathbb{R}, r : D \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f(x) = f(x_0) + c(x - x_0) + r(x)(x - x_0)$, $r(x_0) = 0$, r stetig in x_0 . Dann $c = f'(x_0)$ eindeutig.

Kor. f diff.bar in $x_0 \Rightarrow f$ stetig in x_0 . **Bem.** Tangente: $y = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

Kor. $f : D \rightarrow E$ bijektiv, in x_0 diff.bar, $f'(x_0) \neq 0$, f^{-1} stetig in $y_0 = f(x_0)$. Dann $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}$.

Rechnen mit Ableitungen

- i) $(f + g)' = f' + g'$
- ii) $(f \cdot g)' = f'g + g'f$
- iii) $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}, g \neq 0$
- iv) $(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$
- v) $(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}, y_0 = f(x_0)$
- vi) $(a^{f(x)})' = \ln(a) \cdot a^{f(x)} \cdot f'(x)$
- vii) $(f^g)' = f^g \cdot [\ln(f) \cdot g']$

Bem. Für gerade k : $\cosh^{(k)} = \cosh$; ungerade k : $\cosh^{(k)} = \sinh$ (analog $\sinh$).

Aussagen der Ableitung

- i) lok. Maximum in x_0 : $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) < 0$
- ii) lok. Minimum in x_0 : $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) > 0$
- iii) lok. Extremum: $f'(x_0) = 0$ und $f''(x_0) \neq 0$
- iv) Wendepunkt: Das Krümmungsverhalten wechselt bei x_0 . Falls f'' stetig ist, wechselt f'' dort das Vorzeichen.
- v) Sattelpunkt: Wendepunkt mit waagrechter Tangente, also zusätzlich $f'(x_0) = 0$.

Für $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, in (a, b) diff.bar:

- i) $f' = 0$ auf $(a, b) \Rightarrow f$ konstant
- ii) $f' = g'$ auf $(a, b) \Rightarrow f = g + c$
- iii) $f' \leq [<]0 \Rightarrow f$ [streng] monoton fallend
- iv) $f' \geq [>]0 \Rightarrow f$ [streng] monoton wachsend

Satz von Rolle

Satz. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, in (a, b) diff.bar, $f(a) = f(b) \Rightarrow \exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = 0$.

Mittelwertsatz

Satz. f stetig, in (a, b) diff.bar $\Rightarrow \exists \xi : f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$.

Bem. $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

Satz von L'Hospital

Verallg. MWS: $g'(\xi)(f(b) - f(a)) = f'(\xi)(g(b) - g(a))$.
Ist $g' \neq 0$: $\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$.

Satz. Falls $\lim_{x \rightarrow b} f = 0, \lim_{x \rightarrow b} g = 0$ und $\lim_{x \rightarrow b} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda$ existiert, dann
$$\lim_{x \rightarrow b} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow b} \frac{f'(x)}{g'(x)} = \lambda$$

Gilt auch für $b = +\infty, x \rightarrow a^+, \lambda = +\infty, \lim f = \lim g = \infty$.
Form „ $\frac{\infty}{\infty}$ “: umschreiben; „ $0 \cdot \infty$ “: $\frac{f}{g}$; „ $\infty - \infty$ “: gleicher Nenner.

Krümmungsverhalten: Konvexität und Konkavität

Sei $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

Def. f ist [streng] **konvex** auf I , falls für alle $x, y \in I$ und $\lambda \in [0, 1]$ gilt:
$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq [\leq] \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Der Graph liegt zwischen zwei Punkten unterhalb der Verbindungsgeraden.

Def. f ist [streng] **konkav** auf I , falls für alle $x, y \in I$ und $\lambda \in [0, 1]$ gilt:
$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \geq [\geq] \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y).$$

Der Graph liegt zwischen zwei Punkten oberhalb der Verbindungsgeraden.

Falls f differenzierbar ist:
 f konvex $\iff f'$ monoton wachsend,
 f konkav $\iff f'$ monoton fallend.

Falls f zweimal differenzierbar ist:
 f konvex $\iff f'' \geq 0$, f streng konvex $\iff f'' > 0$,
 f konkav $\iff f'' \leq 0$, f streng konkav $\iff f'' < 0$.

Kor. Für $x_0 < x < x_1$ gilt:
 f konvex $\iff \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(x)}{x_1 - x}$,

bei Konkavität gilt das umgekehrte Ungleichheitszeichen.
Bem. Summen konvexer Funktionen und nichtnegative Vielfache konvexer Funktionen sind konvex. Analog für konkave Funktionen.

Wendestelle
Eine Stelle x_0 ist eine Wendestelle, wenn sich das Krümmungsverhalten dort ändert:
 f'' wechselt bei x_0 das Vorzeichen.
Die Bedingung $f''(x_0) = 0$ allein ist nur notwendig, aber nicht hinreichend.

Höhere Ableitungen

- i) f ist n -mal diff.bar in D , falls $f^{(n-1)}$ diff.bar ist. n -mal diff.bar $\Rightarrow$ $(n-1)$ -mal stetig diff.bar.
ii) f **glatt**, falls $\forall n \geq 1$ n -mal diff.bar.

Bem. Polynome, e^x , $\sin$, $\cos$ sind glatt.

Rechnen:

- i) $(f+g)^{(n)} = f^{(n)} + g^{(n)}$
ii) $(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}$
iii) $\frac{f}{g}$ n -mal diff.bar falls $g \neq 0$
iv) $g \circ f$ n -mal diff.bar

Potenzreihe (Ableitung)

Satz. f_n einmal stetig diff.bar; $(f_n) \rightarrow f$ und $(f_n') \rightarrow p$ gleichmässig $\Rightarrow f$ stetig diff.bar mit $f' = p$.

Satz. $f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k (x-x_0)^k$, Konvergenzradius $R > 0$, ist auf $(x_0 - R, x_0 + R)$ diff.bar mit

$$f'(x) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot c_k (x-x_0)^{k-1}$$

Taylor Approximation

Satz. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, in (a, b) $(n+1)$ -mal diff.bar. $\forall a < x \leq b \exists \xi \in (a, x)$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \underbrace{\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}}_{R_n}$$

T_n : Taylor-Polynom, R_n : Fehlerabschätzung.

Satz. (Integral-Restterm) Ist f auf $[a, b]$ $(n+1)$ -mal stetig diff.bar, so gilt $\forall x \in [a, b]$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \underbrace{\int_a^x \frac{f^{(n+1)}(s)}{n!} (x-s)^n ds}_{R_n}$$

Für R_n nimm $\xi \in (a, x)$ so dass Fehler maximal.

Spezielle Punkte

- $f'(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$:
- i) n gerade, x_0 lok. Extremalstelle $\Rightarrow f^{(n+1)}(x_0) = 0$
ii) n ungerade, $f^{(n+1)}(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ strikte lok. Minimalstelle
iii) n ungerade, $f^{(n+1)}(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ strikte lok. Maximalstelle

Integralrechnung

Treppenfunktion

Def. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **Treppenfunktion**, falls es eine Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ gibt, sodass f auf jedem offenen Teilintervall (x_{k-1}, x_k) konstant ist (Wert c_k).

Integral der Treppenfunktion:

$$\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$$

Das Riemann Integral

Eine **Zerlegung** P von $I = [a, b]$ ist endliche Teilmenge $P \subseteq [a, b]$ mit $\{a, b\} \subseteq P$. δ_i : Länge von $[x_{i-1}, x_i]$.

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n f_i \delta_i, f_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad U(f, P) = \sum_{i=1}^n F_i \delta_i, F_i = \sup_{[x_{i-1}, x_i]} f$$

Verfeinerung P' : $L(f, P) \leq L(f, P') \leq U(f, P') \leq U(f, P)$.

$$L(f) = \sup_P L(f, P), \quad U(f) = \inf_P U(f, P).$$

Satz. Eine beschränkte Funktion ist **Riemann-integrierbar**, falls $L(f) = U(f)$:

$$L(f) = \int_a^b f(x) dx = U(f)$$

Äquiv.: $\forall \varepsilon > 0 \exists P : U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$.

Integrierbarkeit schnell zeigen

- i) f stetig auf $[a, b] \Rightarrow f$ integrierbar
ii) f monoton $\Rightarrow f$ integrierbar
iii) f, g integrierbar $\Rightarrow f+g, \lambda f, fg, |f|$, max, min und $\frac{f}{g}$ (falls $|g| \geq \beta > 0$) integrierbar
iv) Jedes Polynom auf $[a, b]$; auch $\frac{P}{Q}$ falls Q nullstellenfrei
v) Unterschied auf endlicher Menge ändert Integrierbarkeit nicht

Rechnen mit Integralen

$$\int_a^b (\lambda_1 f + \lambda_2 g) dx = \lambda_1 \int_a^b f dx + \lambda_2 \int_a^b g dx$$
$$\int_{a+c}^{b+c} f(x) dx = \int_a^b f(t+c) dt, \quad \int_a^b f(ct) dt = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x) dx$$

Ungleichungen und Mittelwertsatz

- i) $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$
ii) $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$
iii) $|\int_a^b fg| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2}$ (Cauchy-Schwarz)

Satz. $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\Rightarrow \exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$.

Folgt: $g \geq 0$ beschränkt integrierbar, f stetig $\Rightarrow \exists \xi : \int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$.

Fundamentalsatz der Analysis

Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ stetig diff.bar mit $F'(x) = f(x) \forall x \in [a, b]$.

F heisst **Stammfunktion** von f (bis auf additive Konstante eindeutig) und $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

Partielle Integration

f, g stetig diff.bar:

$$\int_a^b fg' dx = [fg]_a^b - \int_a^b f'g dx$$

Wahl von f (absteigende Priorität):

- arc-/log-Fkt., x^n , $\frac{1}{1-x^2}$, $\frac{1}{1+x^2}$
- x^n , $\arcsin$, $\arccos$, $\arctan$
- „egal“: e^x , $\sin$, $\cos$, $\sinh$, $\cosh$

Substitution

$\varphi: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig diff.bar, $\varphi([a, b]) \subseteq I$, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig:

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) dx$$

Bsp. $\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$, $t = \sqrt{9-x^2} \Rightarrow dx = -t dt / \sqrt{9-t^2} \Rightarrow \int -dt = -t$, rücks. $-\sqrt{9-x^2}$.

Nützliche Substitutionen:

- i) e^x , $\sinh$, $\cosh$: $t = e^{ax}$, $dx = \frac{dt}{at}$
ii) $\log(x)$: $t = \log x$, $x = e^t$, $dx = e^t dt$
iii) gerade n : $t = \tan x$, $\sin^2 = \frac{t^2}{1+t^2}$, $\cos^2 = \frac{1}{1+t^2}$
iv) ungerade n : $t = \tan(\frac{x}{2})$, $\sin = 2 \frac{t}{1+t^2}$, $\cos = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
v) $\int \sqrt{1-x^2}$: $x = \sin$ oder $\cos$
vi) $\int \sqrt{1+x^2}$: $x = \sinh$

Strategie – Berechnung von Integralen

Bruchform:

- einfacher Nenner
- Partialbruchzerlegung
- $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ oder $\frac{u'}{u}$ erkennen $\Rightarrow \sqrt{u}$ oder $\log|u|$

Produktform:

- partielle Integration (evtl. mehrmals)
- Kettenregel

Potenzen: $\int f^c = \int (f^c \cdot 1)$ oder $\int (f^{c-1} \cdot f)$, dann part. Int.

Exponentenform: $\frac{e}{\log}$ -Trick bei Variable im Exponenten.

Produkt mit e, sin, cos: mehrmals part. Int. ($\sin, \cos$ als g' , e als f).

Summe im Integral: herausziehen (Reihe muss gleichmässig konvergieren).

$$\int \cos^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int \cos^{n-2} x \, dx + \frac{\cos^{n-1} x \sin x}{n}$$

$$\int \sin^n x \, dx = \frac{n-1}{n} \int \sin^{n-2} x \, dx - \frac{\cos x \sin^{n-1} x}{n}$$

Wallis'sche Integrale

$$W_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x \, dx$$

Rekursion (aus Reduktionsformel): $W_n = \frac{n-1}{n} W_{n-2}$, $W_0 = \frac{\pi}{2}$, $W_1 = 1$.

$$W_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \quad W_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!}$$

(W_n) ist streng monoton fallend, $W_n > 0$, und $W_n W_{n-1} = \frac{\pi}{2n}$.
 $W_n \cdot W_{n+1} = \frac{\pi}{2(n+1)}$; asymptotisch $W_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{W_{n+1}}{W_n} = 1$.

Bem. (Wallis-Produkt)

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{2n-1} \cdot \frac{2n}{2n+1} = \frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdot \frac{6}{5} \cdots$$

Bogenlänge

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (f'(x))^2} \, dx$$

(Un)gerade Funktionen

f **gerade**: $f(-x) = f(x)$; **ungerade**: $f(-x) = -f(x)$.

Bekannte Taylorreihen

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\sinh x = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \dots = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\cosh x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{(2k)!}$$

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

$$\tanh x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} - \dots$$

$$\log(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k}$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \frac{7x^5}{256} - \dots$$

Typische Grenzwerte / Folgen

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x}) = 1$
$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{x})^x = \frac{1}{e}$
$\lim_{x \rightarrow \infty} x^a q^x = 0, 0 \leq q < 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{k}{x})^{mx} = e^{km}$	$\lim_{x \rightarrow 0} x \log x = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arctan x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+k}\right)^x = e^{-k}$	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x^a} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{x^2} = \infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2^-}} \tan x = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$
$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2^-}} \tan x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$

Typische Reihen

$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$	$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$	

Geometrisch: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$; für $|q| < 1$: $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$.

Harmonisch: $\sum \frac{1}{n}$ divergent, alternierend konv.

Zeta: $\zeta(s) = \sum \frac{1}{n^s}$ konv. für $s > 1$.

Teleskop: $\sum \log\left(\frac{n}{n+1}\right) = -\infty$.

Ableitungen & Stammfunktionen

$F(x)$	$F'(x) = f(x)$
c	0
x^a	$a x^{a-1}$
$\frac{1}{a+1} x^{a+1}$	x^a

$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$x^\alpha, \alpha \neq -1$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$
$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{x}$
e^x	e^x
$\ln x $	$\frac{1}{x}$
$\log_a x $	$\frac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x$
$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2 x}$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2 x} = 1 - \tanh^2 x$
$\operatorname{arcsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\operatorname{arccosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arctanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\frac{1}{f(x)}$	$-f' \frac{x}{(f(x))^2}$
a^{cx}	$a^{cx} c \ln a$
x^x	$x^x(1 + \ln x)$
$\frac{1}{a} \ln(ax+b)$	$\frac{1}{ax+b}$
$\frac{1}{2a} \ln\left \frac{x-a}{x+a}\right $	$\frac{1}{x^2-a^2}$
$\frac{x}{2} \sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln\left(x + \sqrt{a^2+x^2}\right)$	$\sqrt{a^2+x^2}$
$\frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$	$\sqrt{a^2-x^2}$
$\frac{x}{2} \sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2} \ln\left(x + \sqrt{x^2-a^2}\right)$	$\sqrt{x^2-a^2}$
$\ln(x + \sqrt{x^2 \pm a^2})$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$

$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$	$\frac{1}{x^2+a^2}$
$-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$	$\sin(ax+b)$
$\frac{1}{a} \sin(ax+b)$	$\cos(ax+b)$
$-\ln \cos x $	$\tan x$
$\ln \sin x $	$\cot x$
$\ln\left \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right $	$\frac{1}{\sin x}$
$\ln\left \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right $	$\frac{1}{\cos x}$
$\frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$	$\sin^2 x$
$\frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$	$\cos^2 x$
$\tan x - x$	$\tan^2 x$
$-\cot x - x$	$\cot^2 x$
$x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$	$\arcsin x$
$x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$	$\arccos x$
$x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$	$\arctan x$
$\ln(\cosh x)$	$\tanh x$
$\ln f(x) $	$f' \cdot \frac{x}{f(x)}$
$x(\ln x - 1)$	$\ln x $
$\frac{e^{cx}(c \sin(ax+b) - a \cos(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{cx} \sin(ax+b)$
$\frac{e^{cx}(c \cos(ax+b) + a \sin(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{cx} \cos(ax+b)$

Differentialgleichungen

Def. Eine (gewöhnliche) DGL (ODE) der Ordnung n : $F(u(t), u'(t), \dots, u^{(n)}(t), t) = 0$.

t : unabhängige, u : abhängige Variable.

Lineare DG: $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = s(x)$.

$s \equiv 0$: homogen, sonst inhomogen. Ordnung = höchste Ableitung.

Zwei Problemarten: Randwertproblem (Info an n Punkten); Anfangswertproblem (Info an einem Punkt: $u(t_0) = u_0, u'(t_0) = v_0, \dots$).

Lineare homogene DG, konstante Koeffizienten

$a_n u^{(n)} + \dots + a_1 u' + a_0 u = 0$. Euler-Ansatz $u(x) = e^{\lambda x}$. **Charakteristisches Polynom:** $p(\lambda) = a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$. Nullstellen mit Vielfachheit m liefern m Fundamentallösungen:

- i) reell einfach λ : $e^{\lambda x}$
- ii) reell m -fach: $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}$
- iii) Paar $\alpha \pm i\beta$: $e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x)$

Allgemeine Lösung: Summe aller Fundamentallösungen, jeweils mal Konstante: $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x)$.

Superpositionsprinzip

Lösungen y_1, y_2 linearer homogener DG $\Rightarrow y = C_1 y_1 + C_2 y_2$ Lösung.

Lineare inhomogene DG, konst. Koeff.

$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$.

Erst y_h (homogen) finden, dann Ansatz für y_p nach Störterm $s(x)$:

Störterm $s(x)$	Ansatz y_p
$a_0 + a_1 u + \dots + a_n u^n$	$(C_0 + \dots + C_n u^n) u^m$
e^{ku}	$C e^{ku} \cdot u^m$
$A \sin(wu) + B \cos(wu)$	$(C_1 \sin(wu) + C_2 \cos(wu)) u^m$

Resonanz: m = Vielfachheit der zugehörigen Nullstelle des char. Polynoms (0 bei Polynom, k bei e^{ku} , $i w$ bei $\sin / \cos$); ohne Resonanz $m = 0$. Koeffizienten via ableiten, einsetzen, Koeffizientenvergleich.

Existenz & Eindeutigkeit (Picard)

Satz. Ist f stetig & Lipschitz-stetig in der 2. Variablen ($\exists L > 0$: $|f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$), so hat das AWP $\begin{cases} u' = f(x, u) \\ u(x_0) = y_0 \end{cases}$ eine eindeutige C^1 -Lösung.

Lipschitz-stetig: $\exists L \geq 0 \forall x, y \in D : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$. (Lipschitz $\Rightarrow$ gleichmässig stetig.)

Strategie – DGL 1. Ordnung

Form erkennen $\rightarrow$ passende Methode:

Form	Methode	Ansatz / Substitution
$y' = f(x)g(y)$	TrennVar	$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$
$y' = g(y/x)$	Ähnlichkeit	$z = y/x, y = xz$
$y' = f(ax + by + c)$	LinSub	$z = ax + by + c$
$y' + f(x)y = g(x)$	VarKonst	$y = C(x)e^{-F(x)}, F' = f$
$M dx + N dy = 0$	Exakt	$M_y = N_x; F_x = M, F_y = N$

Grundregeln für 1. Ordnung:

- $y' = f(x)g(y)$: Variablen trennen.
- $y' + p(x)y = q(x)$: integrierender Faktor oder Variation der Konstanten.
- Lineare DGL mit konstanten Koeffizienten: charakteristisches Polynom.
- Inhomogene DGL: $y = y_h + y_p$.
- Anfangsbedingungen erst in die vollständige Lösung einsetzen.

Trennung der Variablen: $y' = f(x)g(y)$:

- $\frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx$
- beide Seiten integrieren
- nach y umformen

Substitution:

- neue Grösse z einführen
- z nach x ableiten $\rightarrow$ trennbare DGL
- mit TrennVar lösen
- Rücksubstitution

Variation der Konstanten ($y' + f(x)y = g(x)$):

Sei $F(x) = \int f(x) dx$. Dann ist die allgemeine Lösung der homogenen Gleichung

$$y_h(x) = A e^{-F(x)}.$$

- Ersetze die Konstante A durch eine Funktion $C(x)$:

$$y_p(x) = C(x) e^{-F(x)}.$$

- Ableiten und Einsetzen in $y' + f(x)y = g(x)$ ergibt:

$$C'(x) e^{-F(x)} = g(x).$$

- Somit gilt:

$$C'(x) = g(x) e^{F(x)}.$$


- Integrieren:

$$C(x) = C_0 + \int g(x) e^{F(x)} dx.$$

Satz. Die allgemeine Lösung von $y' + f(x)y = g(x)$ ist

$$y(x) = e^{-F(x)} C_0 + \int g(x) e^{F(x)} dx, \quad F'(x) = f(x).$$

Wichtige Funktionen im Überblick



Strategie – Kurvendiskussion

Sei $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ gegeben.

- Definitionsbereich D :** Nenner darf nicht null sein, Argument eines Logarithmus muss positiv sein und bei geraden Wurzeln muss der Radikand nichtnegativ sein.
- Symmetrie prüfen:** $f(-x) = f(x)$ bedeutet Achsensymmetrie zur y -Achse. $f(-x) = -f(x)$ bedeutet Punktsymmetrie zum Ursprung.
- Achsenschnittpunkte:** Nullstellen aus $f(x) = 0$ bestimmen. Falls $0 \in D$, ist der Schnittpunkt mit der y -Achse $(0, f(0))$.
- Grenzwerte:** Verhalten für $x \rightarrow \pm\infty$ und an Randstellen des Definitionsbereichs untersuchen.
- Asymptoten:** Bei $\lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = \infty$ liegt eine vertikale Asymptote $x = a$ vor. Bei $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = c$ liegt die horizontale Asymptote $y = c$ vor.
- Erste Ableitung:** Kritische Stellen bestimmen: Randpunkte, Stellen ohne Ableitung und Lösungen von $f'(x) = 0$.
- Monotonie:** Vorzeichen von f' auf den entstehenden Intervallen untersuchen.

8. **Extrema:** Vorzeichenwechsel $+\rightarrow -$ von f' bedeutet lokales Maximum. Vorzeichenwechsel $-\rightarrow +$ bedeutet lokales Minimum.
9. **Zweite Ableitung:** Lösungen von $f''(x) = 0$ bestimmen und Vorzeichen von f'' prüfen.
10. **Krümmung:** $f'' > 0$ bedeutet konvex, $f'' < 0$ bedeutet konkav. Ein Wendepunkt benötigt einen Krümmungswechsel.
11. **Werte einsetzen:** Koordinaten von Extrem- und Wendepunkten durch Einsetzen in f bestimmen.
12. Alle Ergebnisse zu einer Skizze zusammensetzen.

Bem. Kandidaten für Extremstellen

Auf einem Intervall können Extremstellen auftreten:


- an Randpunkten,
- an Stellen, an denen f nicht differenzierbar ist,
- an Stellen mit $f'(x) = 0$.

Für globale Extrema auf einem abgeschlossenen Intervall $[a, b]$ müssen die Funktionswerte an allen Kandidaten verglichen werden.

Einheitskreis

Leseschlüssel für die Klammern: $(\cos \alpha, \sin \alpha) = (x, y)$

1. Wert: $\cos(x)$, 2. Wert: $\sin(y)$.



Task Examples

Komplexe Nullstelle

$P(x) = x^3 - x^2 + x + 1 + a$ und $P(-i) = 0$:

$$0 = P(-i) = i + 1 - i + 1 + a = a + 2 \Rightarrow a = -2.$$

$$P(x) = x^3 - x^2 + x - 1 = (x - 1)(x^2 + 1) = (x - 1)(x - i)(x + i).$$

Konvergenz mit der ε -Definition

Aufgabe: Zeige $a_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0$.

Sei $\varepsilon > 0$. Wähle $N \in \mathbb{N}$ mit $N > \frac{1}{\varepsilon}$. Dann gilt für alle $n \geq N$:

$$|a_n - 0| = \frac{1}{n} \leq \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

Also $a_n \rightarrow 0$.