

Satz. Eine absolut konvergente Reihe ist konvergent, und $|\sum_{k=1}^{\infty} a_k| \leq \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$ (verallg. Dreiecksungl.).

Bem. bedingt konvergent: konvergiert, aber nicht absolut.

Konvergenzkriterien

Kor. (Vergleichssatz) $0 \leq a_k \leq b_k \ \forall k \geq K$:
i) $\sum b_k$ konv. $\implies \sum a_k$ konv.
ii) $\sum a_k$ div. $\implies \sum b_k$ div.
(Majoranten- / Minorantenkriterium)

Satz. (Leibniz) (a_n) monoton fallend, $a_n \geq 0$, $\lim a_n = 0$. Dann konvergiert $S := \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$ und $a_1 - a_2 \leq S \leq a_1$. Restglied: $|\sum_{k=n+1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k| \leq a_{n+1}$.

Def. Eine **Umordnung** von $\sum a_k$ ist $\sum a_{\sigma(k)}$ mit einer Bijektion $\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$.

Satz. (Dirichlet) Konvergiert eine Reihe absolut, so konvergiert jede Umordnung mit demselben Grenzwert ($\sigma : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ bijektiv).

Satz. (Riemann) Konvergiert die Reihe bedingt (d.h. konvergent, aber nicht absolut), so gibt es zu jedem $x \in \mathbb{R}$ eine Anordnung mit $\sum a_{\sigma(k)} = x$.

Quotientenkriterium: $a_n \neq 0$, $\limsup |\frac{a_{n+1}}{a_n}| < 1 \implies$ abs. konv.; $\liminf |\frac{a_{n+1}}{a_n}| > 1 \implies$ div. Äquiv. mit lim.

Wurzelkriterium: $\limsup \sqrt[n]{|a_n|} < 1 \implies$ abs. konv.; $> 1 \implies$ div.

Verdichtungskriterium (Cauchy): (a_n) monoton fallend, $a_n \geq 0$: $\sum a_n$ konv. $\iff \sum 2^n a_{2^n}$ konv.

Bsp. $a_n = \frac{z^n}{n!}$: $|\frac{a_{n+1}}{a_n}| = |\frac{z}{n+1}| < 1$ für $n > |z| \implies \sum \frac{z^n}{n!}$ konvergiert.

Potenzreihen

Form $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (x-a)^k = c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + \dots$ (Entwicklungspunkt a).

Def. Der **Konvergenzradius** R entspricht:
$$R = \begin{cases} +\infty & \text{falls } \rho = 0 \\ 1/\rho & \text{falls } \rho > 0 \\ 0 & \text{falls } \rho = \infty \end{cases} \quad \rho = \limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}$$

Alternativ: $R = \lim_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{-1} |c_{n+1}|$.

Kor. $\sum c_k (x-a)^k$ konvergiert absolut für $|x-a| < R$, divergiert für $|x-a| > R$.

Fall $|x-a| = R$ separat prüfen.

Satz. Potenzreihe $f(x) = \sum c_k x^k$ mit $R > 0$ konvergiert gleichmäßig auf $[-r, r]$ für alle $r < R$; $f : (-R, R) \rightarrow \mathbb{R}$ ist stetig.

Doppelreihen

Bei $(a_{ij})_{i,j \geq 0}$ können $\sum_i \sum_j a_{ij}$ und $\sum_j \sum_i a_{ij}$ verschiedene Grenzwerte haben.

Konvergiert $\sum_{i,j} a_{ij}$ absolut, sind beide gleich und jede Anordnung konvergiert dazu.

Das Cauchy Produkt

Def. Cauchy-Produkt von $\sum a_i, \sum b_j$:
$$\sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^n (a_{n-j} b_j) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) + \dots$$

Konvergiert (mind.) eine der beiden Reihen absolut, konvergiert auch das Produkt gegen $(\sum a_i)(\sum b_j)$.

Satz. Sei $f_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ mit
i) $f(j) := \lim_n f_n(j)$ existiert $\forall j$
ii) $\exists g : \mathbb{N} \rightarrow [0, \infty)$ mit $|f_n(j)| \leq g(j)$ und $\sum g(j)$ konv.
Dann $\sum_j f(j) = \lim_n \sum_j f_n(j)$.

Integral Test

Sei f stetig, positiv, monoton fallend auf $[k, \infty)$, $f(n) = a_n$:

$$\int_k^{\infty} f(x) dx \text{ konv.} \iff \sum_{n=k}^{\infty} a_n \text{ konv.}$$

(Analog für Divergenz.)

Strategie – Konvergenz von Reihen

- Spezielle Reihe? (Geometrisch, Teleskop, Harmonisch, Zeta)
- $\lim a_n = 0$? (Nullfolgenkriterium)
- Quotienten- / Wurzelkriterium?
- Konvergenter Majorant / divergenter Minorant?
- Leibnizkriterium?
- Integral Test?

Stetigkeit und Funktionen

Definitionen

Def. $D \subseteq \mathbb{R}, x_0 \in D$. $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ ist **stetig** in x_0 , falls $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $\forall x \in D$:
 $|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

Alternativ (Folgenstetigkeit): $\forall (a_n) \rightarrow x_0$ gilt $f(\lim a_n) = f(x_0) = \lim f(a_n)$.

Def. f ist **stetig**, falls sie in jedem Punkt von D stetig ist.

Gleichmässige Stetigkeit: $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x, y \in D : |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon$.

Auf kompaktem Intervall stetig $\implies$ dort gleichmässig stetig.

Rechnen mit Stetigkeit

f, g in x_0 stetig, $\lambda \in \mathbb{R}$:
i) $f + g, \lambda f, f \cdot g$ stetig in x_0

- ii) $g(x_0) \neq 0 \implies \frac{f}{g}$ stetig in x_0
- iii) $|f|, \max(f, g), \min(f, g)$ stetig
- iv) Polynome sind auf ganz $\mathbb{R}$ stetig
- v) $\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetig
- vi) e^x auf ganz $\mathbb{R}$ stetig
- vii) P, Q Polynome, $Q \neq 0$, Nullstellen $x_1, \dots, x_m$: $\frac{P}{Q}$ stetig auf $\mathbb{R} \setminus \{x_1, \dots, x_m\}$
- viii) f in x_0, g in $f(x_0)$ stetig $\implies g \circ f$ in x_0 stetig

Zwischenwertsatz

Satz. Sei $I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, $a, b \in I$. Für jedes c zwischen $f(a)$ und $f(b)$ gibt es z zwischen a, b mit $f(z) = c$.

Anwendungen:

- i) $f(a)f(b) < 0 \implies \exists c : f(c) = 0$
- ii) Polynom mit ungeradem Grad hat mind. eine reelle Nullstelle

Min-Max Satz

Def. $I \subseteq \mathbb{R}$ **kompakt**, falls $I = [a, b]$ mit $a \leq b$.

Satz. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\implies \exists u, v \in I$ mit $f(u) \leq f(x) \leq f(v) \ \forall x \in I$. Insbesondere ist f beschränkt.

Satz der Umkehrabbildung

Satz. $I \subseteq \mathbb{R}$ Intervall, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig, streng monoton. Dann ist $f(I) =: J$ ein Intervall und $f^{-1} : J \rightarrow I$ stetig, streng monoton.

Bsp. $f : [0, \infty) \rightarrow [0, \infty), x \mapsto x^n$ hat Umkehrung $x \mapsto \sqrt[n]{x}$.

Konvergenz von Funktionenfolgen

Def. Eine **Funktionenfolge** ist eine Abbildung $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^D, n \mapsto f_n$ (d.h. jedes $f_n : D \rightarrow \mathbb{R}; \mathbb{R}^D =$ Menge aller Funktionen $D \rightarrow \mathbb{R}$). Für festes $x \in D$ ist $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ eine gewöhnliche Folge.

(f_n) konvergiert **punktweise** gegen f , falls $\forall x : f(x) = \lim f_n(x)$, d.h. $\forall \varepsilon, \forall x, \exists N, \forall n \geq N : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

(f_n) konvergiert **gleichmässig** gegen f , falls $\forall \varepsilon, \exists N, \forall n \geq N, \forall x : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$.

Bem. gleichmässig $\implies$ punktweise, nicht umgekehrt.

Satz. f_n stetig und gleichmässig $\rightarrow f \implies f$ stetig. (Für punktweise i.A. nicht.)

Strategie – Konvergenz von Funktionenfolgen

1. Punktwisen Limes f auf D finden.
2. Auf gleichmässige Konvergenz prüfen:
 - Indirekt: f unstetig $\implies$ nicht gleichmässig; f_n & f stetig, (f_n) monoton in n, D kompakt $\implies$ gleichmässig (Dini).

$f'(x_0) = \dots = f^{(n)}(x_0) = 0$:

- i) n gerade, x_0 lok. Extremalstelle $\Rightarrow f^{(n+1)}(x_0) = 0$
- ii) n ungerade, $f^{(n+1)}(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ strikte lok. Minimalstelle
- iii) n ungerade, $f^{(n+1)}(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ strikte lok. Maximalstelle

Keine Extremalstelle: $f'(x_0) = 0 \Rightarrow$ Sattelpunkt; $f''(x_0) = 0 \Rightarrow$ Wendepunkt.

Integralrechnung

Treppenfunktion

Def. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **Treppenfunktion**, falls es eine Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ gibt, sodass f auf jedem offenen Teilintervall (x_{k-1}, x_k) konstant ist (Wert c_k).

Integral der Treppenfunktion:

$$\int_a^b f(x) \, dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$$

Das Riemann Integral

Eine **Zerlegung** P von $I = [a, b]$ ist endliche Teilmenge $P \subseteq [a, b]$ mit $\{a, b\} \subseteq P$. δ_i : Länge von $[x_{i-1}, x_i]$.

$$L(f, P) = \sum_{i=1}^n f_i \delta_i, f_i = \inf_{[x_{i-1}, x_i]} f, \quad U(f, P) = \sum_{i=1}^n F_i \delta_i, F_i = \sup f$$

Verfeinerung P' : $L(f, P) \leq L(f, P') \leq U(f, P') \leq U(f, P)$.

$$L(f) = \sup_P L(f, P), \quad U(f) = \inf_P U(f, P).$$

Satz. Eine beschränkte Funktion ist **Riemann-integrierbar**, falls $L(f) = U(f)$:

$$L(f) = \int_a^b f(x) \, dx = U(f)$$

Äquiv.: $\forall \varepsilon > 0 \exists P : U(f, P) - L(f, P) < \varepsilon$.

Integrierbarkeit schnell zeigen

- i) f stetig auf $[a, b] \Rightarrow f$ integrierbar
- ii) f monoton $\Rightarrow f$ integrierbar
- iii) f, g integrierbar $\Rightarrow f + g, \lambda f, fg, |f|, \max, \min$ und $\frac{f}{g}$ (falls $|g| \geq \beta > 0$) integrierbar
- iv) Jedes Polynom auf $[a, b]$; auch $\frac{P}{Q}$ falls Q nullstellenfrei
- v) Unterschied auf endlicher Menge ändert Integrierbarkeit nicht

Rechnen mit Integralen

$$\int_a^b (\lambda_1 f + \lambda_2 g) \, dx = \lambda_1 \int_a^b f \, dx + \lambda_2 \int_a^b g \, dx$$
$$\int_{a+c}^{b+c} f(x) \, dx = \int_a^b f(t+c) \, dt, \quad \int_a^b f(ct) \, dt = \frac{1}{c} \int_{ac}^{bc} f(x) \, dx$$

Ungleichungen und Mittelwertsatz

- i) $f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$
- ii) $|\int_a^b f| \leq \int_a^b |f|$
- iii) $|\int_a^b fg| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \cdot \sqrt{\int_a^b g^2}$ (Cauchy-Schwarz)

Satz. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig $\Rightarrow \exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f(x) \, dx = f(\xi)(b-a)$.

Folgt: $g \geq 0$ beschränkt integrierbar, f stetig $\Rightarrow \exists \xi : \int_a^b fg = f(\xi) \int_a^b g$.

Fundamentalsatz der Analysis

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist $F(x) = \int_a^x f(t) \, dt$ stetig diff.bar mit $F'(x) = f(x) \, \forall x \in [a, b]$.

F heisst **Stammfunktion** von f (bis auf additive Konstante eindeutig) und $\int_a^b f(x) \, dx = F(b) - F(a)$.

Partielle Integration

f, g stetig diff.bar:

$$\int_a^b fg' \, dx = [fg]_a^b - \int_a^b f'g \, dx$$

Wahl von f (absteigende Priorität):

- arc-/log-Fkt., $x^n, \frac{1}{1-x^2}, \frac{1}{1+x^2}$
- $x^n, \arcsin, \arccos, \arctan$
- „egal“: $e^x, \sin, \cos, \sinh, \cosh$

Substitution

$\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig diff.bar, $\varphi([a, b]) \subseteq I, f : I \rightarrow \mathbb{R}$ stetig:

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t) \, dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(x) \, dx$$

Bsp. $\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} \, dx, \quad t = \sqrt{9-x^2} \Rightarrow dx = -t \, dt / \sqrt{9-t^2} \Rightarrow \int -dt = -t,$
rücksub. $-\sqrt{9-x^2}$.

Nützliche Substitutionen:

- i) $e^x, \sinh, \cosh : t = e^{ax}, dx = \frac{dt}{at}$
- ii) $\log(x) : t = \log x, x = e^t, dx = e^t \, dt$
- iii) gerade $n : t = \tan x, \sin^2 = \frac{t^2}{1+t^2}, \cos^2 = \frac{1}{1+t^2}$
- iv) ungerade $n : t = \tan(\frac{x}{2}), \sin = 2\frac{t}{1+t^2}, \cos = \frac{1-t^2}{1+t^2}$
- v) $\int \sqrt{1-x^2} : x = \sin$ oder $\cos$
- vi) $\int \sqrt{1+x^2} : x = \sinh$

Strategie – Berechnung von Integralen

Bruchform:

- einfacher Nenner
- Partialbruchzerlegung
- $\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ oder $\frac{u'}{u}$ erkennen $\Rightarrow \sqrt{u}$ oder $\log|u|$

Produktform:

- partielle Integration (evtl. mehrmals)
 - Kettenregel
- Potenzen:** $\int f^c = \int (f^c \cdot 1)$ oder $\int (f^{c-1} \cdot f)$, dann part. Int.
- Exponentenform:** $\frac{e}{\log}$ -Trick bei Variable im Exponenten.
- Produkt mit e, sin, cos:** mehrmals part. Int. (sin, cos als g' , e als f).
- Summe im Integral:** herausziehen (Reihe muss gleichmässig konvergieren).

Integration von konvergenten Reihen

f_n integrierbar, gleichmässig $\rightarrow f$. Dann f integrierbar und

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n = \int_a^b \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = \int_a^b f$$

Gleichmässig konv. Reihe: $\sum_{n=0}^\infty \int_a^b f_n = \int_a^b \sum_{n=0}^\infty f_n$.

Potenzreihe $f(x) = \sum_{k=0}^\infty c_k x^k, R > 0: \forall 0 \leq r < R$ auf $[-r, r]$ integrierbar, $\int_0^x f(t) \, dt = \sum_{k=0}^\infty \frac{c_k}{k+1} x^{k+1}$.

Stirling'sche Formel

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \cdot \frac{n^n}{e^n}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n n^n / e^n}} = 1$$
$$n \neq \sqrt{2\pi n} \frac{n^n}{e^n} \cdot \exp\left(\frac{1}{12n} + R_3(n)\right), \quad |R_3(n)| \leq \frac{\sqrt{3}}{216} \cdot \frac{1}{n^2}$$

Uneigentliche Integrale

$f : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ beschränkt & integrierbar auf $[a, b]$. Falls $\lim_{b \rightarrow \infty} \int_a^b f$ existiert, heisst f auf $[a, \infty)$ integrierbar mit $\int_a^\infty f$.

Minoranten/Majoranten-Kriterium gilt.

$f : (a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrierbar, falls $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f$ existiert.

Bsp. $f(t) = t^x$: auf $(0, 1)$ integrierbar für $x > -1$: $\int_0^1 t^x \, dt = \frac{1}{x+1}$; auf $[1, \infty)$ für $x < -1$: $\int_1^\infty t^x \, dt = -\frac{1}{1+x}$.

Stammfunktionen rationaler Funktionen

$R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$. Falls $\deg P \geq \deg Q$: Polynomdivision.

Nullstellen von Q mit Vielfachheit bestimmen.

$$R(x) = \sum_{k=1}^N R_k(x) + \sum_{k=1}^M Z_k(x)$$

(N reelle, M komplexe Nullstellen). Reelle Nullstelle:

$$\int \frac{1}{(x-\gamma_i)^n} = \begin{cases} \ln(x-\gamma_i) & n=1 \\ \frac{-1}{(n-1)(x-\gamma_i)^{n-1}} & \text{sonst} \end{cases}$$

Komplexe: $\frac{A+Bx}{((x-\alpha)^2+\beta^2)^j} = \frac{B(x-\alpha)}{(\dots)^j} + \frac{A+B\alpha}{(\dots)^j}$; letzter Term via Sub. $(x-\alpha) = \beta t$.

Bsp. $\int \frac{x^2-x+2}{x^3-x^2+x-1}$: Nullstelle $x=1$, Polynomdiv. $\rightarrow x^2+1$. Ansatz $\frac{A+Bx}{x^2+1} + \frac{C}{x-1} : B=0, A=-1, C=1 \Rightarrow \ln(x-1) - \arctan(x) + C$.

Sonstiges

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{\alpha}{k} x^k$$

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \frac{7x^5}{256} - \dots$$

Typische Grenzwerte / Folgen

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = 1$
$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty$
$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}} = e$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + x\right)^{\frac{1}{x}} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$
$\lim_{x \rightarrow \infty} x^a q^x = 0, 0 \leq q < 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^{mx} = e^{km}$	$\lim_{x \rightarrow 0} x \log x = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos} x = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arctan x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+k}\right)^x = e^{-k}$	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log x}{x^a} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2^x}{x^2} = \infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^+} \tan x = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[x]{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$
$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}^-} \tan x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$

Typische Reihen

$\sum_{i=1}^n i = \frac{n(n+1)}{2}$	$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$
$\sum_{i=1}^n i^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$	

Geometrisch: $\sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$; für $|q| < 1$: $\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}$.

Harmonisch: $\sum \frac{1}{n}$ divergent, alternierend konv.

Zeta: $\zeta(s) = \sum \frac{1}{n^s}$ konv. für $s > 1$.

Teleskop: $\sum \log\left(\frac{n}{n+1}\right) = -\infty$.

Ableitungen & Stammfunktionen

$F(x)$	$F'(x) = f(x)$
c	0
x^a	ax^{a-1}

$\frac{1}{a+1}x^{a+1}$	x^a
$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$x^\alpha, \alpha \neq -1$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$
$\sqrt[n]{x}$	$\frac{1}{n}x^{\frac{1}{n}-1}$
$\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{x}$
e^x	e^x
$\ln x $	$\frac{1}{x}$
$\log_a x $	$\frac{1}{x \ln a}$
$\sin x$	$\cos x$
$\cos x$	$-\sin x$
$\tan x$	$\frac{1}{\cos^2}x = 1 + \tan^2 x$
$\cot x$	$-\frac{1}{\sin^2}x$
$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos x$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh x$	$\cosh x$
$\cosh x$	$\sinh x$
$\tanh x$	$\frac{1}{\cosh^2}x = 1 - \tanh^2 x$
$\operatorname{arcsinh} x$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\operatorname{arcosh} x$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arctanh} x$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\frac{1}{f(x)}$	$-f' \frac{x}{(f(x))^2}$
a^{cx}	$a^{cx} c \ln a$
x^x	$x^{x(1+\ln x)}$
$\frac{1}{a} \ln(ax+b)$	$\frac{1}{ax+b}$
$\frac{1}{2a} \ln\left \frac{x-a}{x+a}\right $	$\frac{1}{x^2-a^2}$
$\frac{x}{2}\sqrt{a^2+x^2} + \frac{a^2}{2} \ln\left(x + \sqrt{a^2+x^2}\right)$	$\sqrt{a^2+x^2}$
$\frac{x}{2}\sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right)$	$\sqrt{a^2-x^2}$
$\frac{x}{2}\sqrt{x^2-a^2} - \frac{a^2}{2} \ln\left(x + \sqrt{x^2-a^2}\right)$	$\sqrt{x^2-a^2}$

$\ln\left(x + \sqrt{x^2 \pm a^2}\right)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}}$
$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$	$\frac{1}{x^2+a^2}$
$-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$	$\sin(ax+b)$
$\frac{1}{a} \sin(ax+b)$	$\cos(ax+b)$
$-\ln \cos x $	$\tan x$
$\ln \sin x $	$\cot x$
$\ln\left \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right $	$\frac{1}{\sin}x$
$\ln\left \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right $	$\frac{1}{\cos}x$
$\frac{1}{2}(x - \sin x \cos x)$	$\sin^2 x$
$\frac{1}{2}(x + \sin x \cos x)$	$\cos^2 x$
$\tan x - x$	$\tan^2 x$
$-\cot x - x$	$\cot^2 x$
$x \arcsin x + \sqrt{1-x^2}$	$\arcsin x$
$x \arccos x - \sqrt{1-x^2}$	$\arccos x$
$x \arctan x - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$	$\arctan x$
$\ln(\cosh x)$	$\tanh x$
$\ln f(x) $	$f' \frac{x}{f(x)}$
$x(\ln x - 1)$	$\ln x $
$\frac{e^{cx}(c \sin(ax+b) - a \cos(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{cx} \sin(ax+b)$
$\frac{e^{cx}(c \cos(ax+b) + a \sin(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{cx} \cos(ax+b)$

Differentialgleichungen

Def. Eine (**gewöhnliche**) **DGL** (**ODE**) der Ordnung n : $F(u(t), u'(t), \dots, u^{(n)}(t), t) = 0$.

t : unabhängige, u : abhängige Variable.

Lineare DG: $a_n(x)y^{(n)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y = s(x)$.

$s \equiv 0$: homogen, sonst inhomogen. Ordnung = höchste Ableitung.

Zwei Problemarten: Randwertproblem (Info an n Punkten); Anfangswertproblem (Info an einem Punkt: $u(t_0) = u_0, u'(t_0) = v_0, \dots$).

Lineare homogene DG, konstante Koeffizienten

$a_n u^{(n)} + \dots + a_1 u' + a_0 u = 0$. Euler-Ansatz $u(x) = e^{\lambda x}$. **Charakteristisches Polynom:** $p(\lambda) = a_n \lambda^n + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$. Nullstellen mit Vielfachheit m liefern m Fundamentallösungen:

- i) reell einfach λ : $e^{\lambda x}$
- ii) reell m -fach: $e^{\lambda x}, x e^{\lambda x}, \dots, x^{m-1} e^{\lambda x}$
- iii) Paar $\alpha \pm i\beta$: $e^{\alpha x} \cos(\beta x), e^{\alpha x} \sin(\beta x)$

Allgemeine Lösung: Summe aller Fundamentallösungen, jeweils mal Konstante: $y(x) = C_1y_1(x) + \dots + C_ny_n(x)$.

Superpositionsprinzip

Lösungen y_1, y_2 linearer homogener DG $\Rightarrow y = C_1y_1 + C_2y_2$ Lösung.

Lineare inhomogene DG, konst. Koeff.

$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$.

Erst y_h (homogen) finden, dann Ansatz für y_p nach Störterm $s(x)$:

Störterm $s(x)$	Ansatz y_p
$a_0 + a_1u + \dots + a_nu^n$	$(C_0 + \dots + C_nu^n)u^m$
e^{ku}	$Ce^{ku} \cdot u^m$
$A \sin(wu) + B \cos(wu)$	$(C_1 \sin(wu) + C_2 \cos(wu))u^m$

Resonanz: m = Vielfachheit der zugehörigen Nullstelle des char. Polynoms (0 bei Polynom, k bei e^{ku} , iw bei $\sin / \cos$); ohne Resonanz $m = 0$. Koeffizienten via ableiten, einsetzen, Koeffizientenvergleich.

Existenz & Eindeutigkeit (Picard)

Satz. Ist f stetig & Lipschitz-stetig in der 2. Variablen ($\exists L > 0 : |f(x, y_1) - f(x, y_2)| \leq L|y_1 - y_2|$), so hat das AWP $\begin{cases} u' = f(x, u) \\ u(x_0) = y_0 \end{cases}$ eine eindeutige C^1 -Lösung.

Lipschitz-stetig: $\exists L \geq 0 \forall x, y \in D : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$. (Lipschitz $\Rightarrow$ gleichmässig stetig.)

Strategie – DGL 1. Ordnung

Form erkennen $\rightarrow$ passende Methode:

Form	Methode	Ansatz / Substitution
$y' = f(x)g(y)$	TrennVar	$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx$
$y' = g(y/x)$	Ähnlichkeit	$z = y/x, y = xz$
$y' = f(ax + by + c)$	LinSub	$z = ax + by + c$
$y' + f(x)y = g(x)$	VarKonst	$y = C(x)e^{-F(x)}, F' = f$
$M dx + N dy = 0$	Exakt	$M_y = N_x; F_x = M, F_y = N$

Trennung der Variablen: $y' = f(x)g(y)$:

- $\frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx$
- beide Seiten integrieren
- nach y umformen

Substitution:

- neue Grösse z einführen
- z nach x ableiten $\rightarrow$ trennbare DGL
- mit TrennVar lösen
- Rücksubstitution

Variation der Konstanten ($y' + f(x)y = g(x)$):

- homogene Lösung $y_h(x) = Ae^{-F(x)}$, F Stammfkt. von f
- A durch $C(x)$ ersetzen: $y_p(x) = C(x)e^{-F(x)}$

Wichtige Funktionen im Überblick

