


Section #9 (Chapter #9)

Question ~~8~~ #1

$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}$$

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$



$$\alpha = 1 - 0.9 = 0.1 \Rightarrow P(Z < -z_{\alpha/2}) = \alpha/2 = 0.05 \Rightarrow z_{\alpha/2} = 1.645$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{0.001}{\sqrt{9}}, \bar{X} = 8.05$$

$$8.05 - 1.645 \frac{0.001}{\sqrt{9}} < \mu < 8.05 + 1.645 \frac{0.001}{\sqrt{9}}$$

$$8.04945 < \mu < 8.05055$$

16

Question ~~9~~ 2

Similar to question 8, solve it yourself:

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha = 0.95 \Rightarrow \alpha = 0.05$$

$$P\left(\mu - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X} < \mu + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

$$P\left(20 - z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{n}} < \bar{X} < 20 + z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{n}}\right) = 0.95 = P(19.9 < \bar{X} < 20.1)$$

$$\Rightarrow z_{\alpha/2} \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{n}} = 0.1, z_{\alpha/2} = z_{0.025} = 1.96 \Rightarrow 1.96 \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{n}} = 0.1$$

$$n = 1152.48 \Rightarrow n = 1153$$

17

Question ~~10~~ 3

• a) $\bar{X} = 715, S_X = 1.57$

• b) True standard deviation is unknown!

=> use t-distribution

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

$$\bar{X} - t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$715 - 2.262 * \frac{1.57}{\sqrt{10}} < \mu < 715 + 2.262 * \frac{1.57}{\sqrt{10}}$$

$$715 - 1.123 < \mu < 715 + 1.123$$

$$713.877 < \mu < 716.123$$



TABLE D		t distribution critical values									
		Upper-tail probability p									
df		.25	.20	.15	.10	.05	.025	.02	.01	.005	.0025
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	15.89	31.82	63.66	127.32	318.31
2	0.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	4.849	6.965	17.00	28.76	69.72
3	0.765	0.978	1.250	1.638	2.353	3.182	3.482	4.541	9.348	12.92	23.59
4	0.741	0.941	1.190	1.533	2.132	2.776	2.999	3.747	7.172	9.947	17.54
5	0.727	0.920	1.156	1.476	2.015	2.571	2.757	3.397	6.608	8.748	14.55
6	0.718	0.906	1.134	1.440	1.943	2.447	2.612	3.235	6.314	8.224	13.71
7	0.711	0.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.517	3.143	6.163	8.053	13.28
8	0.706	0.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.449	3.091	6.058	7.963	13.08
9	0.703	0.883	1.100	1.383	1.833	2.282	2.427	3.055	6.021	7.933	13.00
10	0.700	0.879	1.093	1.372	1.812	2.262	2.412	3.038	6.000	7.903	12.92

Question 10 4 3

c) According to chi-squared table with $df=9$

$$\alpha = 1 - 0.95 = 0.05$$

$$\chi^2_{1-\alpha/2} < \chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma^2} < \chi^2_{\alpha/2}$$

$$\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2}} < \sigma^2 < \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}}$$

$$\chi^2_{1-\alpha/2=0.975} = 2.70, \quad \chi^2_{\alpha/2=0.025} = 19.023$$

$$\frac{9 \cdot (1.57)^2}{19.023} < \sigma^2 < \frac{9 \cdot (1.57)^2}{2.700} \Rightarrow 1.166 < \sigma^2 < 8.216 \quad 1.080 < \sigma < 2.866$$

19

Question 11 4

- Two different populations $\sigma_1^2 = 1.5, \sigma_2^2 = 1.2$

- Two different samples:

$$n_1 = 15, \bar{X}_1 = 89.6, S_1 = 1.8$$

$$n_2 = 20, \bar{X}_2 = 92.5, S_2 = 1.5$$

$$\mu_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2} = \mu_1 - \mu_2, \quad \sigma_{\bar{X}_1 - \bar{X}_2}^2 = \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}$$

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} = \frac{(92.5 - 89.6) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{1.2}{20} + \frac{1.5}{15}}} = \frac{(2.90) - (\mu_1 - \mu_2)}{0.40}$$

$$\alpha = 1 - 0.99 = 0.01 \Rightarrow P(Z < -z_{\alpha/2}) = 0.005, z_{\alpha/2} = 2.575$$

$$-2.575 < Z < +2.575 \Rightarrow -2.575 < \frac{(2.90) - (\mu_1 - \mu_2)}{0.40} < +2.575$$

$$\Rightarrow \text{confidence interval } 2.90 \pm 2.575 \cdot 0.40$$

20

Question 12 5

- The true variance is unknown! \Rightarrow t-distribution

$$T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$$

- The mean of sample $\bar{X} = 1.35, S = 0.3385$

- According to t-distribution table:

$$df = 16 - 1 = 15 \rightarrow t_{\alpha/2} = t_{0.025} = 2.131$$

$$\bar{x} - t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$1.35 - 2.131 \cdot \frac{0.3385}{\sqrt{16}} < \mu < 1.35 + 2.131 \cdot \frac{0.3385}{\sqrt{16}}$$

$$1.35 - 0.1803 < \mu < 1.35 + 0.1803$$

$$1.170 < \mu < 1.530$$

21

Question 13 ~~13~~ 76

- Sample information: $\bar{X} = 17, S = 0.319$
- $T = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ why ?
- $df = 6 - 1 = 5, \rightarrow t_{\alpha/2} = t_{0.01} = 3.365$

$$\bar{x} - t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{\alpha/2} \frac{s}{\sqrt{n}}$$

$$17 - 3.365 * \frac{0.319}{\sqrt{6}} < \mu < 17 + 3.365 * \frac{0.319}{\sqrt{6}}$$

$$17 - 3.365 * 0.130 < \mu < 17 + 3.365 * 0.130$$

$$16.562 < \mu < 17.438$$

22

Question 14 ~~14~~ 7

- Paired observations
- $d = \mu_1 - \mu_2, T = \frac{\bar{d} - \mu_D}{S_d/\sqrt{n}}$
- \bar{d} = mean (commutator-Pinion) = -4.18
- S_d = STD (commutator-Pinion) = 35.85
- $df = 17 - 1 = 16, t_{\alpha/2} = t_{0.025} = 2.120$

$$\bar{d} - t_{\alpha/2} \frac{S_d}{\sqrt{n}} < \mu_D < \bar{d} + t_{\alpha/2} \frac{S_d}{\sqrt{n}}$$

interval for μ_D : $-4.18 \pm 2.120 \times 35.85/\sqrt{17}$

23

Question 15 ~~15~~ 9

- $\sigma_{standard} = 0.004, df_{standard} = 24,$
- $\sigma_{alloyed} = 0.005, df_{alloyed} = 15$
- $F_{\alpha/2=0.05}(24,15) = 2.29$
- $F_{\alpha/2=0.05}(15,24) = 2.11$

$$\frac{s_1^2}{s_2^2} \frac{1}{f_{\alpha/2}(df_1, df_2)} < \frac{\sigma_1^2}{\sigma_2^2} < \frac{s_1^2}{s_2^2} f_{\alpha/2}(df_2, df_1)$$

$$\Rightarrow \frac{(0.004)^2}{(0.005)^2} \frac{1}{2.29} < \frac{\sigma_{stand}^2}{\sigma_{alloyed}^2} < \frac{(0.004)^2}{(0.005)^2} \times 2.11$$

$$0.279 < \frac{\sigma_{stand}^2}{\sigma_{alloyed}^2} < 1.350$$

24

Question 16 ~~16~~ 109

See section 09 page 37:

$$\hat{p} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}} < p < \hat{p} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{p}\hat{q}}{n}}$$

$$0.01 \pm 1.96 * \sqrt{\frac{0.01 * 0.99}{500}} = 0.01 \pm 1.96 * 0.00445$$

$$0.0013 < p < 0.0187$$