

Potenzreihen

Reihe der Form $c_0 + c_1(x-a) + c_2(x-a)^2 + c_3(x-a)^3 + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} c_k(x-a)^k$ um **Entwicklungspunkt** a mit **Koeffizienten** $c_0, c_1, c_2, \dots$ und **Argument** x .

Es gilt folgendes:

1. Jede Potenzreihe besitzt einen **Konvergenzradius** R , sodass gilt: Die Reihe konvergiert für x mit $|x-a| < R$ **absolut** und die Reihe divergiert für x mit $|x-a| > R$. Randpunkte $|x-a| = R$ müssen separat betrachtet werden.
2. Das Intervall $(a-R, a+R)$ heisst **Konvergenzintervall**.
3. Der Konvergenzradius R lässt sich mit der folgenden Formel berechnen: Es sei $\rho = \limsup_{n \rightarrow \infty} |c_n|^{1/n}$. Dann ist R gegeben durch
$$R = \begin{cases} 0, & \text{falls } \rho = \infty \\ \rho^{-1}, & \text{falls } 0 < \rho < \infty \\ \infty, & \text{falls } \rho = 0 \end{cases}.$$
- Folgt aus Wurzelkriterium für allgemeine Reihen.

Potenzreihe ist **innerhalb ihres Konvergenzradius stetig**.

Potenzreihe **konvergiert auf kompakten Teilintervallen gleichmässig**.

$$R := \frac{1}{\limsup_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{|c_k|}} = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right|} = \frac{1}{\lim_{k \rightarrow \infty} \left| \frac{c_{k+1}}{c_k} \right|} \quad (\text{falls letzterer Grenzwert existiert})$$

Absolut konvergente (Potenz-)Reihen multiplizieren:
Cauchy-Produkt Für $\sum_{i=0}^{\infty} a_i, \sum_{j=0}^{\infty} b_j$ absolut konvergent
 $\implies (\sum_{i=0}^{\infty} a_k)(\sum_{j=0}^{\infty} b_j) = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{j=0}^n a_{n-j} b_j$

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n$$

4 Funktionen

Definition

Eine **Funktion** (Abbildung) ist eine Zuordnungsvorschrift, welche jedem zulässigen Input **genau einen** Output aus dem **Zielbereich** (range) zuordnet.

Die Menge aller möglichen Inputs heisst **Definitionsbereich** bezeichnet als $\text{domain}(f)$ oder D .

Die Menge aller tatsächlich angenommener/realisierter Outputs heisst **Wertebereich (Bildmenge)** bezeichnet mit $\text{image}(f)$ oder W .

$f : \text{domain}(f) \rightarrow \text{range}(f)$
 $x \mapsto y = f(x)$

Der Input heisst **unabhängige Variable (Argument)**. Der Output heisst **abhängige Variable**.

Restriktion, Verknüpfung, Identität

Es sei $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D(f) \neq \emptyset$ und es sei weiters $D' \subset D(f)$. Dann kann man die **Einschränkung/Restriktion** von f auf D' betrachten, die Funktion $f|_{D'} : D' \rightarrow \mathbb{R}$ mit $f|_{D'}(x) = f(x) \forall x \in D'$ (f und $f|_{D'}$ sind zwei verschiedene Funktionen.)

innere Funktion äussere Funktion

Es seien $f : X \rightarrow Y$ und $g : Y \rightarrow Z$ zwei Funktionen. Dann ist die **Verknüpfung/Komposition** von f und g die Funktion $g \circ f : X \rightarrow Z$ mit $g \circ f(x) = g(f(x)) \forall x \in X$

Sei X eine beliebige (nicht leere) Menge. Dann ist die **Identitätsfunktion / Identität** $\text{id}_X(x) = x \forall x \in X$.

Injektivität / Surjektivität / Bijektivität

Falls $f : X \rightarrow Y$ bijektiv ist, gibt es eine eindeutige Funktion (Abbildung) $g : Y \rightarrow X$ mit den Eigenschaften $g \circ f = \text{id}_X$ und $f \circ g = \text{id}_Y$. g nennt man die **Inverse** (Umkehrfunktion / inverse Funktion / inverse Abbildung) und wird mit f^{-1} bezeichnet. (Zu jedem $y \in Y$ ordnen wir das eindeutige Element $x \in X$ zu, sodass gilt $f(x) = y$; möglich, da f surjektiv; eindeutig, da f injektiv.) $f : X \rightarrow Y$ ist

- injektiv** falls gilt: $\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2)$

("verschiedene Argumente generieren verschiedene Outputs")

injektiv und stetig $\implies$ streng monoton

- surjektiv** falls gilt: $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$ ("Zielbereich = Wertebereich")
- bijektiv** falls sie injektiv und surjektiv ist.

Sei $f : D \rightarrow E$ injektiv und $g : E \rightarrow D$ surjektiv, so ist $g \circ f$ bijektiv.

Injektivität einer Funktion $f(x)$ zeigen: $f(x) = f(y) \implies x = y$

- $f(x) = f(y)$ aufschreiben und direkt zeigen dass $x = y$.
- Monotonie verwenden: Wenn Fkt. auf Intervall streng monoton, dann ist sie automatisch injektiv. (Bei stetiger Funktion f kann man dies zeigen mit $f' > 0$ oder $f' < 0$)
- Widerspruch: Angenommen, es gäbe $x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$, zeigen dass dies zu Widerspruch führt.

Zeigen dass Funktion nicht injektiv ist:

- Gegenbeispiel finden: $x_1 \neq x_2$ mit $f(x_1) = f(x_2)$

Surjektivität einer Funktion $f : A \rightarrow B$ zeigen: $\forall y \in B \exists x \in A : f(x) = y$

- Gleichung $f(x) = y$ lösen: Beliebiges $y \in B$ wählen, Gleichung nach x lösen (und zeigen, dass Lösung im Definitionsbereich liegt)
- Wertebereich bestimmen: Falls $W_f = B$, dann ist f surjektiv. (sonst nicht!)
- Für $f : (a, b) \rightarrow (c, d)$ stetig: Zeige, dass $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = d$ und $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = c$. Dann sei $y \in (c, d)$ beliebig. Wegen den Grenzwerten von f gilt: $\exists x_1 < x_2 : f(x_1) < y < f(x_2)$. Gem. Zwischenwertsatz $\exists \xi \in [x_1, x_2] : f(\xi) = y$ und somit ist f surjektiv.

Zeigen dass Funktion nicht surjektiv ist:

- Finden eines Elements $y \in B$ mit $\forall x \in A : f(x) \neq y$, dann zeigen, dass $f(x) = y$ keine Lösung hat.
- Zeigen, dass Wertebereich $\neq$ Zielmenge.

Umkehrfunktion finden: Existiert nur wenn f bijektiv (falls f injektiv, dann ist eingeschränkte Fkt. $f : A \rightarrow \text{im}(f)$ bijektiv)
 $y = f(x)$ setzen, nach x auflösen, x und y vertauschen

Beschränktheit

Sei $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$ mit $D(f) \neq \emptyset$. Dann

- nennen wir f **nach oben beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \leq M \forall x \in D(f)$
- nennen wir f **nach unten beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $f(x) \geq M \forall x \in D(f)$
- nennen wir f **beschränkt**, falls $M \in \mathbb{R}$ existiert mit $|f(x)| \leq M \forall x \in D(f)$ (Falls nach oben und nach unten beschränkt)

Monotonie

Wir betrachten $f : X = D(f) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Diese Funktion nennen wir

- (streng) monoton wachsend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) (<) \leq f(x_2))$
- (streng) monoton fallend**, falls gilt $\forall x_1, x_2 \in X (x_1 < x_2 \implies f(x_1) (>) \geq f(x_2))$
- (streng) monoton**, falls f (streng) monoton wachsend oder (streng) monoton fallend ist.

Jede streng monotone Funktion ist injektiv. (Widerspruchsbe-
weis: Funktion streng monoton aber nicht injektiv $\implies \exists x_1 \neq x_2$
mit $f(x_1) = f(x_2)$ oBdA $x_1 < x_2 \implies$ Widerspruch.)

Monotonie einer Funktion $f(x)$ zeigen: $f(x) = f(y) \implies x = y$

- Ableitung verwenden (streng monoton): $f'(x) > / < 0$; monoton: $f'(x) \geq / \leq 0$; Nullstellen von $f'(x)$ können verwendet werden, um monotone Intervalle zu finden)
- Direkt aus Definition: Für beliebige $x_1 < x_2$ zeigen, dass $f(x_1) < / \leq f(x_2)$ (Bspw. $f(x) = 2x + 3$. $x_1 < x_2 \implies 2x_1 + 3 < 2x_2 + 3 \implies f(x_1) < f(x_2)$).

Gerade / Ungerade Funktionen

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nennen wir

- ungerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = -f(x)$
z.B. ungerade Potenzen von x
- gerade**, falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = f(x)$
z.B. gerade Potenzen von x

Konvex / Konkav

Der **Graph** einer Funktion (Menge aller Punkte der

From $(x, f(x))$ heisst **linksgekrümmt (konvex)** / **rechtsgekrümmt (konkav)**, falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Linkskurve (z.B. $f(x) = x^2$) / Rechtskurve (z.B. $f(x) = -x^2$) vollführt.

Kann mit Vergleichssekante überprüft werden. Ist der Graph unterhalb der Vergleichssekante, so ist die Funktion konvex. Eine Funktion kann in gewissen Abschnitten konvex und in anderen konkav sein.

Grenzwerte

Sei $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$, es sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und es gelte $D(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Dann ist $L \in \mathbb{R}$ der **Grenzwert/Limes** von $f(x)$ an der Stelle x_0 , falls gilt

$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ sodass $x \in D(f) \cup (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$

Der Grenzwert L ist **eindeutig bestimmt**. (Falls für Argumente x , welche genügend nahe bei x_0 liegen (hier "Abstand" im Gegensatz zu Index bei Folgen), der Wert $f(x)$ der Zahl L beliebig nahe kommt, ist L Limes/Grenzwert von $f(x)$ an der Stelle x_0 .) Existenz eines Grenzwertes impliziert nicht, dass f an der Stelle x_0 definiert sein muss.

Wenn der Funktionswert $f(x_0)$ existiert, muss er gleich dem Grenzwert L sein (nach unserer Definition).

Sei $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ genau dann, wenn **für jede konvergente Folge** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, welche gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

Zeige, dass $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(\frac{1}{x})$ nicht existiert:
Gem. Folgenkriterium für Grenzwerte genügt es zu zeigen, dass eine Folge (x_n) mit $x_n \rightarrow 0$ existiert, sodass die Funktion mit den Elementen der Folge nicht konvergiert: $\sin(\frac{1}{x_n}) = \sin(\frac{\pi n}{2})$ konvergiert nicht, denn $\sin(\frac{\pi n}{2}) = \begin{cases} 1, & n \equiv 1 \pmod{4} \\ -1, & n \equiv 3 \pmod{4} \\ 0, & n \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$.

Rechenregeln

Wir nehmen an, es gelte $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm \infty)$, $\lim_{x \rightarrow x} g(x) = L (\neq \pm \infty)$ und A sei eine beliebige feste Zahl. Dann gilt:

- i) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- ii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- iii) $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- iv) $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- v) Falls $L \neq 0$, haben wir $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = K/L$

Einseitige Grenzwerte

Wir nehmen an es gelte $D(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in D(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L , d.h. $\lim_{x \geq x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = L$

Respektive falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in D(f) \cap (x_0 - \delta, x_0) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L , d.h. $\lim_{x > x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = L$

Grenzwerte im Unendlichen

Es sei $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$ und es gelte $D(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \forall R > 0$. Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in D(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen unendlich** den Grenzwert L , d.h. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.

Es sei $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$ und es gelte $D(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \forall R > 0$. Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in D(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen $-\infty$** den Grenzwert L , d.h. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

Uneigentliche Grenzwerte

Falls gilt $\forall N > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in D(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$ hat f in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** ∞ (divergiert f gegen unendlich), d.h. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

Zeige, dass $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$:
 $Da |\sin x| \leq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $|\sin(\frac{1}{x})| \leq |x|$. $Da |x| \rightarrow 0$ für $x \rightarrow 0$ gilt gemäss Sandwichsatz, dass $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$.

Stetigkeit

Eine Funktion $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **an der Stelle x_0 stetig** falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in I (|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon)$.

Arten von Unstetigkeitsstellen: Definitionslücken, Sprungstellen, Polstellen, Grenzwert auf einer Seite existiert nicht (weder eigentlich noch uneigentlich).

Die Funktion nennen wir **stetig** falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

Zeigen, dass Fkt. stetig ist:

- Zeige dass für jedes ϵ ein δ existiert, sodass Definition erfüllt ist.
- Argumentieren, dass aus Rechenregeln folgt, dass Fkt. stetig ist (Fkt. zusammengesetzt aus stetigen Funktionen, z.B. $\frac{x^2}{x^2+2}$).

Zeigen, dass Fkt. nicht stetig ist: Zeige, dass z.B. Definitionstücke oder Sprungstelle an einer Stelle besteht.

Falls f an der Stelle x_0 nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

Stetige Fortsetzung "Dieselbe Funktion mit Lücke eingesetzt"

Parameter finden, sodass zusammengesetzte Funktion stetig ist: Schauen, dass keine Sprungstellen entstehen.

Sei $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$, und es sei $x_0 \in D$. Falls gilt $\lim_{x \geq x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = f(x_0)$ nennen wir den Punkt x_0 **rechtsstetig**. **Linksstetigkeit** ist analog definiert.

Sei $f : D \subset D(f) \subset \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Dann ist f an der Stelle x_0 **genau dann stetig, wenn** für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert (**Folgenstetigkeit**).

Alternativ kann Stetigkeit auch so definiert werden: $f : D(f) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f genau dann stetig, wenn die Urbilder $f^{-1}(A)$ von offenen Mengen ebenfalls wieder offen sind.
 $f^{-1}(A) = \{x \in D(f) | f(x) \in A\}$

Stetigkeit der Umkehrfunktion: Es sei I ein Intervall und es sei $f : I \rightarrow J$ eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch J ein Intervall und die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \rightarrow I$ ist stetig.

Bew.-Idee: f streng monoton - J ist auch Intervall - Stetigkeit

Zwischenwertsatz

Zwischenwertsatz. Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es sei eine Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es (mindestens) ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$.

Spezialfall: **Nullstellensatz von Bolzano** Es sei $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es seien $a, b \in I$ mit $f(a) < 0$ und $f(b) > 0$. Dann hat f mindestens eine Nullstelle zwischen a und b .

Kann oft auch auf abgewandelte Funktion angewandt werden:
Sei $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ stetig, zeige dass $\exists x \in [a, b]$ mit $f(x) = x$ ("Fixpunkt"): Falls nicht $f(a) = a$ oder $f(b) = b$ betrachte $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - x$.

Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man **kompakt**.

Es sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und es sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann **existiert eine Teilfolge** $(s_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$.

Stetige Funktion auf kompaktem Intervall: Sei $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktion und I kompakt. Dann ist f **beschränkt** und f **nimmt sein Maximum und Minimum auf I an**, d.h. es gibt ein $x_{\min} \in I$ und ein $x_{\max} \in I$ mit $\forall x \in I : f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max})$.

Gleichmässige Stetigkeit

Sei $S \subset \mathbb{R}, f : S \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **gleichmässig stetig** $\iff \forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ sodass $\forall x, y \in S |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \epsilon$. (δ hängt nicht von x ab.)

Jede **stetige Funktion auf einem kompakten Intervall** ist **gleichmässig stetig**.

$f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **Lipschitz stetig** falls $\exists L > 0$ s.d. $\forall x, y \in D : |f(x) - f(y)| \leq L|x - y|$.

Eine Lipschitz stetige Funktion ist insbesondere auch gleichmässig stetig.

Rechenregeln

Wir gehen von zwei stetigen Funktionen $f, g: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aus. Dann gilt:

- $f + g$ ist stetig
- $f - g$ ist stetig
- $c \cdot f$, respektive $c \cdot g$, ist für jede beliebige Konstante $c \in \mathbb{R}$ stetig
- $f \cdot g$ ist stetig
- $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$

- Ausserdem ist die **Verknüpfung stetiger Funktionen** wiederum stetig. Genauer: Es seien $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f)$ und $g: \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$ zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung $g(f(x)) = g \circ f(x)$ ebenfalls stetig und es gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$

Elementare Funktionen

Lineare Funktion

$$y = f(x) = mx + 1, \text{ resp. } x \mapsto mx + q$$

Graph ist eine Gerade mit Steigung m und y -Achsenabschnitt q .

Änderungsrate (Verhältnis der Differenz im Wertebereich zur Definition im Definitionsbereich) ist konstant.
 $\frac{f(x+y)-f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+my+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$

Proportionalitäten: Falls zwischen y und x eine Beziehung der Form $y = a \cdot x$ (a eine konstante reelle Zahl) gilt, so heisst y (direkt) **proportional** zu x . a nennt man

Proportionalitätskonstante.

Exponentialfunktion $\exp: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$\exp(x) = e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

exp ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.

Für $n \in \mathbb{N}$ mit $n > 1$ gilt $\exp(x) \geq (1 + \frac{x}{n})^n \forall x > -n$.

- $\exp(0) = 1$
- $\exp(-x) = (\exp(x))^{-1}$
- $\exp(x) \exp(y) = \exp(x + y)$
- $\exp(x) > 1 \forall x > 0$
- $x^a = \exp(a \cdot \ln(x))$ und $x^0 = 1$
- $\exp(iz) = \cos(z) + i \cdot \sin(z)$
- $\exp(i \cdot \frac{\pi}{2}) = i, \exp(i\pi) = -1, \exp(2i\pi) = 1$

Exponentialfunktion (Verallgemeinerung):

$$z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 e^{kt}$$

mit $z_0 > 0$ heisst Exponentialfunktion mit **Anfangswert** $z_0 = z(0)$ und **Wachstumsfaktor / Basis** a .

Relative Zunahme ist konstant: $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 a^{t+s}}{z_0 a^t} = a^s$

Logarithmus

Die eindeutig definierte Inverse zur Exponentialfunktion heisst (natürlicher) Logarithmus $\log(x): \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$.

Der Logarithmus **log ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.**

- $\log(1) = 0$
- $\log(x^{-1}) = \log(\frac{1}{x}) = -\log(x)$
- $\ln(e) = 1$
- $\log(a \cdot b) = \log(a) + \log(b)$
- $\log(\frac{a}{b}) = \log(a) - \log(b)$
- $\log(x^a) = a \cdot \log(x)$
- $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \cdot x^n \quad (-1 \leq x \leq 1)$

Im Allgemeinen gilt $\log_b(a) = \frac{\ln(a)}{\ln(b)}$.

Potenzen, Polynome und rationale Funktionen

$y = f(x) = k \cdot x^p$ mit $k, p \in \mathbb{R}$ heisst **Potenzfunktion.**

$$y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{s=0}^n a_s x^s$$

mit $n \in \mathbb{N}, a_n \neq 0, a_s \in \mathbb{R}$ heisst **Polynom** (ganzrationale Funktion). Die Konstanten a_s heissen **Koeffizienten**. n heisst der **Grad** des Polynoms.

$y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ wobei $p(x)$ und $q(x)$ Polynome sind, heisst **rationale Funktion.**

Potenzregeln

Es seien $a, b \in \mathbb{R}$ und $x, y > 0$. Dann gelten:

- $x^a \cdot x^b = x^{a+b}$
- $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b} \quad (x \neq 0)$
- $(x^a)^b = x^{ab}$
- $(xy)^a = x^a y^a$
- $\left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a} \quad (y \neq 0)$
- $x^{-a} = \frac{1}{x^a}$
- $x^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{x} \quad (n \in \mathbb{N})$
- $x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m} = (\sqrt[n]{x})^m$

Wurzelregeln

Es seien $x, y \geq 0$ und $n, m \in \mathbb{N}$.

- $\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}}$
- $\sqrt[n]{x^m} = x^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{x})^m$
- $\sqrt[n]{xy} = \sqrt[n]{x} \cdot \sqrt[n]{y}$
- $\sqrt[n]{\frac{x}{y}} = \frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} \quad (y > 0)$
- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{x}} = \sqrt[nm]{x} = \sqrt[n]{\sqrt[m]{x}}$
- $(\sqrt[n]{x})^m = x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m}$

Trigonometrische Funktionen



$$\sin(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n+1}}{(2n+1)!} = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\cos(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n z^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

(Beide Reihen konvergieren absolut mit Konvergenzradius $+\infty$)

$\sin: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ und $\cos: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sind stetig.

$$\sin(x) = \frac{\text{GK}}{\text{H}} = \frac{\text{AK}}{\text{H}} = \frac{\text{GK}}{\text{AK}} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, \quad \csc(\alpha) = \frac{1}{\sin(\alpha)}, \quad \sec(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)}, \quad \cot(\alpha) = \frac{1}{\tan(\alpha)} = \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)}$$



$$(x : \cos(x), y : \sin(x))$$

- $\cos(z) = \cos(-z)$ und $\sin(-z) = -\sin(z)$
- $\cos(\pi - x) = -\cos(x)$ und $\sin(\pi - x) = \sin(x)$
- $\sin(z + w) = \sin(z) \cos(w) + \cos(z) \sin(w)$
- $\cos(z + w) = \cos(z) \cos(w) - \sin(z) \sin(w)$
- $\cos(z)^2 + \sin(z)^2 = 1$**
- $\sin(2z) = 2 \sin(z) \cos(z)$
- $\cos(2z) = \cos(z)^2 - \sin(z)^2$
- $\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$
- $\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$

$$\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$\sin(x) = \frac{\tan(x)}{\sqrt{1+\tan^2(x)}}$$

$$\cos(x) = \frac{1}{\sqrt{1+\tan^2(x)}}$$

Potenz der Winkelfunktion

$$\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x)) \quad \text{und} \quad \cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$$

Einige Funktionswerte:

$$\sin(\frac{\pi}{4}) = \cos(\frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Definitionsbereich / Wertebereich:

$$\sin/\cos: \mathbb{D} = \mathbb{R} / W = [0, 1]$$

$$\tan: \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{k \cdot \pi + \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\} / W = \mathbb{R}$$

Nullstellen: $\cos: [\frac{\pi}{2} + k\pi : k \in \mathbb{Z}]$, $\sin / \tan: [k\pi : k \in \mathbb{Z}]$


Bestimme die Amplitude von $a \sin(\omega t) + b \cos(\omega t)$ (Umschreiben in die Form $A \sin(\omega t + \delta)$ oder $A \cos(\omega t - \delta)$).
Die Amplitude ist $A = \sqrt{a^2 + b^2}$. Dann Phasenverschiebung bestimmen: $\cos(\delta) = \frac{a}{A}$, $\sin(\delta) = \frac{b}{A}$ (da $(\frac{a}{A})^2 + (\frac{b}{A})^2 = 1$, also beide Zahlen auf Einheitskreis liegen). Dann Additionstheorem verwenden: $A(\cos \delta \sin(\omega t) + \sin \delta \cos(\omega t)) = A \sin(\omega t + \delta)$

Es gilt $|\sin(x)| \leq x$ mit folgendem Beweis:

$$f(x) = x - \sin(x), \quad x \geq 0 \quad \text{und} \quad f'(x) = 1 - \cos(x) \geq 0$$

Weil $f(0) = 0, f(x) \geq 0$ für $x > 0$. Dann ist $|\sin(x)| \leq |x|$ einfach.

Inverse trigonometrische Funktionen




$$\arcsin := [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]; \quad \arccos := [-1, 1] \rightarrow [0, \pi]; \quad \arctan := [-1, 1] \rightarrow [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}];$$

- $\arcsin(x) + \arccos(x) = \frac{\pi}{2}$
- $\arcsin(-x) = -\arcsin(x)$
- $\arccos(-x) = \pi - \arccos(x)$
- $\sin(\arctan(x)) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$
- $\cos(\arctan(x)) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}$


Hyperbolische Funktionen

- $\cosh(x) := \frac{e^x + e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \rightarrow [1, \infty]$
- $\sinh(x) := \frac{e^x - e^{-x}}{2} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
- $\tanh(x) := \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$



Es gilt **$\cosh^2 - \sinh^2 = 1$**

Inverse hyperbolische Funktionen



$$\text{arsinh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1}) = \int_0^x \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}} dt$$

$$\text{arcosh}(x) = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}) \quad \text{für } x \geq 1$$

$$\text{artanh}(x) = \tanh^{-1}(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) \quad \text{für } |x| < 1$$

$$\text{arsech}(x) = \ln\left(\frac{1+\sqrt{1-x^2}}{x}\right)$$

$$\text{arsch}(x) = \begin{cases} \ln\left(\frac{1+\sqrt{1+x^2}}{x}\right) & \text{für } x > 0 \\ \ln\left(\frac{1-\sqrt{1+x^2}}{x}\right) & \text{für } x < 0 \end{cases}$$

$$\text{arcoth}(x) = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right) \quad \text{für } |x| > 1.$$

Die Kreiszahl π

Wir definieren π als erste Nullstelle > 0 der Sinusfunktion.

$$\pi := \inf\{t > 0 : \sin t = 0\}$$

Es gilt dann:

- $\sin(\pi) = 0, \pi \in (2, 4)$
- $\forall x \in (0, \pi) : \sin(x) > 0$
- $e^{\frac{\pi}{2}} = i$

Verknüpfung, Verschiebung, Inverse

Verknüpfung von Funktionen

$$g(x) = k \cdot f(x):$$

- $k > 1$: Graph wird in y -Richtung von x -Achse weg gestreckt
- $0 < k < 1$: Graph wird in y -Richtung zur x -Achse hin ges-
 $\frac{1}{k}$ taucht
- $k < 0$: Graph wird zusätzlich an der x -Achse gespiegelt

$g(x) = k + f(x)$: **Verschiebung in vertikaler Richtung** um k Einheiten.

$$g(x) = f(x + k): (= f(h(x))) \text{ mit } h(x) = x + k$$

- $k < 0$: **Verschiebung in positiver horizontaler Richtung** um k Einheiten
- $k > 0$: **Verschiebung in negativer horizontaler Richtung** um k Einheiten

Verknüpfung zweier Funktionen:

$g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$ heisst **zusammengesetzte Funktion**; $s(u)$ nennt man **äussere (innere) Funktion**

Umkehrfunktion

Wenn wir Rollen von abhängiger und unabhängiger Variable tauschen können, so schreiben wir $t = f^{-1}(s)$ und f^{-1} nennen wir

Umkehrfunktion oder Inverse.

Eine Funktion **hat genau dann eine Inverse**, wenn ihr Graph von jeder Parallele zur x -Achse höchstens einmal geschnitten wird. Geometrisch findet man den Graphen der Inversen durch Spiegelung an der Geraden $y = x$.

Eine Zerlegung $a = y_0 < y_1 < \dots < y_{m-1} < y_m = b$ ist


Verfeinerung der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$, falls gilt $\{x_0, x_1, \dots, x_n\} \subseteq \{y_0, y_1, \dots, y_m\}$

$f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ ist **Treppenfunktion**, falls $\exists$ Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ von $[a, b]$ sodass $\forall k \in \{1, \dots, n\}$ die Restriktionen von f auf (x_{k-1}, x_k) , $f|_{(x_{k-1}, x_k)}$ konstant sind.

$\implies f$ ist Treppenfunktion bzgl. der Zerlegung $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$.

Das **Integral der Treppenfunktion** f über $[a, b]$ ist die reelle Zahl $\int_a^b f(x) dx := \sum_{k=1}^n c_k (x_k - x_{k-1})$, wobei c_k der Funktionswert von f auf dem Intervall (x_{k-1}, x_k) ist.

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Dann ist die Menge der **Obersummen** $\mathcal{U}(f) := \{\sum_{k=1}^n s(x_k - x_{k-1}) \mid s \in \mathcal{TF}, s \geq f\}$, respektive die Menge der **Untersummen** $\mathcal{L}(f) := \{\sum_{k=1}^n s(x_k - x_{k-1}) \mid s \in \mathcal{TF}, s \leq f\}$ wobei $\mathcal{TF}$ die Menge der Treppenfunktionen bezeichnet.



Riemann-Integrierbarkeit

Eine beschränkte Funktion $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ nennt man **Riemann-integrierbar**, falls gilt $\sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$.

In diesem Fall wird der Wert das **Riemann-Integral** von f

$$\int_a^b f dx := \sup \mathcal{L}(f) = \inf \mathcal{U}(f)$$

genannt.

a nennt man **untere Integrationsgrenze**, b **obere Integrationsgrenze** und f den **Integranden**.

Monotone Funktionen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sind Riemann-integrierbar.

Monotone Funktionen sind in Intervall $[a, b]$ beschränkt.

Gilt auch, wenn Funktion auf manchen Teilintervallen monoton wachsend und auf manchen Teilintervallen monoton fallend ist.

Stetige Funktionen $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ sind Riemann-integrierbar,

müssen aber nicht differenzierbar sein (z.B. Knickstellen ok!)

Beweis: f ist gleichmäßig stetig. Zeigen, dass der Unterschied zwischen $\mathcal{L}$ und $\mathcal{U}$ beliebig klein wird. Mit archimedischem Prinzip und glm. Stetigkeit lässt sich zeigen, dass $|f(x) - f(y)| < \epsilon' = \frac{\epsilon}{b-a}$, dann

zeigen dass das Integral $\int_a^b (\mathcal{U}(x) - \mathcal{L}(x)) dx < n\epsilon' \frac{(b-a)}{n} = \epsilon$. Dann ist f Riemann-integrierbar.

Gilt auch für Funktionen die **in endlich vielen Stellen nicht monoton oder stetig** sind (wegen Aufteilung des Integrationsbereichs).

f differenzierbar $\implies f$ stetig $\implies f$ integrierbar

Beschränkte Funktionen auf einem kompakten Intervall sind nicht zwingend integrierbar.

Die **Dirichlet-Funktion** $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$ ist nicht Riemann-integrierbar, da sie überall unstetig ist.

Rechenregeln

Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ zwei (Riemann-)integrierbare Funktionen.

- Linearität:** Seien zudem $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Dann ist auch $\alpha f + \beta g$ integrierbar und es gilt

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g)(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$$

- Monotonie:** Falls gilt $f \leq g$, so gilt auch

$$\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

- Dreicksungleichung:**

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$$

Vorstellung: Positionsänderung ist $\leq$ zurückgelegte Strecke

- Umkehrung der Integrationsrichtung:**

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

Vorstellung: Wir laufen wieder zurück

5. Aufteilung des Integrationsbereichs:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, a \leq c \leq b$$

Insb. interessant, wenn Integrationsbereich symmetrisch an Nullpunkt. Z.B. bei ungeraden Funktionen im Intervall $[-1, 1]$ ist Integral 0, bei geraden Funktionen $2x$ der Wert von $[0, 1]$.

Beweise für Rechenregeln: "Was passiert für Treppenfunktionen?", dann Approximations-Idee, allgemeiner zeigen.

Integrationstechniken

Partielle Integration Seien $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbare Funktionen.

$$\int_a^b f(x)g'(x) dx = f(x)g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x)g(x) dx$$

Folgt aus Hauptsatz und Produktregel: $\int_a^b \frac{d}{dx} f(x) \cdot g(x) dx = \int_a^b (f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)) dx = \int_a^b f'(x) \cdot g(x) dx + \int_a^b f(x) \cdot g'(x) dx = f \cdot g|_a^b = f(b)g(b) - f(a)g(a) \implies \int_a^b f(x)g'(x) dx = f(x) \cdot g(x)|_a^b - \int_a^b f'(x) \cdot g(x) dx$

Substitution, Version 1 Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ zwei Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig differenzierbar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt für alle $[a, b] \subset I$

$$\int_a^b g(f(x))f'(x) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) dy$$

Weil wir nicht mehr nach x integrieren sondern nach y müssen wir auch die Integrationsgrenzen anpassen und "schauen, wie wir die x in y übersetzen können".
Ggf. muss es etwas angepasst werden wenn bspw. eine Faktor als Abweichung bei der Ableitung besteht.

Substitution, Version 2 Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig differenzierbar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Für $[a, b] \subset I$ gelte $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a, b]$ und sei $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$ Inverse von $f|_{[a, b]}$. Dann

$$\int_a^b g(f(x)) dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)(f^{-1})'(y) dy$$

Hauptsatz

Hauptsatz der Integral- und Differentialrechnung:

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann ist für alle $C \in \mathbb{R}$ die Funktion

$$F(x) := \int_a^x f(y) dy + C$$

eine Stammfunktion von f . Jede Stammfunktion int von dieser Form. (Konstruktion von Stammfunktionen)

Beweis: f stetig $\implies f$ auf jedem Intervall $[a, x], x \in [a, b]$ integrierbar. Dann zeigen, dass F Stammfunktion von f ist (mit

ϵ/δ -Stetigkeitsdefinition), $\lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} - f(x_0) \right| = \lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{F'(x_0) - f(x_0)}{1} \right| = 0$ (einzeln zeigen für $x \in (x_0, x_0 + \delta) \cap [a, b]$ und $x \in (x_0 - \delta, x_0) \cap [a, b]$).

Sei $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig differenzierbar. Dann gilt für alle $x \in [a, b]$

$$F(x) = \underbrace{F(a)}_{\text{"Startwert"}} + \underbrace{\int_a^x F'(t) dt}_{\text{"Aufsummierung aller Veränderungseffekte"}}$$

Herleitung: Gem. Hauptsatz $F(x) = \int_a^x F'(y) dy + C, C \in \mathbb{R}$. Insbesondere: $F(a) = \underbrace{\int_a^a F'(y) dy}_{=0} + C$

Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ stetig und $F : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Stammfunktion von f . Dann gilt

$$\int_a^b f(t) dt = F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$$

(Berechnung von bestimmten Integralen via Stammfunktion)

Verallgemeinerung für unstetige f Für eine Funktion $\tilde{f}(y)$ mit endlich vielen Unstetigkeitsstellen $\{x_1, \dots, x_n\}$ ist $F(x) := \int_a^x f(y) dy + C$ noch eine Stammfunktion für $x \in [a, b] \setminus \{x_1, \dots, x_n\}$

Eindeutigkeit der Stammfunktion Der Hauptsatz liefert alle möglichen Stammfunktion.

Beweis: Sei $G(x)$ eine weitere Stammfunktion, dann $H(x) := G(x) - \int_a^x f(y) dy$. Dann gilt $H'(x) = f(x) - f(x) = 0 \forall x \in [a, b]$. Dann muss aber $H(x)$ eine Konstante sein, d.h. $H(x) = C, C \in \mathbb{R}$, dies bedeutet $C = G(x) - \int_a^x f(y) dy \iff G(x) = \int_a^x f(y) dy + C, C \in \mathbb{R}$

Mittelwertsatz der Integralrechnung

Mittelwertsatz der Integralrechnung Falls der Integrand $f(x)$ auf dem betrachteten Intervall $[a, b]$ stetig ist, gilt für ein $c \in [a, b]$

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Der Ausdruck $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ ist der **Mittelwert** von f über $[a, b]$.

Der Mittelwertsatz der Integralrechnung besagt, dass eine stetige Funktion auf einem geschlossenen Intervall mindestens einmal ihren durchschnittlichen (mittleren) Funktionswert annimmt. Geometrisch bedeutet dies, dass die Fläche unter der Kurve genau dem Flächeninhalt eines Rechtecks mit derselben Intervallbreite und der Höhe dieses Mittelwerts entspricht.

Cauchy-Schwarz für Integrale Für zwei beschränkte, (quadrat)integrierbare Funktionen $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ gilt

$$\left| \int_a^b f(x)g(x) dx \right| \leq \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx} \sqrt{\int_a^b g(x)^2 dx}$$

(Folgt aus Vektorungleichung $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq ||\mathbf{u}|| ||\mathbf{v}||$)

Für $g(x) = 1$:

$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \sqrt{b-a} \sqrt{\int_a^b f(x)^2 dx}$$

7 Differentialgleichungen

Gleichung, wo die gesuchte Grösse eine Funktion ist. Ableitung der gesuchten Funktion kann vorkommen.

Aufstellen von Differentialgleichungen

Typische Situation: Gegeben sind verschiedenen Informationen und gesucht ist die Entwicklung einer bestimmten Grösse.

- Wie verändert sich die betrachtete Grösse in einem kleinen Zeitintervall δt ?
Zuwachs / Abnahme / Nettobilanz
- Was ist die Differenz zwischen den Werten, falls die Zeiten nahe beieinander sind?
- Was ist die proportionale Veränderung? (Quotient)
- Was passiert mit dem Grenzwert $\delta t \rightarrow 0$?
- Zusammenfassen

Für jede Kraft F gilt insbesondere (nach Newton) $F = m\ddot{y} = ma$

Definition / Klassifizierung

Eine **Differentialgleichung** ist eine Gleichung, in der die gesuchte Funktion, sowie deren Ableitungen auftreten.

Beispiele:

$u'(t) = f(a - u(t))$, $u'(t) = r(a - u(t))(b - u(t))$, $u'(t) = ru(t)(1 - \frac{u(t)}{L})$ wobei r, a, b und L Konstanten sind, oder auch

$y^{(4)}(x) - 4y^{(3)}(x) + 5y^{(2)}(x) - 4y'(x) + 4y(x) = 0$

t, x heissen **unabhängige Variablen**, u, y heissen **abhängige Variablen**

Eine Differentialgleichung der Form

$$a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = s(x)$$

heisst **lineare Differentialgleichung** mit Koeffizienten $a_i(t)$.

Die Funktion $s(x)$ nennen wir **Störfunktion**.

Falls gilt $s(x) = 0$ heisst die Differentialgleichung **homogen**, andernfalls **inhomogen**.

Falls alle Funktionen $a_i(x)$ in der Differentialgleichung konstante Funktionen sind, nennen wir diese eine **Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten**.

Die **Ordnung** der Differentialgleichung ist die **maximale Ordnung der vorkommenden Ableitungen**.

Zeige dass alle Funktionen der Form $y(x) = a \cosh(\frac{x-x_0}{a}) + y_0$ die Differentialgleichung $(y - y_0)y'' - (y')^2 = 1$ lösen:
 $y(x)$ "berechnen": Ableitungen berechnen, einsetzen und rechnerisch nachweisen, dass dies = 1.
Für Anfangswertproblem die Anfangsbedingungen ebenfalls überprüfen.

Lineare, homogene Differentialgleichungen

$$a_n u^{(n)}(x) + a_{n-1} u^{(n-1)}(x) \dots + a_1 u'(x) + a_0 u(x) = 0$$

Superpositionsprinzip Sind $y_1(x)$ und $y_2(x)$ Lösungen einer linearen, homogenen Differentialgleichung, so ist auch $y(x) = C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x), C_1, C_2 \in \mathbb{R}$ eine Lösung derselben Differentialgleichung.

Geht nur für homogene Differentialgleichungen (weil falls $C_1 = C_2 = 0$)

Fundamentallösungen Eine lineare, homogene Differentialgleichung der Ordnung n besitzt n Lösungen $y_1(x), \dots, y_n(x)$, so ist die allgemeine Lösung dieser Gleichung gegeben durch $y(x) = C_1 y_1(x) + \dots + C_n y_n(x), C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R}$. Diese Lösungen werden **Fundamentallösungen** genannt.

Allgemeine Lösung finden (mit konstanten Koeffizienten)

Eulerscher Ansatz $u(x) = e^{\lambda x}$

Charakteristische Gleichung $a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0 = 0$ (folgt durch Einsetzen des Eulerschen Ansatzes in Gleichung (und dann Ausklammern von $e^{\lambda x}$))

Charakteristisches Polynom $p(\lambda) = a_n \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda + a_0$.

Jede einfache reelle Nullstelle λ des charakteristischen Polynoms erzeugt die Fundamentallösung $u(x) = e^{\lambda x}$

Jede Paar zweier zueinander komplex konjugierter Nullstellen $\lambda_{1,2} = a \pm ib$ erzeugt die beiden Fundamentallösungen $u_1(x) = e^{ax} \sin(bx)$, $u_2(x) = e^{ax} \cos(bx)$

Jede Nullstelle λ mit Multiplizität s erzeugt die s Fundamentallösungen $x^k e^{\lambda x}, k = 0, \dots, s-1$

Allgemeine Lösung:

- Falls alle r Nullstellen λ_i des charakteristischen Polynoms reell sind und Multiplizität m_i haben, gilt $u(x) = \sum_{i=0}^r (\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x})$
- Falls wir r reelle Nullstellen und s Paare komplexer Nullstellen $(a_j \pm ib_j)$ mit jeweils Multiplizität m_i haben, gilt $u(x) = \sum_{i=0}^r (\sum_{p=0}^{m_i-1} C_{ip} x^p e^{\lambda_i x}) + \sum_{j=0}^s (\sum_{q=0}^{m_j-1} (A_{jq} x^q e^{a_j x} \sin(b_j x) + B_{jq} x^q e^{a_j x} \cos(b_j x)))$

Allgemeine Lösung einer linearen, homogenen Differentialgleichung mit Parametern, bspw. $u''(x) - (a+b)u'(x) + abu(x) = 0$

Charakteristisches Polynom lösen; ergibt $\lambda_1 = a, \lambda_2 = b$, dann Fallunterscheidung für $a \neq b$ und $a = b$. Separat allgemeine Lösungen bestimmen (siehe oben).
Wenn man eine Anfangswertaufgabe mit dieser Gleichung anschaut, kann man mithilfe von Taylorreihen und Vereinfachen zeigen, dass die Lösung für $a \neq b$ und $b \rightarrow a$ gegen die Lösung für den Fall $a = b$ konvergiert.

Differentialgleichungen erster Ordnung

$$\frac{dy}{dx} = x + y \iff y' - y - x = 0$$

oder auch

$$(y')^2 + y = x$$

Lösung finden

Trennung der Variablen

"Alles was mit x zu tun hat auf eine Seite, alles andere auf die andere Seite", **eignet sich für** $y'(x) = f(x) \cdot g(y)$.

- Differentialgleichung in Form $\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$ bringen
- Umstellen zu $\frac{1}{g(y)} dy = f(x) dx$
- Beidseitig integrieren und berechnen (mit Konstanten!)
- Nach y auflösen

Beispiel: Newtonsches Abkühlungsgesetz
Löse $y'(t) = -k(y - y^*) \iff \frac{dy}{dt} = -k(y - y^*) = f(t) \cdot g(y)$ mit $f(t) = -k$ und $g(y) = y - y^*$
 $\implies \int \frac{1}{y - y^*} dy = \int -k dt$
 $\implies \ln|y - y^*| = -kt + C, C \in \mathbb{R}$
 $\implies |y - y^*| = e^{-kt+C} = e^{-kt}e^C = Ce^{-kt}, C \in \mathbb{R}$
 $\implies y - y^* = Ce^{-kt}, C \in \mathbb{R}$
 $\implies y = y(t) = y^* + Ce^{-kt}, C \in \mathbb{R}$

Substitution (Einführung einer neuen Variable)
Eignet sich für $\frac{du}{dx} = u'(x) = f(ax + bu(x) + c)$ (Rechte Seite linear in x und in u).

- Neue Variable/Funktion linear in x und $u(x)$ einführen ($z(x) := ax + bu(x) + c$)
- Ableiten
- $\frac{du}{dx}$ ersetzen durch z
- Mit Trennung der Variablen lösen
- Rücksubstituieren: $z(x) = ax + bu(x) + c = \dots$ umformen nach $u(x)$.

Beispiel: $u'(x) = -3x + 2u(x) - 5$.
Neue Variable/Funktion: $z(x) := -3x + 2u(x) - 5$. Dann gilt: $\frac{dz}{dx} = -3 + 2\frac{du}{dx} = -3 + 2z \rightarrow$ trennbar).
Lösen ergibt $z(x) = \frac{3}{2} + De^{2x}, D \in \mathbb{R}$, dann rücksubstituieren: $z(x) = -3x + 2u(x) - 5 = \frac{3}{2} + De^{2x} \implies u(x) = De^{2x} + \frac{3}{2}x + \frac{13}{4}, D \in \mathbb{R}$

Eignet sich auch für $\frac{du}{dx} = u'(x) = f(\frac{y}{x})$ (**homogen in den Variablen**, "Rechte Seite hängt nur vom Verhältnis $\frac{x}{y}$ ab").

- Neue Variable/Funktion $z(x) = \frac{y}{x}$ wählen.
- $z(x) = \frac{y}{x} \iff z(x) \cdot x = y(x)$
- Ableiten (Produktregel): $z(x) + x \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{dy}{dx} = \dots$
- $y'(x)$ einsetzen: Beispielsweise: $\dots = z(x) + z^{-2}(x)$
- Umstellen nach $\frac{dz}{dx} = f(x) \cdot g(z)$ und Trennung der Variablen anwenden.
- Rücksubstituieren: $z(x) = \dots = \frac{y(x)}{x}$ nach $y(x)$ auflösen.

Beispiel: $y'(x) = \frac{y}{x} + \frac{x^2}{y^2}$
Neue Variable/Funktion: $z(x) = \frac{y}{x} \iff z(x) \cdot x = y(x)$
Durch Ableiten: $z(x) + x \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{dy}{dx} = z(x) + z^{-2}(x) \implies x\frac{dz}{dx} = z^{-2} \implies \frac{dz}{dx} = z^{-2} \cdot x^{-1} \rightarrow$ trennbar).
Lösen durch Trennung: $z(x) = (3 \ln|x| + C)^{\frac{1}{3}}, C \in \mathbb{R}$
Rücksubstituieren: $z(x) = (3 \ln|x| + C)^{\frac{1}{3}} = \frac{y(x)}{x} \implies y(x) = x(3 \ln|x| + C)^{\frac{1}{3}}, C \in \mathbb{R}$

Logistische Differentialgleichung $\frac{dP}{dt} = P' = kP(1 - \frac{P}{L}), k, L \in \mathbb{R}, P, L \neq 0$
Lösungsansatz: Substitution mit $u := \frac{1}{P}$. $u' = -\frac{1}{P^2}P' = -\frac{1}{P^2}kP(1 - \frac{P}{L}) = -k(\frac{1}{P} - \frac{1}{L}) \iff \frac{du}{dt} = u' = -k(u - \frac{1}{L})$. Lösen mit Trennung der Variablen.
 $\implies P(t) = \frac{1}{u(t)} = \frac{L}{Ae^{-kt} + 1}, A \in \mathbb{R}$
Relevanz: Modelliert beschränktes Wachstum.

Variation der Konstanten (lineare, inhomogene Differentialgleichung): siehe unten

Lineare, inhomogene Diff.-gleichungen

$a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = s(x) \neq 0$
Für eine solche inhomogene Differentialgleichung heisst $a_n(x)y^{(n)}(x) + \dots + a_0(x)y(x) = 0$ die **dazugehörige homogene Differentialgleichung**.

Allgemeine Lösung finden

Ist $y_p(x)$ eine **partikuläre Lösung** einer linearen, inhomogenen Differentialgleichung und $y_h(x)$ die allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung, so ist

$y(x) = y_h(x) + y_p(x)$

die allgemeine Lösung der linearen, inhomogenen Differentialgleichung.

Bestimmen einer partikulären Lösung

Variation der Konstante (für Differentialgleichung erster Ordnung)

- Allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung berechnen (Z.B. mit dem Eulerschen Ansatz oder Substitution/Trennung der Variablen)
- Ansatz: In allgemeiner Lösung statt Konstante eine Funktion $C(x)$ einsetzen.
- Einsetzen in ursprüngliche Differentialgleichung. Dann Terme wegkürzen (sollte immer möglich sein!).
- Auflösen nach $C(x)$ (z.B. durch integrieren)
- $C(x)$ in (2.) einsetzen.
- Für partikuläre Lösung ggf. Konstante fixieren.
- Für allgemeine Lösung die allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung addieren.

Geeignete Ansätze für partikuläre Lösung

(auch für Differentialgleichungen höherer Ordnung anwendbar)
Partikuläre Lösung sieht ähnlich aus wie Störfunktion. Wir können einen "besseren" Ansatz nehmen, um uns Rechenaufwand zu sparen.

Nullstellen des charakteristischen Polynoms müssen beachtet werden!

Rechte Seite der Diff.-gl. / Störfunktion	Ansatz für die partikuläre Lösung
Polynom $s(t) = a_0 + a_1t + \dots + a_nt^n$ Spezialfall: 0 ist eine m-fache Nullst. des charakteristischen Polynoms	$y(t) = C_0 + C_1t + \dots + C_nt^n$ $y(t) = (C_0 + C_1t + \dots + C_nt^n)t^m$
Exponentialfunktion $s(t) = Ae^{kt}$ Spezialfall: k ist eine m-fache Nullst. des charakteristischen Polynoms	$y(t) = Ce^{kt}$ $y(t) = (Ce^{kt})t^m$
Schwingung $s(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ Spezialfall: $i\omega$ ist eine m-fache Nullst. des charakteristischen Polynoms	$y(t) = C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t)$ $y(t) = (C_1 \sin(\omega t) + C_2 \cos(\omega t))t^m$

- Allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung berechnen.
- Nullstellen des charakteristischen Polynoms betrachten.
- Geeigneten Ansatz wählen ($\rightarrow$ Tabelle).
- Diesen Ansatz in ursprüngliche Differentialgleichung einsetzen und nach Unbekannten auflösen.
- Für allgemeine Lösung die allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung addieren.

Löse $u'''(t) - u'(t) = t^2 + e^t$
1. Allgemeine Lösung der dazugehörigen homogenen Diff.-Gleichung berechnen.
2. Partikuläre Lösung von $u'''(t) - u'(t) = t^2$ berechnen.
3. Partikuläre Lösung von $u'''(t) - u'(t) = e^t$ berechnen.
4. Partikuläre Lösungen addieren (gem. Superpositionsprinzip) $\rightarrow$ partikuläre Lösung.
5. Für Allgemeine Lösung partikuläre Lösung zur allgemeinen Lösung der dazugehörigen homogenen Differentialgleichung addieren.

8 Tabellen, Listen, etc.

Nützliche Formeln

ax^2 + bx + c = 0 => x = (-b +/- sqrt(b^2 - 4ac)) / (2a)

b^n - a^n = (b - a)(b^{n-1} + b^{n-2} * a + ... + a^{n-2} * b + a^{n-1})

(n choose k) = (n! / ((n-k)!k!)) ; sqrt(a_k * a_{k+1}) <= (a_k + a_{k+1}) / 2

Bernoulli Ungleichung

(1 + x)^n >= 1 + n * x for all n in N, x > -1

Young'sche Ungleichung

forall epsilon > 0, forall x, y in R: 2|x*y| <= epsilon^2 + (1/epsilon)*y^2

Binomialsatz

(x + y)^n = sum_{k=0}^n (n choose k) * x^{n-k} * y^k

Trigonometrischen Funktionen

α	0	30° $\frac{\pi}{6}$	45° $\frac{\pi}{4}$	60° $\frac{\pi}{3}$	90° $\frac{\pi}{2}$	120° $\frac{2\pi}{3}$	150° $\frac{5\pi}{6}$	180° π	270° $\frac{3\pi}{2}$
$\sin \alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\cos \alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	-1	0
$\tan \alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	N/A	$-\sqrt{3}$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	0	N/A

	in terms of $\sin \theta$	in terms of $\cos \theta$	in terms of $\tan \theta$
$\sin \theta =$	$\sin \theta$	$\pm \sqrt{1 - \cos^2 \theta}$	$\pm \frac{\tan \theta}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}}$
$\cos \theta =$	$\pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$	$\cos \theta$	$\pm \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}}$
$\tan \theta =$	$\pm \frac{\sin \theta}{\sqrt{1 - \sin^2 \theta}}$	$\pm \frac{\sqrt{1 - \cos^2 \theta}}{\cos \theta}$	$\tan \theta$

Bekannte Taylorreihen

Gültig für alle x in R

e^x = sum_{n=0}^inf x^n / n! = 1 + x + x^2/2 + x^3/3! + x^4/4! + O(x^5)

sin x = sum_{n=0}^inf (-1)^n * x^{2n+1} / (2n+1)! = x - x^3/3! + x^5/5! + O(x^7)

sinh(x) = sum_{n=0}^inf x^{2n+1} / (2n+1)! = x + x^3/3! + x^5/5! + O(x^7)

cos(x) = sum_{n=0}^inf (-1)^n * x^{2n} / (2n)! = 1 - x^2/2 + x^4/4! - x^6/6! + O(x^8)

cosh(x) = sum_{n=0}^inf x^{2n} / (2n)! = 1 + x^2/2 + x^4/4! + x^6/6! + O(x^8)

Gültig für |x| < 1

log(1 + x) = sum_{n=1}^inf (-1)^{n+1} * x^n / n = x - x^2/2 + x^3/3 - x^4/4 + O(x^5)

(1 + x)^alpha = sum_{n=0}^inf (alpha choose n) * x^n = 1 + alpha * x + (alpha(alpha-1)/2!) * x^2 + (alpha(alpha-1)(alpha-2)/3!) * x^3 + O(x^4)

sqrt(1 + x) = sum_{n=0}^inf (1/2 choose n) * x^n = 1 + x/2 - x^2/8 + x^3/16 - O(x^4)

Gültig für |x| < pi/2

tan(x) = sum_{n=1}^inf ((-1)^{n-1} * 2^{2n} * (2^{2n} - 1) * B_{2n}) / (2n)! * x^{2n-1} = x + x^3/3 + 2x^5/15 + O(x^7)

tanh(x) = sum_{n=1}^inf (2^{2n} * (2^{2n} - 1) * B_{2n}) / (2n)! * x^{2n-1} = x - x^3/3 + 2x^5/15 + O(x^7)

Typische Grenzwerte / Folgen

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^m} = \infty$	$\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln(x) = \infty$	$\lim_{x \rightarrow 0} \ln(x) = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} (1+x)^{\frac{1}{x}} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^b = 1$	
$\lim_{x \rightarrow \infty} x^a q^x = 0, \forall 0 \leq q < 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} n^{\frac{1}{n}} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = \frac{1}{e}$
$\lim_{x \rightarrow \pm \infty} \left(1 + \frac{k}{x}\right)^{mx} = e^{km}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\cos(x)} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log 1 - x}{x} = -1$	$\lim_{x \rightarrow 0} x \log x = 0$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \arctan x = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x}{x+k}\right)^x = e^{-k}$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln(a) \forall a > 0$	$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{ax} - 1}{x} = a$
$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = 1$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log(x)}{x} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1$	$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^a}{x^b} = 0$
$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} -\tan x = +\infty$	$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} +\tan x = -\infty$
$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$	$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$

Typische Ableitungen und Stammfunktionen

$F(x)$	$F'(x) = f(x)$
c	0
x^a	$a \cdot x^{a-1}$
$\frac{1}{a+1} x^{a+1}$	x^a
$\frac{1}{a \cdot (n+1)} (ax+b)^{n+1}$	$(ax+b)^n$
$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$x^\alpha, \alpha \neq -1$
$\frac{\sqrt[n]{x}}{n}$	$\frac{1}{n} x^{\frac{1}{n}-1}$
$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$	$\sqrt{x}$
$\frac{n}{n+1} x^{\frac{1}{n}+1}$	$\frac{\sqrt[n]{x}}{x}$
e^x	e^x
$\ln(x)$	$\frac{1}{x}$
$\log_a x $	$\frac{1}{x \ln a} = \log_a(e) \frac{1}{x}$
$\sin(x)$	$\cos(x)$
$\cos(x)$	$-\sin(x)$
$\tan(x)$	$\frac{1}{\cos^2(x)} = 1 + \tan^2(x)$
$\cot(x)$	$-\frac{1}{\sin^2(x)}$
$\arcsin(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arccos(x)$	$-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
$\arctan(x)$	$\frac{1}{1+x^2}$
$\sinh(x)$	$\cosh(x)$
$\cosh(x)$	$\sinh(x)$
$\tanh(x)$	$\frac{1}{\cosh^2(x)} = 1 - \tanh^2(x)$
$\operatorname{arsinh}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$
$\operatorname{arccosh}(x)$	$\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$
$\operatorname{arctanh}(x)$	$\frac{1}{1-x^2}$
$\frac{1}{f(x)}$	$\frac{-f'(x)}{(f(x))^2}$
$\frac{x^x}{a^{cx}}$	$a^{cx} \cdot c \ln a$
x^x	$x^x \cdot (1 + \ln x)$
$(x^x)^x$	$(x^x)^x (x + 2x \ln(x))$
$x(x^x)$	$x(x^x)(x^{x-1} + \ln x \cdot x^x(1 + \ln x))$

$F(x)$	$F'(x) = f(x)$
$\frac{1}{a} \ln(ax+b)$	$\frac{1}{ax+b}$
$\frac{ax}{c} - \frac{ad-bc}{c^2} \ln cx+d $	$\frac{ax+b}{cx+d}$
$\frac{1}{2a} \ln\left \frac{x-a}{x+a}\right $	$\frac{1}{x^2-a^2}$
$\frac{\pi}{2} f(x) + \frac{a^2}{2} \ln(x+f(x))$	$\sqrt{a^2+x^2}$
$\frac{\pi}{2} \sqrt{a^2-x^2} - \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{ a }$	$\sqrt{a^2-x^2}$
$\frac{\pi}{2} f(x) - \frac{a^2}{2} \ln(x+f(x))$	$\sqrt{x^2-a^2}$
$\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})$	$\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}$
$\arcsin\left(\frac{x}{ a }\right)$	$\frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}}$
$\frac{1}{a} \arctan\left(\frac{x}{a}\right)$	$\frac{1}{x^2+a^2}$
$-\frac{1}{a} \cos(ax+b)$	$\sin(ax+b)$
$\frac{1}{a} \sin(ax+b)$	$\cos(ax+b)$
$-\ln \cos(x) $	$\tan(x)$
$\ln \sin(x) $	$\cot(x)$
$\ln\left \tan\left(\frac{x}{2}\right)\right $	$\frac{1}{\sin(x)}$
$\ln\left \tan\left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4}\right)\right $	$\frac{1}{\cos(x)}$
$\frac{1}{2}(x-\sin(x)\cos(x))$	$\sin^2(x)$
$\frac{1}{2}(x+\sin(x)\cos(x))$	$\cos^2(x)$
$\tan(x) - x$	$\tan^2(x)$
$-\cot(x) - x$	$\cot^2(x)$
$x \arcsin(x) + \sqrt{1-x^2}$	$\arcsin(x)$
$x \arccos(x) - \sqrt{1-x^2}$	$\arccos(x)$
$x \arctan(x) - \frac{1}{2} \ln(1+x^2)$	$\arctan(x)$
$\ln(\cosh(x))$	$\tanh(x)$
$\ln f(x) $	$\frac{f'(x)}{f(x)}$
$x \cdot (\ln x - 1)$	$\ln x $
$\frac{1}{n+1} (\ln x)^{n+1}$	$\frac{1}{x} (\ln x)^n$
$\frac{1}{2^n} (\ln x)^2$	$\frac{1}{x} \ln x$
$\ln \ln x $	$\frac{1}{x \ln x}$
$\frac{1}{c^2} \frac{b \ln a}{c^2} a^{bx}$	a^{bx}
$\frac{x^{n+1}}{n+1} \left(\ln x - \frac{1}{n+1}\right)$	$x^n \ln x$
$\frac{e^{cx} (c \sin(ax+b) - a \cos(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{cx} \sin(ax+b)$
$\frac{e^{cx} (c \cos(ax+b) + a \sin(ax+b))}{a^2+c^2}$	$e^{cx} \cos(ax+b)$
$\frac{\sin^2(x)}{2} = -\frac{\cos^2(x)}{2}$	$\sin(x) \cos(x)$

Diverses

f arsinh(x) dx = x * arsinh(x) - sqrt(x^2 + 1) + C

f arcosh(x) dx = x * arcosh(x) - sqrt(x^2 - 1) + C

TODO: Physikalische Formeln?

lim_{n -> inf} (1 + x/n)^n = e^x

9 Aufgaben