

$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ nennen wir

- **ungerade** , falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = -f(x)$
z.B. ungerade Potenzen von x
- **gerade** , falls gilt $\forall x \in \mathbb{R} f(-x) = f(x)$
z.B. gerade Potenzen von x

Der **Graph** einer Funktion (Menge aller Punkte der Form $(x, f(x))$) heisst **linksgekrümmt (konvex)** / **rechtsgekrümmt (konkav)** , falls der Graph beim Durchlaufen von links nach rechts eine Linkskurve (z.B. $f(x) = x^2$) / Rechtskurve (z.B. $f(x) = -x^2$) vollführt.

Kann mit Vergleichsskante überprüft werden. Eine Funktion kann in gewissen Abschnitten konvex und in anderen konkav sein.

4.2 Grenzwerte

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, es sei $x_0 \in \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$. Dann ist $L \in \mathbb{R}$ der **Grenzwert/Limes** von $f(x)$ an der Stelle x_0 , falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ sodass $x \in \mathbb{D}(f) \cup (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$. Der Grenzwert L ist **eindeutig bestimmt**.

(Falls für Argumente x , welche genügend nahe bei x_0 liegen (hier "Abstand" im Gegensatz zu Index bei Folgen) , der Wert $f(x)$ der Zahl L beliebig nahe kommt, ist L Limes/Grenzwert von $f(x)$ an der Stelle x_0 .)

Existenz eines Grenzwertes impliziert nicht, dass f an der Stelle x_0 definiert sein muss.

Wenn der Funktionswert $f(x_0)$ existiert, muss er gleich dem Grenzwert L sein (nach unserer Definition).

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$ genau dann, wenn **für jede konvergente Folge** $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$, welche gegen x_0 konvergiert, gilt $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$.

Zeige, dass $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(\frac{1}{x})$ nicht existiert:
Gem. Folgenkriterium für Grenzwerte genügt es zu zeigen, dass eine Folge (x_n) mit $x_n \rightarrow 0$ existiert, sodass die Funktion mit den Elementen der Folge nicht konvergiert: $\sin(\frac{1}{x_n}) = \sin(\frac{\pi n}{2})$ konvergiert nicht, denn $\sin(\frac{\pi n}{2}) = \begin{cases} 1, & n \equiv 1 \pmod{4} \\ -1, & n \equiv 3 \pmod{4} \\ 0, & n \equiv 0 \pmod{2} \end{cases}$.

4.2.1 Rechenregeln

Wir nehmen an, es gelte $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm \infty)$, $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm \infty)$ und A sei eine beliebige feste Zahl. Dann gilt:

- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- Falls $L \neq 0$, haben wir $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = K/L$

4.2.2 Einseitige Grenzwerte

Wir nehmen an es gelte $\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \forall \delta > 0$.

Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L , d.h. $\lim_{x \geq x_0} f(x) = L$

Respektive falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f in x_0 den **rechtsseitigen Grenzwert** L , d.h. $\lim_{x > x_0} f(x) = L$

4.2.3 Grenzwerte im Unendlichen

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \forall R > 0$.

Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen unendlich** den Grenzwert L , d.h. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$.

Es sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ und es gelte $\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \forall R > 0$. Falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists M > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \implies |f(x) - L| < \epsilon$ hat f **für x gegen $-\infty$** den Grenzwert L , d.h. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

4.2.4 Uneigentliche Grenzwerte

Falls gilt $\forall N > 0 \exists \delta > 0$ so dass $x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \implies f(x) \geq N$ hat f in x_0 den **uneigentlichen Grenzwert** ∞ (divergiert f gegen unendlich), d.h. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

Zeige, dass $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$:

Da $|\sin x| \leq 1$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt $|x \sin(\frac{1}{x})| \leq |x|$. Da $|x| \rightarrow 0$ für $x \rightarrow 0$ gilt gemäss Sandwichsatz, dass $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin(\frac{1}{x}) = 0$.

4.3 Stetigkeit

Eine Funktion $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$ heisst **an der Stelle x_0 stetig** falls gilt $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x \in I(|x - x_0| < \delta \implies |f(x) - f(x_0)| < \epsilon)$.

Arten von Unstetigkeitsstellen: Definitionslücken, Sprungstellen, Polstellen, Grenzwert auf einer Seite existiert nicht (weder eigentlich noch uneigentlich).

Die Funktion nennen wir **stetig** falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

Zeigen, dass Fkt. stetig ist:

- Zeige dass für jedes $\epsilon \in \mathbb{R}$ existiert, sodass Definition erfüllt ist.
- Argumentieren, dass aus Rechenregeln folgt, dass Fkt. stetig ist (Fkt. zusammengesetzt aus stetigen Funktionen, z.B. $\frac{x}{x^2+2}$).

Zeigen, dass Fkt. nicht stetig ist: Zeige, dass z.B. Definitionslücke oder Sprungstelle an einer Stelle besteht.

Falls f an der Stelle x_0 nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

Stetige Fortsetzung "Dieselbe Funktion mit Lücke eingesetzt"

Parameter finden, sodass zusammengesetzte Funktion stetig ist: Schauen, dass keine Sprungstellen entstehen.

Sei $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$, und es sei $x_0 \in \mathbb{D}$. Falls gilt $\lim_{x \geq x_0} x \rightarrow x_0 f(x) = f(x_0)$ nennen wir den Punkt x_0 **rechtsstetig** . **Linksstetigkeit** ist analog definiert.

Sei $f : D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$ eine Funktion und $x_0 \in D$. Dann ist f an der Stelle x_0 **genau dann stetig, wenn** für jede Folge $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ mit $x_n \rightarrow x_0$ die Folge $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$ gegen $f(x_0)$ konvergiert (Folgenstetigkeit).

Alternativ kann Stetigkeit auch so definiert werden: $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$. Dann ist f genau dann stetig, wenn die Urbilder $f^{-1}(A)$ von offenen Mengen ebenfalls wieder offen sind.
 $f^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{D}(f) | f(x) \in A\}$

Stetigkeit der Umkehrfunktion: Es sei I ein Intervall und es sei $f : I \rightarrow J$ eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch J ein Intervall und die Umkehrfunktion $f^{-1} : J \rightarrow I$ ist stetig.

Bew.-Idee: f streng monoton - J ist auch Intervall - Stetigkeit

Zwischenwertsatz: Es sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es sei c eine Zahl zwischen $f(a)$ und $f(b)$. Dann gibt es (mindestens) ein $x \in [a, b]$ mit $f(x) = c$.

Spezialfall: Es sei $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion und es seien $a, b \in I$ mit $f(a) < 0$ und $f(b) > 0$. Dann hat f mindestens eine Nullstelle zwischen a und b .

Kann oft auch auf abgewandelte Funktion angewandt werden:
Sei $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ stetig, zeige dass $\exists x \in [a, b]$ mit $f(x) = x$ ("Fixpunkt"): Falls nicht $f(a) = a$ oder $f(b) = b$ betrachte $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f(x) - x$.

Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man **kompakt** .

Es sei $[a, b]$ ein kompaktes Intervall und es sei $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ in $[a, b]$. Dann **existiert eine Teilfolge** $(s_n k)_{k \in \mathbb{N}_0}$ mit $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{s_n k} = x_0$ mit $x_0 \in [a, b]$.

Stetige Funktion auf kompaktem Intervall: Sei $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ stetige Funktion und I kompakt. Dann ist f beschränkt und f nimmt sein Maximum und Minimum auf I an, d.h. es gibt ein $x_{min} \in I$ und ein $x_{max} \in I$ mit $\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max})$.

4.3.1 Rechenregeln

Wir gehen von zwei stetigen Funktionen $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aus.

Dann gilt:

- $f + g$ ist stetig
- $f - g$ ist stetig
- $c \cdot f$, respektive $c \cdot g$, ist für jede beliebige Konstante $c \in \mathbb{R}$ stetig
- $f \cdot g$ ist stetig
- $\frac{f}{g}$ ist stetig, sofern $g \neq 0$

1. Ausserdem ist die **Verknüpfung stetiger Funktionen** wiederum stetig. Genauer: Es seien $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f)$ und $g : \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$ zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung $g(f(x)) = g \circ f(x)$ ebenfalls stetig und es gilt $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$

4.4 Elementare Funktionen

4.4.1 Lineare Funktion

$$y = f(x) = mx + 1, \text{ resp. } x \mapsto mx + q$$

Graph ist eine Gerade mit Steigung m und y -Achsenabschnitt q .

Änderungsrate (Verhältnis des Differenz im Wertebereich zur Definition im Definitionsbereich) ist konstant.
 $\frac{f(x+y)-f(x)}{x+y-x} = \frac{mx+my+q-mx-q}{y} = \frac{my}{y} = m$

Proportionalitäten: Falls zwischen y und x eine Beziehung der Form $y = a \cdot x$ (a eine konstante reelle Zahl) gilt, so heisst y (direkt) **proportional** zu x . a nennt man **Proportionalitätskonstante**.

4.4.2 Exponentialfunktion $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$\exp(x) = e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$$

exp ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.

$\exp(0) = 1$, $\exp(-x) = (\exp(x))^{-1} \forall x \in \mathbb{R}$, $\exp(x+y) = \exp(x)\exp(y) \forall x, y \in \mathbb{R}$

Exponentialfunktion (Verallgemeinerung):

$$z = f(t) = z_0 \cdot a^t = z_0 e^{kt}$$

mit $z_0 > 0$ heisst Exponentialfunktion mit **Anfangswert** $z_0 = z(0)$ und **Wachstumsfaktor / Basis** a .

Relative Zunahme ist konstant: $\frac{z(t+s)}{z(t)} = \frac{z_0 a^{t+1}}{z_0 a^t} = a^s$

4.4.3 Logarithmus

Die eindeutig definierte Inverse zur Exponentialfunktion heisst (natürlicher) Logarithmus $\log(x) : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$.

Der Logarithmus **log ist bijektiv, streng monoton wachsend und stetig.**

$\log(1) = 0$, $\log(x^{-1}) = -\log(x) \forall x \in \mathbb{R}^+$, $\log(xy) = \log(x) + \log(y) \forall x, y \in \mathbb{R}^+$

4.4.4 Verknüpfung von Funktionen

$g(x) = k \cdot f(x)$:

- $k > 1$: Graph wird in y -Richtung von x -Achse weg gestreckt
 - $0 < k < 1$: Graph wird in y -Richtung zur x -Achse hin gestaucht
 - $k < 0$: Graph wird zusätzlich an der x -Achse gespiegelt
- $g(x) = k + f(x)$: **Verschiebung in vertikaler Richtung** um k Einheiten.
 $g(x) = f(x + k)$: $(= f(h(x))$ mit $h(x) = x + k)$

- $k < 0$: **Verschiebung in positiver horizontaler Richtung** um k Einheiten
- $k > 0$: **Verschiebung in negativer horizontaler Richtung** um k Einheiten

Verknüpfung zweier Funktionen:



$g(x) = s(u(x)) = s \circ u(x)$ heisst **zusammengesetzte Funktion** ; $s(u)$ nennt man **äussere (innere) Funktion**

4.4.5 Umkehrfunktion

Wenn wir Rollen von abhängiger und unabhängiger Variable tauschen können, so schreiben wir $t = f^{-1}(s)$ und f^{-1} nennen wir **Umkehrfunktion oder Inverse**.


Eine Funktion **hat genau dann eine Inverse**, wenn ihr Graph von jeder Parallele zur x -Achse höchstens einmal geschnitten wird. Geometrisch findet man den Graphen der Inversen durch Spiegelung an der Geraden $y = x$.

4.4.6 Trigonometrische Funktionen



$\sin(x) = \frac{GK}{H} = \frac{AK}{H}$, $\cos(x) = \frac{AK}{H} = \frac{GK}{AK}$, $\tan(x) = \frac{GK}{AK} = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$
 $\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$, $\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$, $\tan(-\alpha) = -\tan(\alpha)$
 $\sin^2(\alpha) + \cos^2(\alpha) = 1$
Definitionsbereich / Wertebereich:
 $\sin/\cos : \mathbb{D} = \mathbb{R} / W = [0, 1]$
 $\tan : \mathbb{D} = \mathbb{R} \setminus \{k \cdot \pi + \frac{\pi}{2} | k \in \mathbb{Z}\} / W = \mathbb{R}$

4.4.7 Hyperbolische Funktionen



$\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \in (-\infty, \infty)$, $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \in [1, \infty)$, $\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \in (-1, 1)$
 $\mathbb{D} = \mathbb{R}$

4.4.8 Potenzen, Polynome und rationale Funktionen

$y = f(x) = k \cdot x^p$ mit $k, p \in \mathbb{R}$ heisst **Potenzfunktion**.

$y = f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 = \sum_{s=0}^n a_s x^s$

mit $n \in \mathbb{N}$, $a_n \neq 0$, $a_s \in \mathbb{R}$ heisst **Polynom** (ganzrationale Funktion). Die Konstanten a_s heissen **Koeffizienten**. n heisst der **Grad** des Polynoms.

$y = f(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ wobei $p(x)$ und $q(x)$ Polynome sind, heisst **rationale Funktion**.

4.5 Ableitung

Mittlere (durchschnittliche) Änderungsrate von f im Definitionsbereich zwischen a und a + h: $\frac{\delta y}{\delta x} = \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$
= Differenzenquotient (Sekantensteigung)

Ableitung / Differentialquotient an der Stelle a ist gegeben durch (sofern der Grenzwert existiert):

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = \lim_{b \rightarrow a} \frac{f(b)-f(a)}{b-a} = \frac{dy}{dx}|_{x=a} = \frac{df}{dx}|_{x=a}$$

momentante Änderungsrate / Tangentensteigung / Vorzeichen: Zu- oder Abnahme
Ausgehend von einer gegebenen Funktion f : domain(f) → ℝ, x ↦ y = f(x) ist die Ableitungsfunktion definiert durch a ↦ f'(a) = $\frac{dy}{dx}|_{x=a}$. Es gilt auf jeden Fall $\mathbb{D}(f) \supseteq \mathbb{D}(f')$.
Bsp.: f(x) = |x|. Für x = 0 existiert keine Ableitung (Knickstelle). Punkte, an welchen keine Ableitung erwartet werden kann: Definitionslücken / Unstetigkeitsstellen, insb. Sprungstellen / Knickstellen.

4.5.1 Differenzierbarkeit

Falls für Funktion f die Ableitung f'(x) an der Stelle x existiert, nennen wir f an der Stelle x differenzierbar.
Falls f für alle Argumente x des Definitionsbereichs differenzierbar ist, nennen wir f differenzierbar.
Ist f an der Stelle x0 differenzierbar, so ist f an dieser Stelle insbesondere stetig.

Verkettung differenzierbarer Funktionen ist ebenfalls differenzierbar.

Zeigen, dass Funktion an Stelle x nicht differenzierbar ist:

- Zeige, dass Fkt. nicht stetig
- Zeige, dass Differentialquotient $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$ nicht definiert ist (z.B. divergiert oder oszilliert)
- Zeige, dass links- und rechtsseitige Ableitung nicht übereinstimmen.

4.5.2 Einsetige Ableitungen

Falls der Grenzwert
$$\lim_{h > 0} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h}$$

existiert, nennt man diesen die rechtsseitige Ableitung, respektive f an der Stelle a von rechts differenzierbar. Analog ist die Ableitung von links definiert.

4.5.3 Höhere Ableitungen

Falls f : D ⊂ ℝ → ℝ eine Funktion. Iterativ definieren wir höhere Ableitungen für n ∈ ℕ0:

$$f^{(0)} = f, f^{(1)} = f', f^{(2)} = f'', f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$$

Falls f(n) existiert, nennt man f n-fach differenzierbar. Falls die n-ten Ableitungen auch noch stetige Funktionen sind, nhen wir f n-fach stetig differenzierbar.

Die Menge aller n-fach stetig differenzierbarer Funktionen auf D bezeichnen wir mit Cn(D).
Ausserdem setzen wir C∞(D) := $\cap_{n=0}^\infty C^n(D)$ und nennen Funktionen in C∞(D) glatte Funktionen.

4.5.4 Ableitungsregeln

- Potenzfunktionen f(x) = ax^p: f'(x) = a · p · x^{p-1} p ≠ 0
- Exponentialfunktionen f(x) = a^x (a > 0): f'(x) = ln(a) · a^x
- Trigonometrische Funktionen (Bogenmass):

- sin'(x) = cos(x)
- cos'(x) = -sin(x)
- tan'(x) = $\frac{1}{\cos^2(x)}$ = 1 + tan²(x)

Hyperbolische Funktionen:

- sinh'(x) = cosh(x)
- cosh'(x) = sinh(x)

$$\sinh(x) = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}), \cosh(x) = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

Umkehrfunktionen:

- ln'(x) = $\frac{1}{x}$
- arcsin'(x) = $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

- arccos'(x) = $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
- arctan'(x) = $\frac{1}{1+x^2}$

Beweis: (e^x)'(x) = e^x. e^x = $\sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} x^k$ und "Potenzreihen dürfen termweise abgeleitet werden": (e^x)'(x) = $\frac{d}{dx} (\sum_{k=0}^\infty \frac{1}{k!} x^k) = \sum_{k=0}^\infty \frac{d}{dx} \frac{1}{k!} x^k = 0 + 1 + x + \frac{1}{2!} x^2 + \dots = \sum_{s=0}^\infty \frac{1}{s!} x^s$.

Summenregel: Seien f, g : D → ℝ zwei an der Stelle x0 n-fach differenzierbare Funktionen. Dann ist f + g an der Stelle x0 ebenfalls n-fach differenzierbar und es gilt

$$(f + g)^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) + g^{(n)}(x_0)$$

Beweis: Für n = 1: (f + g)'(x) = $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)+g(x+h)-f(x)-g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x+h)-g(x)}{h} = f'(x) + g'(x)$, dann Induktion über n.

Produktregel: Seien f, g : D → ℝ zwei an der Stelle x0 n-fach differenzierbare Funktionen. Dann ist f · g an der Stelle x0 ebenfalls n-fach differenzierbar und es gilt

$$(f \cdot g)^{(n)}(x_0) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x_0) g^{(n-k)}(x_0)$$

$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. Beweis: Für n = 1: (f · g)'(x) = $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x) \cdot g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) \cdot g(x+h) - f(x+h) \cdot g(x) + f(x+h) \cdot g(x) - f(x) \cdot g(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) \frac{g(x+h)-g(x)}{h} + \lim_{h \rightarrow 0} g(x) \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = f(x) \cdot g'(x) + g(x) \cdot f'(x)$, allgemeines n via Induktion.

Kettenregel: Es sei f : D → E differenzierbar an der Stelle x0 und es sei g : E → ℝ differenzierbar an der Stelle y0 = f(x0). Dann ist g ∘ f : D → ℝ an der Stelle x0 differenzierbar und es gilt

$$(g \circ f)'(x_0) = \underbrace{g'(f(x_0))}_{\text{"äussere Ableitung mal innere Ableitung"}} f'(x_0)$$

Beweis: $g(y) = \underbrace{g(y_0) + g'(y_0)(y - y_0)}_{\text{Tangente}} + g(y) - g(y_0) - g'(y_0)(y - y_0)$. Damit (g ∘ f)'(x0) = $\underbrace{\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{g(y) - g(y_0)}{y - y_0}}_{=: \epsilon(y) \text{ mit } \epsilon(y_0) := 0}$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(f(x)) - g(f(x_0))}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} (g(f(x_0)) + g'(f(x_0))[f(x) - f(x_0)] + \epsilon(f(x))[f(x) - f(x_0)] - g(f(x_0))) \frac{1}{x - x_0} = g'(y_0) \cdot f'(x_0) + 0$$

Quotientenregel: Seien f, g : D → ℝ differenzierbar an der Stelle x0. Falls g(x0) ≠ 0, ist auch $\frac{f}{g}$ differenzierbar an der Stelle x0 und es gilt:

$$(\frac{f}{g})'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - f(x_0)g'(x_0)}{g(x_0)^2}$$

Basiert auf Produktregel und Kettenregel mit $\frac{1}{x}$.

Ableitung der Umkehrfunktion: Sei f : D → E eine stetige, bijektive Funktion, deren Umkehrfunktion f⁻¹ : E → D ebenfalls stetig ist. Ausserdem sei s0 ∈ D ein Häufungspunkt von D \ {x0}, und sei f an der Stelle x0 differenzierbar mit f'(x0) ≠ 0. Dann ist f⁻¹ an der Stelle y0 = f(x0) differenzierbar, und es gilt

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}$$

Bemerkung: (f⁻¹ ∘ f)(x) = x ableiten auf beiden Seiten (mit Kettenregel) ergibt, dass (f⁻¹)'(f(x)) · f'(x) = 1.

Tricks zum Ableiten

Ableitungsregeln anwenden

- $x \stackrel{!}{=} e^{\ln x}$
- Differenzenquotient betrachten

4.5.5 Extremalstellen

Lokale Extremalstellen und erste Ableitung: Es sei f : D ⊂ ℝ → ℝ, f sei an der lokalen Extremalstelle (lokales Maximum oder Minimum) x0 ∈ D differenzierbar, und x0 sei sowohl ein Häufungspunkt von D ∩ (0, ∞) als auch von D ∩ (-∞, x0). Dann gilt f'(x0) = 0.

Aber nicht beide Richtungen sind äquivalent. " ⇒ " hält, aber f'(x0) = 0 kann bspw. auch konstant oder Sattelpunkte sein.

Lokale Extremalstellen auf einem Intervall: Es sei I ⊂ ℝ ein Intervall, f : I → ℝ, und es sei x0 eine lokale Extremalstelle von f. Dann ist mindestens eine der folgenden Tatsachen zutreffend:

1. x0 ∈ I ist ein Endpunkt des Intervalls I
2. f ist an der Stelle x0 nicht differenzierbar
3. f ist an der Stelle x0 differenzierbar und es gilt f'(x0) = 0

Aus der Tatsache, dass f'(x0) = 0 gilt, können wir nicht schliessen, dass an der Stelle x0 eine Extremalstelle vorliegt.

D.h. Bedingung f'(x0) = 0 liefert Kandidaten für Extremalstellen.

beschränktes und abgeschlossenes Intervall ⇒ f nimmt Maximum/Minimum an. für offenes Intervall würde es nicht gelten.

Satz von Rolle Falls a < b, f : [a, b] → ℝ stetig, auf (a, b) differenzierbar, f(a) = f(b), dann $\exists \xi \in (a, b)$ mit f'(ξ) = 0. (nicht zwingend eindeutig)

Beweis: Fall 1: $\exists \xi \in (a, b) : f(\xi) = \max_{a \leq b} f$ oder $\min_{a \leq b} f$. Dann f(ξ) = 0. Fall 2: $\nexists \xi \in (a, b) : \text{Dann } f(a) = f(b) = \max_{a \leq b} f = \min_{a \leq b} f \implies f \text{ konstant. Fall tritt nicht ein.}$

Mittelwertsatz Seien a < b, f : [a, b] → ℝ stetig, f differenzierbar auf (a, b). Dann $\exists \xi \in (a, b) : f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. (Es gibt einen Punkt im Intervall, wo die Ableitung die Steigung der Sekante ist.; nicht zwingend eindeutiger Punkt.)

Beweis: Wir definieren neue Funktion g : [a, b] → ℝ, g(x) := f(x) - $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x - a)$. Erfüllt Bedingungen von Rolle. g(a) = g(b). ⇒ $\exists \xi \in (a, b) : 0 = g'(\xi) = f'(\xi) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \cdot 1 \implies f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$.

Zeige, dass es in einem Intervall, indem f'(x) ≠ 0 (das Bedingungen für MWS erfüllt) nur eine Nullstelle gibt:
Angenommen, es gäbe zwei Nullstellen x1 und x2, dann wäre f'(ξ) = $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = \frac{0-0}{x_2-x_1} = 0$. Das widerspricht f'(x) ≠ 0.

Regel von Bernoulli - de L'Hospital Version 1: (a ∈ ℝ, $\frac{0}{0}$)
Seien a < b, f, g : (a, b) → ℝ differenzierbar, sodass:

1. g(x) ≠ 0, g'(x) ≠ 0 $\forall x \in (a, b)$
2. $\lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} g(x) = 0$ und analog für b. ($\frac{0}{0}$)
3. $L := \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ existiert.

Dann $\exists \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und = L.

Beweis verwendet den Mittelwertsatz.

Version 2: (a ∈ ℝ, $\frac{\infty}{\infty}$) Seien f, g : (a, b) → ℝ differenzierbar:

1. g(x) ≠ 0, g'(x) ≠ 0 $\forall x$
2. $\lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} |f(x)| = \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} |g(x)| = \infty$ (oder -∞)
3. $\exists L := \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Dann $\exists \lim_{x \rightarrow a, x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ und = L.

Version 3: (b := ∞, $\frac{0}{0}$, $\frac{\infty}{\infty}$) Seien R > 0, f, g : (R, ∞) → ℝ differenzierbar:

1. g(x) ≠ 0, g'(x) ≠ 0 $\forall x$
2. entweder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 0$ ($\frac{0}{0}$) oder $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = \infty$ ($\frac{\infty}{\infty}$)
3. $\exists L := \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

Dann $\exists \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ und = L.

Beweis: Folgt aus Version 1 + 2 für x ⇒ f($\frac{1}{x}$), x ⇒ g($\frac{1}{x}$).

Bernoulli - de L'Hospital anwenden

- Prüfen, ob tatsächlich richtige Form: $\frac{0}{0}$ / $\frac{\infty}{\infty}$
- Ansonsten ggf. umformen um diese Form zu erhalten.
- Nenner und Zähler individuell ableiten.

4.5.6 Monotonie, Konvexität

Seien I Intervall, f : I → ℝ differenzierbar. Dann gilt:

f ist wachsend ⇔ f' ≥ 0, d.h. f'(x) ≥ 0 $\forall x \in I$.

Beweis " ⇒ ": Sei x ∈ I. Fall x ∈ (a, b): Sei h ≠ 0 : x + h ∈ I. Falls h > 0 : f wachsend ⇒ $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. Falls h < 0 : $\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. ⇒ f'(x) = $\lim_{h \rightarrow 0, h \neq 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} \geq 0$. (Andere Richtung braucht Mittelwertsatz.)

Seien I Intervall, f : I → ℝ: f ist konstant ⇔ f differenzierbar und f'(x) = 0.

Beweis: " ⇒ " offensichtlich, " ⇐ ": Dann f' ≥ 0. ⇒ f wachsend. Dasselbe mit (-f)' = -f' ≥ 0 ⇒ f fallend. ⇒ f konstant.

f : I → ℝ konvex (linksgekrümmt) ⇔ $\forall a, b \in I$ mit a < b, t ∈ (0, 1) : f((1 - t)a + tb) ≤ (1 - t)f(a) + tf(b) (Graph ist unterhalb Verbindungsgerade; konstante Funktion ist auch konvex.)

Falls f differenzierbar, dann f auf I konvex ⇔ f' auf I wachsend.

Beweis " ⇐ ": Ann. f' wachsend. Seien a, b ∈ I, x ∈ (a, b). Mittelwertsatz ⇒ $\exists \xi \in (a, x) : f'(\xi) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$. $\exists \zeta \in (x, b) : f'(\zeta) = \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$. f' wachsend. ⇒ f'(ξ) ≤ f'(ζ). Gem. Hilfssatz ist f konvex: f : [a, b] → ℝ. f konvex ⇔ $\forall x \in (a, b) : \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(b)-f(x)}{b-x}$

Falls f 2mal differenzierbar, dann f auf I konvex ⇔ f'' ≥ 0

Beweis " ⇒ ": Resultat von oben und: F' ≥ 0 ⇔ F wachsend (F := f')

f : I → ℝ konkav (rechtsgekrümmt) wenn -f konvex ist.

Folgerung aus Konvexität (Jensen):

$$\sqrt[n]{\sum_{i=1}^n x_i} \leq \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i}_{\text{arithmetisches Mittel}}, x_i \geq 0$$

geometrisches Mittel arithmetisches Mittel

Folgerung aus Konvexität (Legendre-Transformation): Youngsche Ungleichung:

$$\forall p \in (1, \infty), x, y \in (0, \infty); xy \leq \frac{|x|^p}{p} + \frac{|y|^{p'}}{p'}, \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} = 1$$

Eine konvexe Funktion hat höchstens eine Minimalstelle. (Relevant für konvexe Optimierung.)

4.5.7 Lokale Approximation durch Polynome

In einer genügend kleinen Umgebung eines betrachteten Punktes x0 verhalten sich der Graph einer gegebenen Funktion f und die Tangente an f im Punkt x0 fast gleich.

⇒ Wir können die Funktion mit Hilfe der Tangente lokal approximieren.

Falls f an der Stelle x0 differenzierbar ist, so gilt lineare Approximation / Tangentenapproximation / 1. Taylor Approximation

$$f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) = P_1(x)$$

f(x0) + f'(x0)(x - x0) wird auch Linearisierung oder

1. Taylorpolynom von f an der Stelle x0 genannt.

Bsp.: Für f1(x) = x², f2(x) = x³, f3(x) = x³ = -x² ist Tangente im Ursprung horizontal.

Verbesserungsidee: Polynom 2. Grades verwenden: P2(x) = A(x - x0)² + B(x - x0) + C. Es soll gelten:

- P2(x0) = f(x0) ⇒ C = f(x0)
- P2'(x0) = f'(x0) ⇒ B = f'(x0)
- P2''(x0) = f''(x0) ⇒ 2A = f''(x0) ⇒ A = $\frac{1}{2} f''(x_0)$

⇒ f(x) ≈ f(x0) + f'(x0)(x - x0) + $\frac{1}{2} f''(x_0)(x - x_0)^2$

Satz von Taylor Bessere Approximation, beliebiges x0

Wir nehmen an, dass f auf dem offenen Intervall I (mit x0 ∈ I) Ableitung beliebig hoher Ordnung besitzt. Dann gilt für jedes beliebige Argument x ∈ I

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(x_0)(x - x_0)^n + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)(x - x_0)^{n+1}$$

$$= \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0) \frac{1}{k!} (x - x_0)^k + \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)(x - x_0)^{n+1}$$

$$= P_n(x) + R_n(x)$$

für ein c zwischen x0 und x. Pn heisst n-tes Taylorpolynom.

Bemerkungen:

- Der Grad von Pn(x) ist ≤ n. Kann einen Grad < n haben (falls f(n) = 0).
- Für Polynom f(x) = P(x) vom Grad m gibt das m-te Taylorpolynom die Funktion exakt wieder.
- Es gibt noch andere Beschreibungen des Restterms Rn(x).

Der maximale Fehlerterm kann abgeschätzt werden (Maximum des Restterms im Intervall zwischen x und x0 bestimmen)

Für gegebene Funktion f heisst die Reihe

$$f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{1}{2} f''(a)(x - a)^2 + \dots = \sum_{k=0}^\infty f^{(k)}(a) \frac{1}{k!} (x - a)^k$$

Taylorreihe / Taylorentwicklung der Funktion f (um den Punkt a).

Kann nur konvergieren, wenn im Konvergenzradius.

Substitution, Version 1 Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ zwei Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig differenzierbar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Dann gilt für alle $[a, b] \subset I$

$$\int_a^b g(f(x))f'(x) \, dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y) \, dy$$

Substitution, Version 2 Seien $I, J \subset \mathbb{R}$ Intervalle, $f : I \rightarrow J$ stetig differenzierbar und $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ stetig. Für $[a, b] \subset I$ gelte $f'(x) \neq 0$ für alle $x \in [a, b]$ und sei $f^{-1} : [f(a), f(b)] \rightarrow \mathbb{R}$ Inverse von $f|_{[a,b]}$. Dann

$$\int_a^b g(f(x)) \, dx = \int_{f(a)}^{f(b)} g(y)(f^{-1})'(y) \, dy$$

4.9 Funktionenfolgen

Punktweise Konvergenz

Punktweiser Grenzwert

Gleichmässige Konvergenz

Mittelwertsatz der Integralrechnung

5 Weiteres

5.1 Logarithmusregeln

- $\log(x \cdot y) = \log(x) + \log(y)$
- $\log(\frac{x}{y}) = \log(x) - \log(y)$
- $\log(x^r) = r \cdot \log(x)$

$\arctan'(x) = \frac{1}{1+x^2}$

$\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n = e^x$