



Methoden und Anwendungen der Optimierung

WS 2017/18

Prof. Dr. Michael Schneider

schroeder@dpo.rwth-aachen.de

Übung 4 - Aufgaben

Aufgabe 1 (CVRP Nachbarschaften):

Das Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) stellt eine Verallgemeinerung des TSP dar und kann folgender Maßen formuliert werden: Gegeben sei ein gerichteter Graph $\mathcal{G}(V, A)$ mit Distanzmatrix c_{ij} .

- Eine beliebige Anzahl Fahrzeuge $k \in K$ steht an einem Depot $0 \in V$ zur Verfügung.
- Es müssen alle Kunden $i \in V \setminus 0$ beliefert werden, wobei jeder Kunde die Menge $d_i > 0$ eines einzigen Gutes nachfragt.
- Jedes Fahrzeug hat eine gegebene Kapazität von Q Einheiten des Gutes, welche für alle Fahrzeuge gleich ist. Es gelte $Q \geq d_i, \ \forall i \in V \setminus 0$.
- Jeder Kunde muss von genau einem Fahrzeug beliefert werden.
- Die Fahrzeuge müssen am Depot starten und am Ende ihrer Tour wieder zum Depot zurückkehren.

Des Weiteren sei $r_i \in K$ das Fahrzeug, welches Kunde i beliefert. Im Folgenden werden die in Abb. 1 dargestellten Nachbarschaftsoperatoren betrachtet. Jede potenzielle Lösung in der Nachbarschaft kann in dieser Darstellung durch zwei Knoten $v, w \in V$ identifiziert werden. v_- und v_+ bezeichnen in der gegebenen Darstellung den Vorgängerbzw. Nachfolgerknoten des Knotens v. Gestrichelte Kanten werden entfernt, durchgezogene Kanten eingefügt. Knoten mit einem inneren Kreis können sowohl ein Kunde als auch das Depot sein, während die anderen Knoten nur Kunden darstellen können. Die gepunkteten Kanten deuten die Orientierung der restlichen Tour an. Es gelten folgende Bedingungen:

• 2-Opt*: $v_+ \neq w$

• Relocate: $v \neq w_-$

• Exchange: $v \neq w_-, v \neq w_=$

a) Wie können Sie die Zulässigkeit einer Lösung in der durch die Relocate- und Exchange-Operatoren definierten Nachbarschaft sowie deren Zielfunktionswert in $\mathcal{O}(1)$ berechnen?

Hinweis: Denken Sie über Werte nach, welche sich *vor* der Durchsuchung der Nachbarschaft berechnen lassen.

- b) Welches Problem ergibt sich in der 2-Opt*-Nachbarschaft?
- c) Wie müssen Sie die Nachbarschaft des 2-Opt*-Operators einschränken, um dieses Problem zu umgehen?

Hinweis: Finden Sie eine Bedingung an die Knoten v und w.

d) Wie können Sie die Zulässigkeit in der aus c) resultierenden Nachbarschaft ebenfalls in $\mathcal{O}(1)$ berechnen?




Abbildung 1: Nachbarschaftsoperatoren für das CVRP.