

Formularium

Academiejaar 2024 - 2025

Timo Vandevenne

Dit document is nog niet klaar, als we nieuwe formules zien zal ik deze toevoegen.

Formule	Variabelen en uitleg
Verdunningsregel: $M_i V_i = M_f V_f$	M Molariteit [mol/l]
	m Molaliteit [mol/kg]
PV = nRT	P Druk
	V Volume
	R Gasconstante
	T Temperatuur [K]
$\Delta \mathbf{U} = q + \mathbf{w}$	ΔU Verandering van interne energie
	q warmteuitwisseling met omgeving
	(q>0: warmte van omgeving in systeem)
	w Arbeid verricht op/door het systeem
	(w>0: arbeid op systeem)
$w = -P\Delta V$	ΔV Volumeverandering
Wet van Hess:	ΔH^0_{rxn} Reactieenthalpie
$\Delta H_{rxn}^0 = \sum i\Delta H_f^0(prod.) - \sum j\Delta H_f^0(reag.)$	$(\Delta H_{rxn}^0 > 0: \text{ endotherme reactie})$
J • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	$\mathbf{H_f^0}$ Standaardvormingsenthalpie
	\mathbf{i}, \mathbf{j} coefficiënten in reactievergelijking
$q = ms\Delta T$	m massa [g]
	s Specifieke warmte $\left[\frac{J}{a^{\circ}C}\right]$
$q = C\Delta T$	ΔT Temperatuurverandering
•	C Warmtecapaciteit
$q_{sys} = 0 \Leftrightarrow q_{rxn} + q_{cal} + q_{opl} = 0$ $q_{rxn} = n\Delta H_{rxn}^{0}$	
$\frac{q_{rxn} = n\Delta H_{rxn}^0}{E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}}$	E Energie [J]
A	h constante van Planck = $6.62 \cdot 10^{-34}$ Js
	$ \mathbf{v} $ frequentie [Hz]
	c Lichtsnelheid = $3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$
	λ Golflengte [m]
$E_{kin,e^-} = h\mathbf{v} - W$	W Werkfunctie: maat voor hoe sterk e^- in metaal worden
,	vastgehouden
De Broglie: $\lambda = \frac{h}{n} = \frac{h}{mu}$	\mathbf{p} Impuls $\left[\frac{kg \cdot m}{s}\right]$
p ma	m Massa bewegend deeltje [kg]
	u Snelheid
Wet van Dalton: $P_i = y_i P_{tot}$	P _i Partieeldruk
,	y _i Molfractie gas [%]
Wet van Raoult: $P_i = x_i P_i^0$	x _i Molfractie vloeistof [%]
·	P _i Dampdruk
Wet van Henry: $P_i = x_i H_i = \frac{C_i}{k}$	$\mathbf{C_i}$ Concentratie
	H _i Henry constante
	\mathbf{k} gegeven constante bij bep. temp



$\Delta T_b = iK_b m$	ΔT_b Kookpuntsverhoging
$\Delta T_f = iK_f m$	ΔT_f Vriespuntsverlaging
	i Van 't Hoff factor: aantal opgeloste deeltjes waarin een
	verbinding voorkomt in oplossing
	$\mathbf{K_b}, \mathbf{K_f}$ karakteristiek van het oplosmiddel
	m Molaliteit [mol/kg]
$\pi = iMRT$	π Osmotische druk
$\frac{\Delta P = x_{\text{opgeloste stof}} P_{\text{oplosmiddel}}^0}{v = k[A]^x[B]^y}$	ΔP Dampdrukverlaging
$v = k[A]^x[B]^y$	$aA+bB \rightleftharpoons cC+dD$
	v Reactiesnelheid [M/s]
	k Snelheidsconstante [Eenheid afh. van reactieorde]
Arrhenius vergelijking:	$\mathbf{x}=\mathbf{a}, \mathbf{y}=\mathbf{b}$ indien elementaire stap
$k = Ae^{\frac{-E a}{RT}}$	E _a Activeringsenergie [kJ/mol]
$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [R]^b}$	K Evenwichtsconstante (K>1: Evenwicht naar rechts)
	[X] Concentratie van stof $X [M] = [mol/l]$
	Q Reactieconstante, K met actuele concentraties
	(Q>K: systeem naar links voor evenwicht)
Principe van Le Châtelier	System compenseert uitwendige stress gedeeltelijk
Timelpe van Le chavener	Concentratieverandering
	• Druk & volumeverandering
	• Temperatuursverandering \rightarrow K verandert
	Katalysator & inert gas hebben geen invloed
$pH = -\log[H^+] = -\log[H_3O^+]$	Tradalysator & mere gas hessen geen inviced
$pOH = -\log[OH^-] = 14 - pH$	
$K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$	$\mathbf{K_a}$ Aciditeitsconstante $(\mathbf{p}\mathbf{K_a} = -\log K_a)$
$\begin{bmatrix} \Pi A \end{bmatrix}$	
$K_b = \frac{[OH^-][B^+]}{[B]}$	$\mathbf{K_a}$ Aciditeitsconstante $(\mathbf{p}\mathbf{K_b} = -\log K_b)$
$K_a K_b = K_w$	$\mathbf{K_w}$ Dissociatie constante van water
$pK_a + pK_b = pK_w$	$K_w = [H^+][OH^-] = 10^{-14} \text{ bij } 25^{\circ}\text{C}$
$K_{sp} = [C]^d [D]^d$	$\mathbf{K_{sp}}$ Oplosbaarheidsproduct: beschrijf het oplossen van
sp [•] [-]	een ionische verbinding in water
$Q = [C]_0^c [D]_0^d$	\mathbf{Q} Reactiequotiënt, \mathbf{K}_{sp} met actuele concentraties
-6 [-10[- 10	$[X]_0$ Concentratie voor reactie
	• $Q < K_{sp}$: Onverzadigde oplossing \rightarrow Geen neerslag
	• $Q < K_{sp}$: Verzadigde oplossing \rightarrow Net geen neerslag
	• $Q < K_{sp}$: Oververzadigde oplossing \rightarrow Neerslag onstaat
RT	γ · σρ · σ · σ · σ · σ · σ · σ · σ · σ ·
Nernst: $E = E^0 - \frac{RT}{nF} \log Q$	
101	ı