

Formularium

Academiejaar 2024 – 2025

Timo Vandevenne

Dit document is nog niet klaar, als we nieuwe formules zien zal ik deze toevoegen.

Formula	Variables and Explanation
Verdunningsregel: $M_i V_i = M_f V_f$	M Molariteit [mol/l] m Molaliteit [mol/kg]
Wet van Dalton: $P_i = y_i P_{tot}$	P_i Partieeldruk y_i Molfractie gas [%]
$PV = nRT$	P Druk V Volume R Gasconstante T Temperatuur [K]
$\Delta U = q + w$	ΔU Verandering van interne energie q warmteuitwisseling met omgeving (q>0: warmte van omgeving in systeem) w Arbeid verricht op/door het systeem (w>0: arbeid op systeem)
$w = -P\Delta V$	ΔV Volumeverandering
Wet van Hess:	ΔH_{rxn}⁰ Reactieenthalpie (ΔH _{rxn} ⁰ >0: endotherme reactie)
$\Delta H_{rxn}^0 = \sum i \Delta H_f^0(prod.) - \sum j \Delta H_f^0(reag.)$	H_f⁰ Standaardvormingsenthalpie i, j coëfficiënten in reactievergelijking
$q = ms\Delta T$	m massa [g] s Specifieke warmte [$\frac{J}{g^\circ C}$]
$q = C\Delta T$	ΔT Temperatuurverandering C Warmtecapaciteit
$q_{sys} = 0 \Leftrightarrow q_{rxn} + q_{cal} + q_{opl} = 0$	
$q_{rxn} = n\Delta H_{rxn}^0$	
$E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$	E Energie [J] h constante van Planck = $6.62 \cdot 10^{-34} Js$ ν frequentie [Hz] c Lichtsnelheid = $3 \cdot 10^8 \frac{m}{s}$ λ Golflengte [m]
$E_{kin,e^-} = h\nu - W$	W Werkfunctie: maat voor hoe sterk e ⁻ in metaal worden vastgehouden
De Broglie: $\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mu}$	p Impuls [$\frac{kg \cdot m}{s}$] m Massa bewegend deeltje [kg] u Snelheid
$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$	aA+bB ⇌ cC+dD K Evenwichtsconstante (K>1: Evenwicht naar rechts) [X] Concentratie van stof X