

1. Найти ФСР следующих однородных СЛУ.

1.1

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ -x_1 + 2x_2 + 2x_3 - 7x_4 = 0 \end{cases}$$

Перепишем матрицу в виде расширенной и элементарными преобразованиями приведем ее к улучшенному ступенчатому виду.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 & 0 \\ -1 & 2 & 2 & -7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{+1(1)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{+1(2)} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & -2 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 0 \end{array} \right)$$

Получаем выражение главных переменных через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = 2x_2 + 3x_4 \\ x_3 = 5x_4 \\ x_2, x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

ФСР данной матрицы будет выглядеть так:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.2

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 3x_4 + x_6 = 0 \\ 3x_4 + 2x_5 + 17x_6 = 0 \\ 2x_1 - 4x_2 + 8x_3 + 2x_5 - 5x_6 = 0 \\ 3x_4 - 2x_5 - x_6 = 0 \end{cases}$$

Перепишем матрицу в виде расширенной и элементарными преобразованиями приведем ее к

улучшенному ступенчатому виду.

$$\begin{aligned}
 & \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 17 & 0 \\ 2 & -4 & 8 & 0 & 2 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -2 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{-2(1)} \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -6 & 2 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -2 & -1 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} +2(2) \\ -1(2) \end{array}} \\
 & \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -4 & -18 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{+\frac{2}{3}} \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 27 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{:3} \\
 & \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 2 & 17 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 9 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{-1(3)} \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 9 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{\begin{array}{l} :3 \\ :2 \end{array}} \\
 & \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2 & 4 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{8}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{9}{2} & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{-3(2)} \left(\begin{array}{cccccc|c} 1 & -2 & 4 & 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{8}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{9}{2} & 0 \end{array} \right)
 \end{aligned}$$

Получаем выражение главных переменных через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = 2x_2 - 4x_3 + 7x_6 \\ x_4 = -\frac{8}{3}x_6 \\ x_5 = -\frac{9}{2}x_6 \\ x_2, x_3, x_6 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

ФСР данной матрицы будет выглядеть так:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, u_3 = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \\ 0 \\ -\frac{8}{3} \\ -\frac{9}{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.3

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \end{cases}$$

Тут сразу можно выразить x_1 через x_2 и x_3 :

$$\begin{cases} x_1 = -2x_2 - 3x_3 \end{cases}$$

ФСР данной матрицы выглядит так:

$$u_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.4

$$\begin{cases} x_2 + 5x_3 + 5x_4 = 0 \\ 5x_3 + 2x_4 = 0 \end{cases}$$

Перепишем матрицу в виде расширенной и элементарными преобразованиями приведем ее к улучшенному ступенчатому виду.

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 5 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{-1(2)} \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{:5} \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{2}{5} & 0 \end{array} \right)$$

Теперь выразим главные переменные через свободные:

$$\begin{cases} x_2 = -3x_4 \\ x_3 = -\frac{2}{5}x_4 \\ x_1, x_4 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

ФСР данной матрицы будет выглядеть так:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -3 \\ \frac{2}{5} \\ 1 \end{pmatrix}$$

1.5

$$\begin{cases} x_1 + 3x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

Перепишем матрицу в виде расширенной и элементарными преобразованиями приведем ее к улучшенному ступенчатому виду.

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[-1(1)]{-2(1)} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -5 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[-1(3)]{-1(3)} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[-4(2)]{-3(2)} \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Теперь выразим главные переменные через свободные:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases}$$

ФСР данной ОСЛУ пустое множество.

2. Найдите базис и размерность подпространства $\{f \in \mathbb{R}_{[x] \leq 3} | f(1) = f'(1) = 0\}$ в пространстве $\mathbb{R}_{[x] < 3}$ многочленов степени не выше 3.

Решение: Пусть наше пространство многочленов задается множеством коэффициентов a_0, a_1, a_2, a_3 , где каждый многочлен выглядит следующим образом: $a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$. При этом должно выполняться условие равенства производной и функции в точке 1:

$$\begin{cases} f(1) = a_3 + a_2 + a_1 + a_0 = 0 \\ f'(1) = 3a_3 + 2a_2 + a_1 = 0 \end{cases}$$

Решим эту ОСЛУ и выпишем ее ФСР:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[-3(1)]{-3(1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[-1(2)]{+1(2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & -3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\times(-1)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

Теперь выразим главные переменные через свободные:

$$\begin{cases} a_0 = a_2 + 2a_3 \\ a_1 = -2a_2 - 3a_3 \\ a_2, a_3 \in \mathbb{R} \end{cases}$$

ФСР данной ОСЛУ выглядит так:

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Каждый многочлен степени не выше 4х задается вектором из \mathbb{R}^4 , причем каждому вектору из \mathbb{R}^4 соответствует единственный многочлен. ФСР решенной выше СЛУ будет базисом подпространства из \mathbb{R}^4 , удовлетворяющего условиям задачи. Следовательно эта система будет необходимым базисом.

В виде многочленов это выглядит так:

$$\begin{cases} f_1(x) = x^3 - 2x^2 + x \\ f_2(x) = 2x^3 - 3x^2 + 1 \end{cases}$$

Ответ: базисом такого подпространства будет множество $\{f_1(x), f_2(x)\}$

3. Найдите какой-нибудь базис в пространстве $U = \langle v_1, v_2, v_3, v_4 \rangle \subseteq \mathbb{R}^5$, где $v_1 = (1, 0, 0, -1, 0)^T$, $v_2 = (2, 1, 1, 0, 1)^T$, $v_3 = (1, 1, 1, 1, 1)^T$, $v_4 = (0, 1, 1, 3, 4)^T$.

Решение: чтобы найти базис, нам необходимо выбрать систему линейно независимых векторов u_1, u_2, u_3, u_4 . Для этого запишем векторы в матрицу в виде строк и элементарными преобразованиями строк приведем матрицу к улучшенному ступенчатому виду.

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-2(1) \\ -1(1)}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{-1(2) \\ -1(2)}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Мы привели матрицу к ступенчатому виду, при этом обнулилась 3я строка, следовательно вектор u_3 лежит в линейной оболочке векторов u_1, u_2, u_4 , а эти вектора линейно независимы.

Ответ: базисом будут вектора u_1, u_2, u_4 .

4. Пусть $U = \langle v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 \rangle \subseteq \mathbb{R}^3$, где $v_1 = (1, 0, -1)^T$, $v_2 = (1, 1, 1)^T$, $v_3 = (0, -1, -2)^T$, $v_4 = (3, 3, 3)^T$, $v_5 = (5, 2, -1)^T$. Выберите из системы векторов v_1, v_2, v_3, v_4, v_5 базис U и найдите линейные выражения остальных векторов системы через этот базис.

Решение: запишем эти векторы вместо строк в матрицу и проведем с ними серию элементарных преобразований строк, приведя матрицу к УСВ. После этого линейная оболочка этих векторов не поменяется, а мы найдем векторы, выражающиеся через остальные.

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \\ v_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 3 & 3 & 3 \\ 5 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-3(2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & 2 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} -1(1) \\ -5(1) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} +1(2) \\ -2(2) \end{matrix}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Мы получили, что векторы v_3, v_4, v_5 выражаются через линейную комбинацию векторов v_1, v_2 . Теперь уже без всяких уравнений легко увидеть, как они выражаются:

Ответ:

$$\begin{cases} v_3 = v_1 - v_2 \\ v_4 = 3v_2 \\ v_5 = 3v_1 + 2v_2 \end{cases}$$

5. Пусть $v_1 = (-2, 1, -3, 2, 3)^T$, $v_2 = (-2, 3, -5, 7, 4)^T$, $v_3 = (2, 1, 1, 3, -2)^T$, $v_4 = (9, -2, 4, -3, -8)^T$ — векторы в \mathbb{R}^5 . Выберите линейно независимую систему из векторов v_1, v_2, v_3, v_4 и дополните её до базиса \mathbb{R}^5 .

Решение: запишем векторы в качестве строк в матрицу и приведем ее к ступенчатому виду:

$$\begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ v_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & -5 & 7 & 4 \\ 2 & 1 & 1 & 3 & -2 \\ 9 & -2 & 4 & -3 & -8 \end{pmatrix} \xrightarrow[-\frac{9}{2}]{\substack{-1(1) \\ +1(1)}} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & \frac{5}{2} & -\frac{19}{2} & 6 & \frac{11}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{\times 2} \\ \begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 5 & -19 & 12 & 11 \end{pmatrix} \xrightarrow[-\frac{5}{2}]{-1(2)} \begin{pmatrix} -2 & 1 & -3 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & -2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -14 & -\frac{1}{2} & \frac{17}{2} \end{pmatrix} \rightarrow$$

Мы выяснили, что векторы v_1, v_2, v_4 линейно независимы, чтобы дополнить их до базиса, необходимо добавить к ним векторы из стандартного базиса, которые дополняют свободные столбцы, эти векторы будут e_4, e_5 .

Ответ: базис будет иметь вид v_1, v_2, v_4, e_4, e_5 .