

Peste — Lo que necesita saber

Una infección bacteriana de roedores infectados y sus pulgas — tratable cuando se detecta temprano

La peste es una infección bacteriana (*Yersinia pestis*) que vive en roedores silvestres — en Arizona, especialmente perros de las praderas, ardillas terrestres, y tamias en el norte del estado (condados de Coconino, Apache, y Navajo). Puede transmitirse a humanos y mascotas a través de pulgas infectadas, al manejar animales enfermos o muertos, o raramente a través de gotitas respiratorias de gatos enfermos. **La peste es completamente tratable con antibióticos si se detecta temprano — pero es rápidamente mortal si no se trata.**

Síntomas

- Fiebre alta repentina y escalofríos
- Dolor de cabeza severo
- Ganglios linfáticos hinchados y dolorosos (llamados 'bubones') en la ingle, axila, o cuello
- Debilidad extrema
- Tos con esputo con sangre (en peste neumónica — rara pero peligrosa)

Qué debe hacer

1. Vaya a un médico o sala de emergencia inmediatamente. El tiempo es crítico.
2. Tome los antibióticos exactamente como se los recetaron — generalmente estreptomicina, gentamicina, o doxiciclina por al menos 10 días.
3. Si tiene peste neumónica (tos con esputo con sangre), siga las precauciones de aislamiento hasta que haya tomado antibióticos por al menos 48 horas.
4. Trate a todas las mascotas del hogar contra pulgas. Los gatos son particularmente susceptibles a la peste y pueden contagiársela a los humanos.
5. Evite el contacto con roedores silvestres o sus madrigueras. No deje que sus mascotas cacen perros de las praderas o ardillas.

Si su gato fue diagnosticado primero

Los gatos con peste pueden transmitir la infección a humanos a través de gotitas respiratorias, particularmente a veterinarios y miembros de la familia que cuidan al gato enfermo. **Si su gato fue diagnosticado con peste, contacte a su médico inmediatamente — incluso antes de tener síntomas.** Su médico puede darle antibióticos preventivos. Los veterinarios y contactos del hogar de gatos con peste han sido fuentes documentadas de casos humanos.

Recuperación

Con tratamiento antibiótico oportuno, la mayoría de las personas se recuperan completamente. La peste no tratada tiene una tasa de mortalidad de 30–60%. Mientras más temprano comiencen los antibióticos, mejor el resultado.

Llame al 911 inmediatamente si tiene:

- Fiebre alta repentina después de exposición a roedores silvestres o mascotas enfermas
- Bulto hinchado y doloroso en la ingle, axila, o cuello con fiebre
- Tos con sangre
- Una mascota (especialmente un gato) que murió inesperadamente con fiebre

Más información

- Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Departamento de Salud de Arizona: 602-364-4562
- Página de Peste del CDC: [cdc.gov/plague](https://www.cdc.gov/plague)
- Departamento de Salud del Condado Coconino: 928-679-7272

ONE-HealthRecord MVP · Synthetic demonstration · Content drawn from public CDC and Arizona Department of Health Services plain-language disease pages. This handout is informational and does not replace medical advice from your clinician.