

Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas

Una infección grave transmitida por garrapatas que requiere tratamiento temprano

La Fiebre Manchada de las Montañas Rocosas (RMSF) es una infección grave transmitida por garrapatas. En Arizona, la garrapata que la transmite es la garrapata marrón del perro, que puede vivir dentro y alrededor de casas donde se tienen perros al aire libre. La RMSF puede volverse mortal dentro de una semana después de que comienzan los síntomas, por lo que **el tratamiento temprano es crítico**.

Síntomas

- Fiebre alta (frecuentemente más de 102°F / 39°C)
- Dolor de cabeza severo
- Dolor muscular
- Vómitos y dolor de estómago
- Sarpullido que a menudo comienza en muñecas, tobillos, palmas, y plantas, y se extiende
- Confusión en casos graves

Qué debe hacer

1. Tome **doxiciclina** exactamente como se la recetaron. Incluso los niños deben ser tratados con doxiciclina para la RMSF — es el único antibiótico confiablemente eficaz y los beneficios superan ampliamente el riesgo de manchas en los dientes a las dosis utilizadas.
2. No espere los resultados de los análisis de sangre para comenzar el tratamiento. Su médico comenzará el tratamiento basado en los síntomas porque la RMSF puede ser mortal si se trata tarde.
3. Observe a todos los miembros del hogar cuidadosamente para detectar fiebre o sarpullido durante los próximos 14 días.
4. Trate a todos los perros del hogar con un preventivo de garrapatas recomendado por su veterinario. Los perros son la fuente de las garrapatas que pican a las personas.
5. Inspeccione su hogar y patio en busca de garrapatas; elimine cualquier hábitat que las atraiga (montones de escombros, casas para perros con grietas).

Si su perro fue diagnosticado primero

La RMSF **no se contagia entre personas, ni directamente entre mascotas y personas**. Pero las mismas garrapatas que picaron a su perro pueden picar a los humanos del hogar. Si su perro fue diagnosticado con RMSF (o cualquier enfermedad transmitida por garrapatas), cada humano en el hogar debe ser examinado para detectar garrapatas adheridas, y cada animal en el hogar debe ser tratado con un preventivo recomendado por el veterinario. El hogar debe tratarse como una unidad.

Recuperación

Si el tratamiento comienza dentro de los 5 días de iniciarse los síntomas, la mayoría de las personas se recuperan completamente. Sin tratamiento, la RMSF tiene una tasa de mortalidad de aproximadamente 30%. Por esto su médico lo tratará inmediatamente basado en los síntomas, antes de la confirmación de laboratorio.

Llame a su médico o vaya a la sala de emergencia si tiene:

- Fiebre después de una picadura conocida de garrapata — en cualquier momento dentro de los últimos 30 días
- Confusión, dolor de cabeza severo, o cuello rígido
- Sarpullido que se extiende, especialmente con fiebre
- Vómitos severos que no le permiten retener el medicamento

Más información

- Departamento de Salud de Arizona: 602-364-4562
- Página de RMSF del CDC: cdc.gov/rmsf
- Prevención de enfermedades transmitidas por garrapatas: cdc.gov/ticks

ONE-HealthRecord MVP · Synthetic demonstration · Content drawn from public CDC and Arizona Department of Health Services plain-language disease pages. This handout is informational and does not replace medical advice from your clinician.