

Fiebre del Valle — Lo que necesita saber

Coccidioidomycosis · Una infección pulmonar común del desierto de Arizona

La Fiebre del Valle es una infección causada por un hongo llamado *Coccidioides*. El hongo vive en el suelo seco del desierto, especialmente en el sur de Arizona. Las personas y los animales contraen la Fiebre del Valle al respirar polvo que contiene las esporas del hongo — generalmente después de una tormenta de viento, una tormenta de polvo, o cualquier actividad que mueva la tierra (excavar, construir, trabajar en el jardín, manejar fuera del camino).

Síntomas

- Tos que dura más de dos semanas
- Fiebre, generalmente baja
- Cansancio que no desaparece
- Dolor de pecho o falta de aire
- Dolor de cabeza
- Sarpullido en el torso o las piernas (a veces)
- Dolor en las articulaciones, especialmente rodillas y tobillos

Qué debe hacer

1. Tome todos los medicamentos exactamente como se los recetaron. La mayoría de las personas son tratadas con una pastilla antifúngica llamada **fluconazol** por al menos 3 a 6 meses.
2. Descanse. La Fiebre del Valle es una infección de progresión lenta. Incluso los casos leves toman semanas en recuperarse.
3. Avise a su médico inmediatamente si los síntomas empeoran — especialmente si tiene nuevos dolores de cabeza, rigidez en el cuello, pérdida de peso, o debilidad en un lado del cuerpo. Estas pueden ser señales de que la infección se ha extendido.
4. No deje de tomar su medicamento antes de tiempo, aunque se sienta mejor. La infección puede regresar.
5. Tome mucha agua y evite el alcohol mientras esté tomando el medicamento antifúngico.

Si su perro o mascota fue diagnosticado primero

La Fiebre del Valle **no se contagia entre personas, ni entre mascotas y personas**. Pero todos en el hogar probablemente fueron expuestos al mismo polvo. Si su perro fue diagnosticado primero, no significa que el perro se la pasó a usted — significa que la tierra alrededor de su casa tenía el hongo, y todos lo respiraron. Avise a su médico sobre la exposición en el hogar; esto ayuda a hacer el diagnóstico más rápidamente.

Recuperación

La mayoría de los adultos sanos se recuperan completamente de la Fiebre del Valle, pero puede tomar de 6 meses a un año. Aproximadamente 1 de cada 200 personas desarrolla una forma más grave que requiere tratamiento de por vida. Las personas con sistema inmunológico debilitado, las mujeres embarazadas, y las personas de ascendencia africana o filipina tienen mayor riesgo de enfermedad grave.

Llame al 911 o vaya a la sala de emergencia si tiene:

- Dificultad severa para respirar
- Dolor de pecho que no se quita
- Confusión, dolor de cabeza severo, o cuello rígido
- Debilidad en un lado del cuerpo o dificultad para hablar

Más información

- Programa de Fiebre del Valle del Departamento de Salud de Arizona: 602-364-3676
- Página de Fiebre del Valle del CDC: cdc.gov/fungal/diseases/coccidioidomycosis
- Centro de Excelencia para la Fiebre del Valle (Universidad de Arizona): vfce.arizona.edu

ONE-HealthRecord MVP · Synthetic demonstration · Content drawn from public CDC and Arizona Department of Health Services plain-language disease pages. This handout is informational and does not replace medical advice from your clinician.