

Virus del Nilo Occidental

Un virus transmitido por mosquitos, más activo en Arizona durante el verano tardío y otoño

El virus del Nilo Occidental es transmitido por mosquitos que se han alimentado de aves infectadas. La mayoría de las personas que se infectan (aproximadamente 80%) no tienen síntomas. Aproximadamente 1 de cada 5 desarrolla una enfermedad similar a la gripe llamada fiebre del Nilo Occidental. Aproximadamente 1 de cada 150 desarrolla una enfermedad grave que afecta el cerebro o la médula espinal.

Síntomas

- Fiebre y escalofríos
- Dolor de cabeza y dolores corporales
- Cansancio y debilidad
- Dolor en las articulaciones
- Náuseas o vómitos
- Sarpullido fino y rojo en pecho, estómago, y espalda (a veces)
- Grave: cuello rígido, confusión, temblores, debilidad de un lado, convulsiones

Qué debe hacer

1. Descanse y tome muchos líquidos. No hay medicamento antiviral específico para el virus del Nilo Occidental; el tratamiento es de apoyo.
2. Tome medicamentos de venta libre para dolor y fiebre según sea necesario.
3. Esté atento a síntomas graves — cuello rígido, confusión, debilidad en un lado del cuerpo. Vaya a emergencias inmediatamente si estos aparecen.
4. Drene el agua estancada alrededor de su hogar donde se reproducen los mosquitos (platos de macetas, canaletas, cubiertas de piscinas, cubetas).
5. Use repelente de insectos registrado por la EPA con DEET, picaridina, o aceite de eucalipto limón durante el amanecer y atardecer.

Si un caballo en su propiedad fue diagnosticado primero

El virus del Nilo Occidental **no se contagia directamente de caballos a humanos** — ambas especies contraen el virus por picaduras de mosquitos. Pero un caso equino confirmado significa que mosquitos infectados están activos en su área, y los humanos en la propiedad están en riesgo. Tome la protección contra mosquitos en serio: drene el agua estancada, use repelente, evite estar al aire libre al amanecer y atardecer.

Recuperación

La mayoría de las personas con fiebre del Nilo Occidental se recuperan completamente en unas pocas semanas, aunque el cansancio y la debilidad pueden durar meses. Las personas que desarrollan la forma neuroinvasiva pueden tener debilidad prolongada, problemas de memoria, o convulsiones. Las personas mayores de 60 años y aquellas con sistema inmunológico debilitado tienen mayor riesgo.

Vaya a la sala de emergencia si tiene:

- Dolor de cabeza severo con cuello rígido
- Confusión o somnolencia inusual
- Debilidad en un lado del cuerpo o dificultad para caminar
- Convulsión
- Temblores o espasmos musculares con fiebre

Más información

- Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores de Arizona: 602-364-4562
- Página del Virus del Nilo Occidental del CDC: cdc.gov/westnile
- Control de Vectores del Condado Maricopa: 602-506-0700

ONE-HealthRecord MVP · Synthetic demonstration · Content drawn from public CDC and Arizona Department of Health Services plain-language disease pages. This handout is informational and does not replace medical advice from your clinician.