
a



b

All test subjects of each syndrome (correctly or incorrectly classified); * = FDR q < 0.05

	Forehead	Periorbital	Nose	Cheek	Philtrum	Lips	Chin/jaw
Achondroplasia (n = 10)	+0.053 80% pos.	**+0.042*** **80% pos.**	+0.043 80% pos.	+0.066 80% pos.	-0.004 40% pos.	**+0.050*** **80% pos.**	-0.002 40% pos.
Cockayne (n = 7)	-0.021 29% pos.	+0.031 43% pos.	**+0.030*** **100% pos.**	**-0.059*** **0% pos.**	-0.002 29% pos.	+0.006 57% pos.	-0.014 29% pos.
Down (n = 19)	+0.003 53% pos.	**+0.057*** **100% pos.**	**-0.024*** **32% pos.**	**+0.112*** **95% pos.**	+0.008 74% pos.	**+0.029*** **84% pos.**	**+0.027*** **74% pos.**
Pallister-Killian (n = 6)	+0.049 67% pos.	**+0.117*** **100% pos.**	+0.034 100% pos.	**+0.121*** **100% pos.**	-0.012 17% pos.	-0.004 67% pos.	-0.055 0% pos.
Rhizomelic CDP (n = 5)	+0.036 60% pos.	+0.039 80% pos.	+0.053 100% pos.	+0.023 80% pos.	-0.011 0% pos.	+0.025 80% pos.	+0.003 60% pos.

mean importance: 0.10, 0.05, 0.00, −0.05, −0.10