



PATOLOGÍA	GENERALIDADES	CLÍNICA Y EXAMEN FÍSICO	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS	TRATAMIENTO
ASMA	Tno inflam. crónico de la VA, heterogéneo, con estrechamiento del árbol bronquial x ↑ de reactividad bronquial. Prevalencia Arg: 10-15%. Fisiopatología: - Gatillo/desencadenante (frío, alérgenos, ejercicio, risa, inf. x virus, humo, fcos, TBQ, etc) → hiperreactividad bronquial → ↓ calibre VA → obstrucción. Fenotipos: - Alérgica + frec, inicio en niños. - Eosinófilos, IgE. - No alérgica - Neutrófilos. - Inicio en edad adulta > mujeres. No alérgicas. - Obstrucción fija al flujo aéreo - FR: prematuros, BPN, ausencia tto con ICS, exposición a TBQ o qcos nocivos, FEV1↓, hipersecre mucosa crónica, eosinofilia en esputo/sangre. - Relacionada a la obesidad Otros tipos: - Ocupacional (se da x trabajo) - Inicio en el adulto. - Agravada x trabajo (ya la tenía)	Hay VARIABILIDAD en tiempo, frecuencia e intensidad. Suelen aparecer/empeorar de noche o al despertar. - Sibilancias - Disnea - Opresión tx - Tos - Limitación variable al flujo aéreo (obstrucción) DX: Antecedentes de smas resp. variables + Espirometría con patrón obstructivo y rta a broncodilatadores (+ 12%/200 ml) EVALUACIÓN DEL PTE: Control de los smas (en últimas 4 sem): (0 → bien / 1-2 → parcialmente / 3-4 → no) - Smas diurnos > 2/sem. - Despertares nocturnos. 1/mes → ya mal controlado. - Medicación de rescate > 2/sem. - Limitación de su actividad. Preguntar FR: - Smas no controlados - Fcos (EJ: ¿cto le dura un Paff?) - Técnica, adherencia, etc. - Comorbilidades (obesidad, ERGE...) - Exposiciones (iTBQ!) - Entorno (social, económico) - Func. pulmonar (FEV1 bajo; <60%) - Intubación/UTI x asma ≥1 exacerbación severa en últ año	ESPIROMETRÍA - Patrón OBSTRUCTIVO (FEV1/FVC < LIN) - Variabilidad post-BD (cuanto + variabilidad, + certeza dx): > 12%/200 ml en FVC o FEV1, o dp de 4 sem de tto. - Subir o bajar tto p/ver la variabilidad. Medición diurna de PEF > 10% Pruebas de provocación bronquial (poco usada) Control: 2-3 m dp de iniciar el tto. Si hubo buen control, ↓ tto (↓ICS 25-50% en intervalos de 2-3m). Luego c/3-12m. En embarazada c/4-6 sem. Dp de exaceración: 1 sem. Seguimiento: Espirometría 3-6m dp del dx, dp anual si está controlado	NO FARMACOLÓGICO - Cesación TBQ, activ. Fca, asma ocupacional, evitar fcos/factores desencadenantes. FARMACOLÓGICO - Siempre verificar técnica uso (hasta en 80% hay error). - Ya no se usa más salbutamol solo a demanda. - Si la func pulm es normal, ↓ ICS a la mitad y control a las 2-3 sem con pautas de alarma. ¡TODOS LOS PTES DEBEN TENER UN CORTICOIDE INHALADO! STEPS GINA: - Smas < 2/mes: - ICS/formoterol dosis bajas a demanda (1-2). - ICS + SABA a demanda (1-2 dosis). - Smas ≥ 2 meses, pero < 4-5 sem: - ICS/formoterol dosis bajas a demanda (1-2). - ICS dosis bajas A DIARIO (1 c/12h) + SABA a demanda (1-2 dosis). - Smas mayoría de días o despertares noctur. ≥1/sem: - ICS/formoterol dosis bajas A DIARIO (1 c/12h) y a demanda (1-2 dosis, mismo dispositivo). - ICS/LABA dosis bajas A DIARIO (1 c/12h) + SABA a demanda (1-2 dosis). - Smas mayoría de días o despertares noctur. ≥1/sem + función pulmonar baja: - ICS/formoterol dosis intermedia diario (2 c/12h), y a demanda. - ICS/LABA dosis intermedia/alta diario (1 c/12h), + SABA a demanda (1-2 dosis). - Smas no controlados/exacerbaciones a pesar de step4; derivar al neumonólogo: - LAMA + ICS/LABA dosis altas diario + SABA a demanda + corticoides VO.
CRISIS ASMÁTICA	Exacerbación del asma. Hay insuficiencia respiratoria. En guardia gral: 1-12% consulta x crisis. Clasificaciones: - Según evolución: - Tipo 1: progresiva (+ frec) - Tipo 2: rápida (+ H) - Según severidad: - Crisis leve-moderada - Asma casi fatal - Asma fatal	Dificultad para respirar, tos, disnea, opresión tx, sibilancias (NO predicen severidad), ↓ flujo espiratorio.	ESPIROMETRÍA < 60% VEF1/PFE: internar. Medición de pico flujo (FEM o FPE) Saturometría - Dx asma + sat < 92%: OJO. LAB - Estado ácido-base (en ptes con FEV < 30%). - Alcalosis respiratoria (alt + frec) Rx Tx	Broncodilatadores - B-agonistas (salbutamol) → nebulizado (5 mg c/20 min) o aerosol con aerocámara (4 paff c/10-15 min x 1hr, e ir espaciando). Permite dar dosis altas. - Anticolinérgicos (ipratropio) → es mejor combinado con salbutamol. Corticoides - Meprednisona 40-50. Mg/d VO. - Fluticasona inhalada. Oxigenoterapia - Sulfato de Mg 2g IV en 20 min ¡Si o sí en crisis severas! Indicaciones al alta: - Meprednisona 40-60 mg/d x 7-10 d. - Salbutamol (aerosol) 200 mcg c/4-6hs (x aprox 5d).

Ver cuadro guía AAMR p/tto según severidad

Condición pulmonar heterogénea con smas. resp. crónicos x anomalías en la VA y/o alvéolos q provocan una obstrucción persistente y progresiva del flujo aéreo.

Incluye:

- **ENFISEMA** → dilat. VA distal y destrucción de pared alveolar.
- **BRONQUITIS CRÓNICA** → tos + expect. ≥3m/a x 2 a seguidos.

3ra causa de mortalidad mundial.

Prevalencia en Arg: 14%.

FR/etiología:

- **TBQ** (ppal FR)
- **Combustión de biomasa** (2°)
- Susts y qcocs **ocupacionales**
- **Antecedente familiar**
- Contaminación ambiental
- Genético:
 - Déficit de A-1-antitripsina
 - MMP-12
- Alts de desarrollo y crecim. pulmonar (EJ: BPN)
- Estado socioeconómico bajo
- ↑ edad; > mujeres
- Asma e hiperreactiv. bronquial
- Infecciones

DD:

- **Asma**, ICC, bronquiectasias, TBC, bronquiolititis obliterante ("EPOC post viral"), panbronquiolititis difusa, etc.

Pronóstico: INDICE BODE

Marcadores		Puntuación			
		0	1	2	3
B	IMC	>21	≤21		
O	FEV ₁ (%)	≥65	50-64	36-49	≤35
D	Disnea (MRC)	0-1	2	3	4
E	6MWT (m)	≥350	250-349	150-249	≤149

- Supervivencia a 52 meses:
 - 0-2 p → 82%
 - 3-4 p → 69%
 - 5-6 p → 60%
 - 7-10 p → 25%

¿Mejor predictor de riesgo? → haber tenido una exacerbación previa.

Exacerbador frec → ≥ exacerbaciones/año

Etiología:

- Infecciones resp: bact (+), viral.
- Contaminantes ambientales.
- Interrupción medicación.
- No definida (1/3).

Smás ppales:

- **Disnea**
 - Progresiva, persistente, que empeora con el ejercicio.
- **Tos**
 - Crónica, productiva o no.
 - Intermitente, sibilancias recurrentes.
- **Expectoración (en bronquitis)**
 - Crónica.

Enfisea: tx en tonel, “soplador rosado”.

Bronquitis crónica: “abotagado azul”.

Otros:

- Sibilancias
- Opresión tx
- IVAI recu-rrentes
- Fatiga, pérdida de peso
- Edema periférico
- Cambios estado de ánimo (depresión/ansiedad).

Comorbilidades:

- Enf CV
- Sme metabólico
- Osteoporosis
- Depresión/ansiedad
- Disfunción muscular
- CA de pulmón

DX: clínica + antecedentes + espirometría

Triada de Anthonisen:

- ↑ **disnea**
- ↑ **volumen de esputo**
- ↑ **purulencia del esputo**




DD:

- Neumonía, embolia pulm., IC.
- NTX, drr pleural.
- IAM, arritmias.

ESPIROMETRÍA	• Dx • Patrón obstructivo SIN rta a broncodilatadores: FEV1/FVC < 0,70 post BD
LAB	• Hemograma • Gasometría arterial • A-1-antitripsina → a todo pte EPOC ¡DOSAR UNA VEZ EN LA VIDA! Pq se puede tratar.
RX TX, TAC TX	• Agrandamiento de los espacios aéreos. • Hiperclaridad pulmonar/hiperinsuflación • Enfisema panlobulillar de lóbulos inf → patrón frec del déficit de A1-AT.
Otros:	• ECG • Ecocardiograma • Test caminata 6 min (6MWT) • Capacidad de difusión CO
TESTS	(para evaluar smas):
CAT	
CCQ	
Grados de disnea (mMRC),	
Limitación del flujo aéreo (no es lo mismo los grados de gravedad de espirometría que la limitación al flujo aéreo):	• GOLD 1: leve FEV $\geq$80%. • GOLD 2: mod FEV 50-80%. • GOLD 3: grave FEV 50-30% • GOLD 4: muy grave < 30%
-Clasificación GOLD ABE (sirve p/tto)	
LAB	• Hemograma, gasometría • PCR • Espujo (ver purulencia)
ECG	
RX TX	
ESPIROMETRÍA	• No se recomienda en exacerbación.

NO FARMACOLÓGICO				
Cesación TBQ (+ imp)				
Rehabilitación pulmonar				
Entrenamiento fco, educación, cambio de hábitos.				
Oxigenoterapia				
- Indicaciones: - PaO₂ ≤ 55 mmHg o SatO₂ ≥ 88% con/sin hipercapnia confirmada 2 veces en 3 sem. - PaO₂ 55-60 mmHg o SatO₂ 88% con HTPulm, edema perif q sugiera ICC, o policitemia (Hto > 55%). - Mantener SatO₂ ≥ 90%. Reevaluar en 60-90 días.				
Soporte ventilatorio (VNI, CPAP)				
Vacunación				
- Antiinfluenza anual, antineumocócica, SARS-COV2. - dTPA, herpes zóster (> 50 años).				
FARMACOLÓGICO				
Terapia antiinflamatoria:				
Broncodilatadores (pilar del tto, solo sintomático) - SABA/SAMA - LABA/LAMA → LAMA es mejor p/↓ exacerbaciones que el LABA. Corticoides → ¡NO dar ICS a dosis altas en EPOC! MEJOR: TRIPLE TERAPIA ICS/LAMA/LABA ATB → azitromicina (250-500 mg/d 3 tomas/sem) → <i>medio comprimido lun-miér-juev</i>, eritromicina. Mucorreguladores y antioxidantes, IPDE4, xantinas...				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tto inicial</th><th>Exacerbaciones</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> A → 1 BD (preferible de acción larga). B → LABA + LABA. E → LABA + LABA y ver triple terapia si Eo >300. </td><td> <pre> graph TD A[LABA o LABA] -- "si eos en sangre <300" --> B[LABA + LABA*] A -- "si eos en sangre ≥300" --> C[LABA + LABA + GCI*] B -- "si eos en sangre <100" --> D[LABA + LABA + GCI*] B -- "si eos en sangre ≥100" --> C C --> E[Roflumilast FEV1 <50% y bronquitis crónica] C --> F[Azitromicina Preferiblemente en exfumadores] </pre> </td></tr> </tbody> </table>	Tto inicial	Exacerbaciones	A → 1 BD (preferible de acción larga). B → LABA + LABA . E → LABA + LABA y ver triple terapia si Eo >300.	<pre> graph TD A[LABA o LABA] -- "si eos en sangre <300" --> B[LABA + LABA*] A -- "si eos en sangre ≥300" --> C[LABA + LABA + GCI*] B -- "si eos en sangre <100" --> D[LABA + LABA + GCI*] B -- "si eos en sangre ≥100" --> C C --> E[Roflumilast FEV1 <50% y bronquitis crónica] C --> F[Azitromicina Preferiblemente en exfumadores] </pre>
Tto inicial	Exacerbaciones			
A → 1 BD (preferible de acción larga). B → LABA + LABA . E → LABA + LABA y ver triple terapia si Eo >300.	<pre> graph TD A[LABA o LABA] -- "si eos en sangre <300" --> B[LABA + LABA*] A -- "si eos en sangre ≥300" --> C[LABA + LABA + GCI*] B -- "si eos en sangre <100" --> D[LABA + LABA + GCI*] B -- "si eos en sangre ≥100" --> C C --> E[Roflumilast FEV1 <50% y bronquitis crónica] C --> F[Azitromicina Preferiblemente en exfumadores] </pre>			
QUIRÚRGICO				
Reducción volumétrica pulmonar, bullectomía, trasplante pulm.				
VNI, ARM (ante indicaciones); O2 (objetivo: Sat 88-92%).				
Según gravedad:				
- Leve → SABA. - Mod → SABA + corticoides VO +/- ATB. - Grave → internación.				
BD: SABA + SAMA (salbutamol-ipratropio) ATB (con 3 smas o 1+esputo purulento) - VO: amoxi/clavulánico (alergia: macrólidos) x 5-7d. - IV: ampi/sulbactam (internados: 10-14d).				
>80% → mane ambulatorio.				

Neumonía (NAC)	Enf. resp. parenquimatosa aguda febril + smas + radiología. Incidencia anual global: 5-11/100.000 h, ↑ con la edad (>18: 8,4% / >65: 34%). Vías de infección: • Gotas de flügge (+ frec). • Aspiración de secr orales (EJ: broncoaspiración en ACV). • Sobreinfección a partir de inf. viral previa. • Diseminación hematógena (- frec. EJ: absceso axila, grano). FR: • Edad, TBQ, enf cardíaca crónica, enf renal, enf hepática, DBT, neoplasias, mieloma múltiple, asplenia, hipogammaglobulinemia, HIV, fármacos (ICS dosis altas, IBP). Agentes etiológicos (+ frec): • Bacterias → neumococo (60-70%), haemophilus influenzae, moraxella, s. aureus, mycoplasma, etc. • Virus → influenza (+ adultos), sincitial respiratorio (VSR) (+ en niños). Complicaciones: • Absceso • Empiema • Organización • Diseminación bacteriana	Tos Expectoración • “Espujo herrumbroso” Disnea Taquipnea, taquicardia Fiebre + escalofríos (30% no tienen fiebre) Dolor torácico • Pleurítico, en “puntada de costado” Mialgias, decaimiento EF → sme de condensación: • Palpación - VV aumentadas • Auscultación - MV ausente - Soplo tubario, broncofonía, pectoriloquia - Estertores crepitantes, roncus, sibilancias • Percusión - Submatidez en zona afectada DX: CLÍNICO Algunos ptes mayores no tosen, no expectoran, y no tienen leucocitosis. <table><tr><td>Confusión</td><td>1</td></tr><tr><td>Urea elevada mayor a 90 mg/dl</td><td>1</td></tr><tr><td>Frecuencia respiratoria mayor a 30/minuto</td><td>1</td></tr><tr><td>Tensión arterial sistólica < 90 mmHg o presión arterial diastólica < 60 mmHg</td><td>1</td></tr><tr><td>Edad igual o mayor a 65 años</td><td>1</td></tr><tr><td colspan="2">La presencia de cada ítem otorga 1 punto</td></tr></table>	Confusión	1	Urea elevada mayor a 90 mg/dl	1	Frecuencia respiratoria mayor a 30/minuto	1	Tensión arterial sistólica < 90 mmHg o presión arterial diastólica < 60 mmHg	1	Edad igual o mayor a 65 años	1	La presencia de cada ítem otorga 1 punto		LAB • Hemograma • PCR (GS para influenza) - > 100mg/L: asoc NAC • Procalcitonina - ↑ en inf bact, 6hs dp - No se usa p/iniciar ATB pero sí para ver si seguir o no. • Análisis de secreciones - Prueba de esputo (+ en internación, con tinción gran y cultivo) tarda 2-3d. - Aspirado traqueal (en intubados) - BAL (en cuadros graves, fracaso tto, sospecha obstrucc. bronquial). • Hemocultivos - 2 p/confirmar bacteriemia. - En internados, HIV, enf. crónicas. • Otros: ELISA en orina (p/detección de Ags urinarios), etc. RX TX • Infiltrado lobar/segment, y/o drr pleural. TAC TX • En inmunodeprimidos, dudas dx, neutropénicos, HIV, complic pleurales (+ ECO). SCORES (p/estratificación riesgo) • PSI • ATS/IDSA • SMART-COP • CURB-65 - 0 → ambulatorio - 1 → eval. Individual - 2 → internación gral - 3-5 → UTI	Evaluación: CURB 65 + Sat O2 (>/< 92%) En base a estos parámetros decido: • CRB 65 0 + SatO2 >92% → Tto ambulatorio. • CRB 65 0 + SatO2 < 92% o CURB65 1-4 → Interno. Ambulatorio: • Amoxi/clavulánico 875/125 (1000 mg/12h VO x 5-7d. - Alternativa: claritro (500 c/12 VO), levo, etc. • Control a las 48hs. • Pautas de alarma: - Fiebre al 4to día. - Disnea que empeora. - Intolerancia VO. - Deterioro de conciencia. Sala gral: • Ampi/sulbactam 1,5g/6h IV +/- claritro 500 mg/12 x 5-7d (claritro: p/cubrir micoplasma y chlamydia, depende de nuestra sospecha). - Alternativa: ceftriaxona (1g/24h IV), levo, etc. UTI: • 10% ptes suelen requerir. • Idem ATB p/sala gral (de elección) • Riesgo de pseudomona: - Piper/tazo 4,5g c/8h. - Cefepime 2g/8h + claritromicina 500mg c/12h. • Riesgo de SAMR: - Agregar al esquema de tto de elección: vancomicina 15mg/kg/12h +/- clindamicina 600mg/8hs. Riesgo pseudomonas y SAMR: requiere tto + prolongado: ➢ Lobar: 2 sem. ➢ Bacteriémica: 1 mes. ➢ Cavitada/abscedada: varias sem hasta resolver. • Influenza: - Oseltamivir 75mg/12h x 5d. Prevención: • Vacunas - Antigripal - Antineumocócica ○ Conjugada 13 valente (1 dosis). ○ Polisacárida 23 valente (1 dosis y refuerzo a los 5 años).	Neumonía atípica	Agentes etiológicos: • Mycoplasma (+), chlamydia, legionella, pneumocystis. • Virus. • Hongos. Más en niños/adolescentes.	Cuadro prolongado (> 7d). Inicio como cuadro viral. Tos seca. Disnea. EF → rales bibasales, sibilancias.	RX TX • Bilateral, difuso, en vidrio esmerilado. • Más en bases.	Macrólidos (claritromicina, eritromicina, azitromicina). Tetraciclina (doxiciclina). Levofloxacina.
Confusión	1																				
Urea elevada mayor a 90 mg/dl	1																				
Frecuencia respiratoria mayor a 30/minuto	1																				
Tensión arterial sistólica < 90 mmHg o presión arterial diastólica < 60 mmHg	1																				
Edad igual o mayor a 65 años	1																				
La presencia de cada ítem otorga 1 punto																					

Bronquiectasias	Dilatación anormal e irreversible de los bronquios de mediano calibre (> 2mm) x destrucción de la parte elástica y muscular de la pared, en gral x infección. + en > 60 años. El 29-50% son ptes EPOC. Clasif x morfología: * • Cilíndricas (dilat. uniforme) • Varicosas (dilat. no uniforme) • Quísticas Etiología: • Postinfección (+ frec) - Neumonías necrotizant, TBC, otras micobacterias, adenovirus, sarampión, hongos, etc. • Obstrucción bronquial - Estenosis cicatricial, tumor, cuerpo extraño, adenopatías, aneurisma, broncolitiasis, etc. • Inmunodeficiencias - 1rias o 2rias a QT, HIV, trasplantes, CA, etc. • Alt. esclera mucociliar - FQ, sme Young, discinesia ciliar 1ria. • Neumonitis inflamatoria - Aspiración, RGE, etc. • Anormalidad árbol traqueobronquial - Sme Mounier-Kuhn, Sme Williams-Campbell, secuestro pulm, bronquio traqueal, traqueobroncomalasia. • Asoc. a otras enf - EII, LES, AR, Sjögren, Marfan, sarcoidosis, asma, EPOC, etc. • Otras Fisiopatología: Alt clearance mucociliar → crecim bact y lesión epitelio ciliar → infla. Crónica → infecciones recurrentes → bronquiectasia.	Tos crónica Expectoración Hemoptisis • Por erosión x neovascularización y cambios en la morfología de los vasos. Inf. resp. a repetición Broncorrea, bronquitis a repetición Otros: • Disnea • Sibilancias • Dolor tx EE • Inspección - Acropaquia - Desnutrición • Auscultación - Puede haber estertores crepitantes (+ inspiración) en zonas afectadas. - Roncus y sibilancias (si hay obstrucción al flujo aéreo). DX: TC alta resolución <i>*Morfología imágenes:</i> Cilíndrica:  Varicosa:  Quística: 	LAB (p/ver inflam. y estado nutricional) • Hemograma, VSG, PCR • Proteinograma • Inmunoglobulinas (si hay sospecha de inmunodef. x inf a repetición o rinosinusitis) • Cultivo de esputo RX TX • El 50% son normales. • Opacidades lineales paralelas (signo rail tren). • Opacidades tubulares u ovoides (hay moco en VA). • Imágenes aéreas con pared definida ("en anillo de sello"). TAC (AR) • GS para el dx. • Cortes 1mm en insp máx. • Signos directos: - Dilat. Bronquial: índice broncoart >1. - Signo anillo de sello. - Signo rail del tranvía. - Signo ristra de perlas - Quistes arracimados (no son quistes, es morfología quística). - Falta de afinamiento bronquial >2cm distal a la bifurcación - Bronquios a <1cm de la pleura. • Signos indirectos: - Engrosamiento peribronquial. - Impactos mucoides. - Niveles hidroaéreos. - Patrón en mosaico. - Atrapamiento aéreo. - Opacidades, nódulos. - Etc. ESPIROMETRÍA • Obstrucción crónica. Otras pruebas dx según sospecha.	Según causa: Colonización/inf. bronquial: • Inicial: - Para erradicar pseudomonas: ○ Ciprofloxacina 750mg/12h x3 sem VO ○ Tobramicina o colistin inhal. x 3-12 m ○ Alternativa: A ATB antipseudomónicos x 14-21d. - Otros: individualizar. • Crónica: - ATB con conc. hasta 20 veces + dosis q sistémicos, inhalados. - Tobramicina 300mg/12h c/28 d. - Colistimetato de sodio 2 mill UI/12h en 4ml de solución isotónica. Hipersecreción bronquial: • Fisioterapia respiratoria (1.3 veces/d). • Mucolíticos (EJ: manitol, sol. Hipertónica, etc). • ICS, macrólidos. Inflamación bronquial: • ICS (ante broncorrea, obstrucción al flujo aéreo). • Macrólidos (ante pseudomonas y moorg difíciles) - Azitromicina 250-500 mg x 6m (<i>trisemanal</i>). Hiperreactividad bronquial: • Similar a EPOC (BD, ICS). 8 Otros: • Tto nutricional - Monitoreo IMC, suplementos. • Atelectasias → kinesio respiratoria, BD, ATB, FBC. • Hemoptisis → ATB, embolización, FBC, Cx. • Insuf resp → O2, VNI. • Cx - Lobectomía/resección pulmonar. - Trasplante pulmonar. Seguimiento: • Control c/1-6m según el pte (6 leve, 3 grave). • Cultivo de esputo c/visita (p/dx precoz pseudomona). • Peso, talla, IMC c/visita. • Rx tx anual. • TAC tx c/2 años (en ptes con riesgo de progresión). • Espirometría anual (mínimo). • Laboratorio anual.
Agudizaciones de bronquiectasias	Cambios en esputo + otros smas de forma aguda y mantenida. Patógenos: • P. aeruginosa, H. influenzae, S. pneumoniae, S. aureus, M. catarrhalis, enterobact. Virus...	Esputo: ↑ vol, consistencia, purulencia/hemoptisis. ↑ disnea no debida a otra causa. Tos, fiebre, astenia, anorexia, pérdida peso, dolor tx, etc.	LAB • ↑ reactant. de fase aguda RX TX ESPIROMETRÍA	Tto broncoespasmo: • BD, corticoides sistémicos, fisioterapia respiratoria. Tto agentes: • ATB (>10 d; en pseudomonas 14 d). según agente. - P. aeruginosa: ciprofloxacina 750mg VO c/12 (inf leves); ceftazidima 2g c/8h IV + colistina (graves).

Enf. intersticiales	Grupo de > 150 enf que afectan al intersticio. El intersticio es la red de TC del pulmón, y se puede localizar en: - Peribroncovascular - Parenquimatoso - Subpleural Etiología: - Fcos (amiodarona, MTX, nitrofurantoina, bleomicina, busulfán, etc) - RT - Las enf. a continuación ↓ ↓ ↓	Disnea progresiva (<i>DD asma: variable</i>). Tos seca. Sibilancias (raro, depende la causa) Dolor pleurítico, drr pleural (depende la causa) EF - Inspección → hipocratismo o clubbing digital. - Auscultación → crepitantes tipo velcro (x la fibrosis). Estrategia DX se basa en: causa + cronología + contexto	LAB RX TX, TC TX - Siempre pedir placas previas que tenga el pte. ESPIROMETRÍA - Patrón restrictivo. Otros según causa Fibrobroncoscopía, BAL, biopsia, etc. NO hay que biopsiar a todos los ptes.	
Enf del TC	Ejemplos: LES, SS, AR, miositis, DM, vasculitis, etc.		LAB - Auto-Acs (según enf) - Otros	
Neumonitis por hipersensibilidad	Rta inmune exagerada a inhalación de ags del ambiente, sobre todo x exposición laboral/hogar. Hay predis. genética. <u>EJ</u>: aves, plumas, aire AC central, humedad (hongos en pared de casa), paja, maderas, trabajo con pieles, corcho, pinturas, etc.		LAB - Prueba de sensibilización - Acs IgG hacia ag. - Linfocitosis BAL >30% IMÁGENES, FUNCIÓN RESP - Patrón EPI Biopsia transbronquial (evaluar)	Remoción del foco que genera la hipersensibilidad. Corticoides x 2 meses.
Neumocosis	Enfs. Pulmonares producidas x inhalación de polvo y deposición en VA y parénquima pulm. <u>EJ</u>: silicosis, asbestosis (ojo mesotelioma), talcosis, antracosis, níquel, siderosis, baritosis, etc.			
Fibrosis pulmonar idiopática	Forma específica de EPI fibrosante, limitada al pulmón. Dx de exclusión. Progresiva, crónica e irreversible. + en > 60 años. Antecedente de TBQ. MUY mal pronóstico.	Disnea. Estertores crepitantes tipo velcro. Acropaquia digital.	TC (AR) - Patrón NIU (neum. Interst. Usual). - Subpleural.	No farmacológico: - Cesación TBQ, O2, rehab resp, tto de enf. asociadas. - Cx: trasplante temprano. Farmacológico: - Pirfenidona, nitedanib (antifibróticos, muy caros).
Sarcoidosis	Enf. granulomatosa de causa desconocida. Afecta a cualquier órgano, pero típicamente a los pulmones.	Asintomática la mayoría del tiempo. Tos seca. Disnea. Molestias tx. DX: clínica + radiología + biopsia con granulomas no caseificantes	RX TX - Nódulos 2-5mm de distribución perilinfática y predominio en lóbulos sup - Adenomegalias hiliares y subcarinales. - Fibrosis. BIOPSIA - Granulomas no caseificant.	
Linfangiectomiomatosis	Enf rara con prolif de músc liso alrededor de estructuras broncovasc e intersticio.	Disnea de esfuerzo, tos. Neumotx, quilotx. Smas extrapleurales (adenopatías, angiomiolipomas, colecciones abd, etc).	RX TX Múltiples quistes diseminados, asoc o no a nódulos pulm aleatorios. BIOPSIA	
Histiocitosis pulm. De céls de Langerhans	Enf rara con infiltración de órganos x céls de Langerhans. + en adultos jóvenes y TBQ. Curso impredecible (B o M mortal).		RX TX Nódulos centrolobulillares, quistes, + en lób sup/med. LAB BIOPSIA	
Proteinosis alveolar	Enf rara x acumulación alveolar de material derivado del surfactante.		RXTX Crazy paving BAL	Lavado pulmonar total, terapia con GM-GSF, plasmaféresis. Rituximab.

SAHOS Sme de apnea-hipopnea obstructiva del sueño. Tnos conductuales, respiratorios, CV, metabólicos, etc, 2rios a episodios repetidos de obstrucción de VAS durante el sueño. Epidemiología: 1/5 de adultos tiene al menos SAHOS leve. 80% no se diagnostica. Fisiopatología: - Factores anatómicos q generan una ↓ del calibre de la VAS. - Factores funcionales relacionados con el sueño. ↓ Aumento colapsabilidad VAS FR: Obesidad (80% de los ptes) - Ppal FR modificable. + en obesidad central. Edad (↑ con la edad) Sexo (+ en hombres 3:1; en mujeres ↑ post menopausia) Riesgos: - Dormirse al volante (↑x3-7). - Accidentes laborales. ↑ x3 riesgo CV Definiciones: ➤ Apnea Obstructiva → ausencia/↓ de >90% de la señal resp >10 seg ante esfuerzo resp. Central → ausencia/↓ de >90% de la señal resp >10 seg en ausencia de esfuerzo resp. Mixta → evento resp que inicia con un componente central y termina con un componente obstructivo. ➤ Hipopnea ↓ 30-90% de señal resp >10s + desaturación ≥3% y/o 1 micro-despertar en el EEG.	Triada clásica: RONQUIDOS estruendosos APNEAS presenciadas x un 3ro SOMNOLENCIA EXCESIVA Otros smas: <table><tr><th>Nocturnos</th><th>Diurnos</th></tr><tr><td>Despertares asfícticos y ftes.</td><td>Sensación de sueño no reparador.</td></tr><tr><td>Movs. Anómalos.</td><td>Cansancio crónico.</td></tr><tr><td>Nicturia.</td><td>Cefalea matutina.</td></tr><tr><td>Pesadillas.</td><td>Irritabilidad.</td></tr><tr><td>Sueño agitado.</td><td>Depresión.</td></tr><tr><td>Insomnio.</td><td>Dificultad para concentrarse.</td></tr><tr><td>RGE.</td><td>Pérdida de memoria.</td></tr><tr><td></td><td>Déficit cognitivo.</td></tr><tr><td></td><td>Impotencia/pérdida de la lívido.</td></tr></table> DX: CLÍNICA + ESTUDIO DEL SUEÑO EF: - IMC - Medición circunferencia cuello - Distancia hioides-mandíbula - TA - Auscultación cardiorrespiratoria. - Evaluación ORL básica - Smas nasales - Amígdalas - Maxilar y mandíbula - Calidad de mordida - Etc. Criterios dx: <table><tr><th>Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR)⁽²⁾</th><th>Academia Americana de Medicina del Sueño (AAMS)⁽³⁾</th></tr><tr><td>Definición SAHS</td><td></td></tr><tr><td>IAR > 5 asociado al menos a uno de los siguientes criterios:</td><td>IAR > 5 asociado al menos a uno de los siguientes criterios:</td></tr><tr><td>a. Excesiva somnolencia diurna no explicada por otras causas</td><td>a. Excesiva somnolencia diurna no explicada por otras causas</td></tr><tr><td>b. Dos o más de las siguientes:</td><td>b. Dos o más de las siguientes:</td></tr><tr><td>– Crisis asfícticas repetidas durante el sueño</td><td>– Crisis asfícticas repetidas durante el sueño</td></tr><tr><td>– Despertares frecuentes durante el sueño</td><td>– Despertares frecuentes durante el sueño</td></tr><tr><td>– Percepción del sueño como no reparador</td><td>– Percepción del sueño como no reparador</td></tr><tr><td>– Cansancio o fatigabilidad durante el día</td><td>– Cansancio o fatigabilidad durante el día</td></tr><tr><td>– Dificultad de concentración</td><td>– Dificultad de concentración</td></tr></table> IAR ≥ 15 independientemente de la sintomatología SAHS: síndrome de apneas-hipopneas del sueño; IAR: índice de alteraciones respiratorias.	Nocturnos	Diurnos	Despertares asfícticos y ftes.	Sensación de sueño no reparador.	Movs. Anómalos.	Cansancio crónico.	Nicturia.	Cefalea matutina.	Pesadillas.	Irritabilidad.	Sueño agitado.	Depresión.	Insomnio.	Dificultad para concentrarse.	RGE.	Pérdida de memoria.		Déficit cognitivo.		Impotencia/pérdida de la lívido.	Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ⁽²⁾	Academia Americana de Medicina del Sueño (AAMS) ⁽³⁾	Definición SAHS		IAR > 5 asociado al menos a uno de los siguientes criterios:	IAR > 5 asociado al menos a uno de los siguientes criterios:	a. Excesiva somnolencia diurna no explicada por otras causas	a. Excesiva somnolencia diurna no explicada por otras causas	b. Dos o más de las siguientes:	b. Dos o más de las siguientes:	– Crisis asfícticas repetidas durante el sueño	– Crisis asfícticas repetidas durante el sueño	– Despertares frecuentes durante el sueño	– Despertares frecuentes durante el sueño	– Percepción del sueño como no reparador	– Percepción del sueño como no reparador	– Cansancio o fatigabilidad durante el día	– Cansancio o fatigabilidad durante el día	– Dificultad de concentración	– Dificultad de concentración	TESTS STOP-BANG <table><tr><th>Variables</th><th>Odds ratio</th></tr><tr><td>Apneas observadas</td><td>2.57</td></tr><tr><td>IMC > 35 kg/m²</td><td>2.49</td></tr><tr><td>Edad > 50 años</td><td>2.43</td></tr><tr><td>Circunferencia cuello > 40 cm</td><td>2.53</td></tr><tr><td>Sexo masculino</td><td>4.05</td></tr><tr><td>Cansancio o somnolencia</td><td>1.33</td></tr><tr><td>Ronquido</td><td>1.80</td></tr><tr><td>HTA</td><td>1.11</td></tr></table> Escala de somnolencia de Epworth Estudios del sueño: POLIGRAFÍA RESPIRATORIA - Puede hacerse en la casa. - Mide variables cardiorrespiratorias. POLISOMNOGRAFÍA - Gold Standard. - Describe: - Arquitectura del sueño. - Oxigenación durante el sueño. - Eventos respirat.: - Apnea - Hipopnea - Esfuerzos resp asoc a micro-despertar Índice AH Índice de alt. resp. MEDIDAS GENERALES Pérdida de peso (ideal: IMC < 25). Higiene del sueño. ≥6hs/noche, horarios regulares, no comer pesado antes de acostarse, etc. - Tto postural. - Cesación TBQ. - Evitar BZD si hay que usar sedantes; elegir sedantes no BZD de vida media/corta (EJ: zolpidem, zopiclona). - Si el pte usa diuréticos, tomarlos a la mañana. - Corrección de obstrucción nasal. - Evitar consumo de alcohol. - Controlar enf asociadas (EJ: hipotiroidismo, RGE, IR...). MEDIDAS ESPECÍFICAS CPAP (tto de elección) - Genera P + continua en VAS, impidiendo su colapso. Se usa en SAHOS mod/grave.  - Dispositivos de avance mandibular - Para ronquido simple, SAHOS leve. ↑ diámetro del espacio retrofaríngeo. - Cx - Bariátrica, de corrección de VAS. Clasif SAHOS según IAH/IPR: Normal: < 5 eventos/h. Leve: 5-15 eventos/h. Mod.: 15-30 eventos/h. Severo: ≥30 eventos/h.	Variables	Odds ratio	Apneas observadas	2.57	IMC > 35 kg/m²	2.49	Edad > 50 años	2.43	Circunferencia cuello > 40 cm	2.53	Sexo masculino	4.05	Cansancio o somnolencia	1.33	Ronquido	1.80	HTA	1.11
Nocturnos	Diurnos																																																											
Despertares asfícticos y ftes.	Sensación de sueño no reparador.																																																											
Movs. Anómalos.	Cansancio crónico.																																																											
Nicturia.	Cefalea matutina.																																																											
Pesadillas.	Irritabilidad.																																																											
Sueño agitado.	Depresión.																																																											
Insomnio.	Dificultad para concentrarse.																																																											
RGE.	Pérdida de memoria.																																																											
	Déficit cognitivo.																																																											
	Impotencia/pérdida de la lívido.																																																											
Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) ⁽²⁾	Academia Americana de Medicina del Sueño (AAMS) ⁽³⁾																																																											
Definición SAHS																																																												
IAR > 5 asociado al menos a uno de los siguientes criterios:	IAR > 5 asociado al menos a uno de los siguientes criterios:																																																											
a. Excesiva somnolencia diurna no explicada por otras causas	a. Excesiva somnolencia diurna no explicada por otras causas																																																											
b. Dos o más de las siguientes:	b. Dos o más de las siguientes:																																																											
– Crisis asfícticas repetidas durante el sueño	– Crisis asfícticas repetidas durante el sueño																																																											
– Despertares frecuentes durante el sueño	– Despertares frecuentes durante el sueño																																																											
– Percepción del sueño como no reparador	– Percepción del sueño como no reparador																																																											
– Cansancio o fatigabilidad durante el día	– Cansancio o fatigabilidad durante el día																																																											
– Dificultad de concentración	– Dificultad de concentración																																																											
Variables	Odds ratio																																																											
Apneas observadas	2.57																																																											
IMC > 35 kg/m²	2.49																																																											
Edad > 50 años	2.43																																																											
Circunferencia cuello > 40 cm	2.53																																																											
Sexo masculino	4.05																																																											
Cansancio o somnolencia	1.33																																																											
Ronquido	1.80																																																											
HTA	1.11																																																											

CÁNCER DE PULMÓN	Es la causa + frec de muerte x CA. Supervivencia a 5 años: 8-15%. El 70% se diagnostica en fases avanzadas. 16% de fumadores desarrollarán el CA. FR: - TBQ (90%) - Índice paquetes-año (IPA) Nº cig. / día x Nº años fumando 20 (Nº de cigarrillos en un paquete) ¡SIEMPRE dar consejo antitabáquico! - Exposición ocupacional (asbesto/amianto, sílice, arsénico, radón, etc). - TBQ pasivo. - Humo/vapor de carbón. - HPV. - Dieta (EJ: sucralosa, endulzante de bebidas, etc). - EPOC (+ enfisema). Screening: - No hay; pero sí detección precoz: TC a bajas dosis. ≥50 años. - TBQ ≥20 a de 20 p/a. - Enf resp (EPOC, fibrosis...) - Antecedentes fliares CA. - Cesación TBQ < 15 a.	Ante estos smas hacer RxTx: - Tos - Dolor tx - Disnea - Hemoptisis - Anorexia, astenia, pérdida de peso - Acropaquia Otros: - Sme de Pancoast - Dolor/tumor en pared tx - Dolor en hombro - Disfonía (x infiltración n recurrente) - Parálisis frénica - Drr pleural - Disfagia, sme de VCS - Drr pericárdico/taponamiento - NAC a repetición en mismo lóbulo Extrapulmonares: - Dolor óreo/fracturas patológicas - Adenopatías supraclaviculares ¡PALPAR HUECO SUPRACLAV.! - Hepatomegalia - Tnos neurológicos (cefalea, etc) Paraneoplásicos (10%): - Hiper/hipo Ca, hipo Na - Anemia, trombocitosis - Sme Cushing - Smas miasteniiformes - Polimiositis, dermatomiositis - TEP	LAB - Marcadores tumorales (solo p/seguimiento) → SCC, CYFRA 21-1 (+ espec), NSE, CEA, CA 125. RX TX - Estudio inicial. - Signos (ante duda: TC): - Ensancham. Hiliar - Drr pleural - Atelectasia - Nódulos ¡PEDIR PLACAS PREVIAS! PET-TC RMN - P/ver mediastino, pared tx. - Mtts cerebrales. ECO - Poco útil. P/pleura, intervencionismo. HISTOLOGÍA - Dx de certeza - Estirpe histológica - TNM - Métodos de obtención: citología de esputo, broncoscopia, PAAF, toracocentesis, biopsia pleural, técnicas cx.	Cx: - NO se opera desde estadio 3A, por el N2. 3B nunca. - Curación en estadios I y II. - Evaluación pre-cx: - Riesgo CV - Función pulmonar - Capacidad esfuerzo aeróbico - Tipos de resección: - Segmentaria - Lobar (lobectomía) → ELECCIÓN - Neumonectomía - En tumores centrales, en cisuras, si no se puede resear x otras técnicas. - Linfadenectomía (≥6 GL, 3 intrapulm. y 3 mediastín.). No cx: - QT - Adyuvante: N1, N2/Neoadyuvante: down staging - RT - Ante no poder cx. Est.1, perif, ancianos, EPOC. - Ablación x radiofrecuencia - Estadio 1 con CI para cx o RT. Est. III → QT (cisplatino-pemetrexed). Est IV → depende del PS. 0-2 → QT / 3-4 → tto de soporte. <table><tr><th>T</th><th>N</th><th>M</th></tr><tr><td>T1: ≤ 3cm. T2: >3 y ≤ 5 cm. T3: >5 y ≤ 7cm. T4: > 7cm.</td><td>N1: hilar. N2: mediastinal, subcarinal. N3: contralateral, supraclavicular.</td><td>1A: contralateral, pleural, pericárdico, drr pleural o pericárdico maligno. 1B: extratorácica única. 1C: extratorácica múltiple.</td></tr></table>	T	N	M	T1: ≤ 3cm. T2: >3 y ≤ 5 cm. T3: >5 y ≤ 7cm. T4: > 7cm.	N1: hilar. N2: mediastinal, subcarinal. N3: contralateral, supraclavicular.	1A: contralateral, pleural, pericárdico, drr pleural o pericárdico maligno. 1B: extratorácica única. 1C: extratorácica múltiple.								
T	N	M																
T1: ≤ 3cm. T2: >3 y ≤ 5 cm. T3: >5 y ≤ 7cm. T4: > 7cm.	N1: hilar. N2: mediastinal, subcarinal. N3: contralateral, supraclavicular.	1A: contralateral, pleural, pericárdico, drr pleural o pericárdico maligno. 1B: extratorácica única. 1C: extratorácica múltiple.																
NÓDULO PULMONAR	Opacidad < 3cm rodeado totalmente por tejido pulmonar sano (> 3cm: masa). Etiología: - Neoplasias (CA, mtts, linfoma, hamartoma, fibrona, etc). - Inflamatorios (granulomas, neumonía redonda, absceso, émbolo séptico, sarcoidosis, AR, amiloidosis, Wegener, etc). - Vasculares (malformación AV, infarto pulmonar, hematoma). - Malform. Congénitas (quiste broncogénico, secuestro pulm). - Otras (nódulos piel, fractura costal, engrosam. Pleural, etc). Tamaño: < 5 mm → < 1%. 5-10 mm → 6-28%. 11-20 mm → 33-64%. > 20 mm → 64-82%.		TC – RX TX <table><tr><th>Signos de B</th><th>Signos de M</th></tr><tr><td>Calcif. Central, palomita maíz, laminado, difuso.</td><td>Calcif. Punteada, excéntrica.</td></tr><tr><td>>sólidos</td><td>< sólidos</td></tr><tr><td>>pequeños</td><td>> grandes</td></tr><tr><td>Duplicación en <20d->400d.</td><td>Duplicación 20-400d.</td></tr><tr><td>>grasa (hamartoma o lipoma)</td><td>Especulación, irregularidad. >lób sup, der. Retracción pleural.</td></tr><tr><td>Cavitación paredes finas</td><td>Cavitación paredes >16mm</td></tr></table> PET-TC - Valor predictivo – - Mejor en NPS > 7mm. SCORES (estimación de riesgo)	Signos de B	Signos de M	Calcif. Central, palomita maíz, laminado, difuso.	Calcif. Punteada, excéntrica.	>sólidos	< sólidos	>pequeños	> grandes	Duplicación en <20d->400d.	Duplicación 20-400d.	>grasa (hamartoma o lipoma)	Especulación, irregularidad. >lób sup, der. Retracción pleural.	Cavitación paredes finas	Cavitación paredes >16mm	Según tamaño: >8mm: - Con FR: seguimiento (≤4mm: a los 12m; 4-6mm: a los 6-12m y al año; 6-8mm: a los 3-6m y al año so va bien) - Sin FR: nada, o seguimiento c/12 o 6m según tamaño. <8mm: - Alto riesgo cx: vigilar con TAC, biopsia cx. - B: tto específico. - M: eval. estadio (y tto según el mismo).* - Bajo-mod riesgo cx: - Medir probabilidad clínica de CA: - Muy baja: vigilar con TAC. - Baja-mod: hacer PET. -/leve: TAC, biopsia no cx. - Mod/alta: bipsia no cx o resección cx. - Alta: evl. Estadio y tto según él.* *Tto según estadio: - Sin mtts: resección cx, ablación x radiofrecuencia, RT estereotáctica. - Con mtts: QT/quimiorradiación post biopsia.
Signos de B	Signos de M																	
Calcif. Central, palomita maíz, laminado, difuso.	Calcif. Punteada, excéntrica.																	
>sólidos	< sólidos																	
>pequeños	> grandes																	
Duplicación en <20d->400d.	Duplicación 20-400d.																	
>grasa (hamartoma o lipoma)	Especulación, irregularidad. >lób sup, der. Retracción pleural.																	
Cavitación paredes finas	Cavitación paredes >16mm																	

TEP	Enclavamiento de un trombo desprendido (émbolo) en las arterias pulmonares. El embolo proviene 90-95% de TVP proximal de MMII. Es una urgencia CV. 3ra causa de muerte CV, y de las + frec IH. Incidencia: 70/100.000 h/año. TEP no tratada: mortalidad del 30%. FR: • Tríada de Virchow: - Estasis venosa - Hipercoagulabilidad - Lesión pared vascular • Edad (+ imp) • Factores predisponentes • Trombofilias hereditarias DD: • Trombofilias • Neoplasia oculta	Disnea súbita • Cuadro clínico típico: pte post-cx que empieza con disnea súbita. • Pleurítico (en puntada de costado). Taquipnea Palpitaciones Dolor tx Ansiedad Fiebre Síncope/presíncope Hemoptisis Shock, hTA (poco frec, grave) <i>Factores predisponentes:</i> <table><tr><th>Fuertes</th><th>Mod-leves</th></tr><tr><td>Fractura cadera o pierna.</td><td>Artroscopía rod.</td></tr><tr><td>Prótesis cadera/rod</td><td>Acceso venoso cent QT</td></tr><tr><td>Cx gral mayor</td><td>IC</td></tr><tr><td>Traumatismo mayor</td><td>Embarazo/posparto</td></tr><tr><td>Lesión medular</td><td>Trombofilia</td></tr><tr><td></td><td>Reposo/inmovilidad</td></tr><tr><td></td><td>Obesidad</td></tr></table> <u>EF:</u> • Maniobras de Homans y Olow.	Fuertes	Mod-leves	Fractura cadera o pierna.	Artroscopía rod.	Prótesis cadera/rod	Acceso venoso cent QT	Cx gral mayor	IC	Traumatismo mayor	Embarazo/posparto	Lesión medular	Trombofilia		Reposo/inmovilidad		Obesidad	ESCALAS DE PUNTAJES • Wells - Parámetros: FC >100, TEP previo, hemoptisis, inmovilización/cx <1m, CA activo, clínica de TVP). • Ginebra • PESI • Dímero D (alto valor predictivo negativo). - Tb ↑ en: CA, trauma, inflam, hrr, necrosis. • Gasometría arterial: hipoxemia + hipocapnia. • De elección. LAB TAC ANGIOGRAFÍA PULMONAR (GS) RX TX (muy inespecífica/normal) ECG (S1Q3T3, taquicardia, bloq RD...) ECOCARDIOGRAMA (dilat VD) CENTELLOGRAMA V/Q DOPPLER MMII (p/dx de TVP) ANGI-RM con protocolo p/TEP	ALTO RIESGO (5%) Reanimación inicial: • Expansión de la volemia. • Inotrópicos/vasopresores (ante falta de rta a expansión de volemia). NA + dobutamina. • Otros: ECMO veno-arterial, AVM (en insuf. Resp.). Reperusión: • Trombolíticos sistémicos - Estreptoquinasa: 1,5 mill UI x2hs sin heparina IV. - Alteplasa: 100 mg en infusión x 2hs. • Trombectomía cx o endovascular MODERADO RIESGO (30-50%) • Anticoagulantes (inicial). • Trombolíticos (no de rutina). BAJO RIESGO (mayoría) Anticoagulantes: • HNF (tto clásico inicial) - Inicial: bolo de 5 mil UI IV. - Goteo: 15-18 UI/K/hr. • HBPM (Nadroxaparina, enoxaparina) • DOACs • Otras (fondaparinux, bivalirudina) • Tto mín x 3 meses. Otros: filtros VCI. Medidas generales: • Deambulación precoz (desde 5-7d de iniciada la anti-coagulación), medias elásticas, O2 (ante sat <90%). Esquema: HNF/HBPM (5d) + Antagonista VitK (titular dosis hasta RIN 2-3)
Fuertes	Mod-leves																			
Fractura cadera o pierna.	Artroscopía rod.																			
Prótesis cadera/rod	Acceso venoso cent QT																			
Cx gral mayor	IC																			
Traumatismo mayor	Embarazo/posparto																			
Lesión medular	Trombofilia																			
	Reposo/inmovilidad																			
	Obesidad																			
HEMOPTI-SIS	Expectoración de sangre proveniente del árbol traqueobronquial. Tipos: • Expectoración hemoptoica • Hemoptisis franca • Hemoptisis amenazante Etiología: • Bronquitis • CA broncogénico • Bronquiectasias • Neumonía • Idiopáticas (20%) • Iatrogénicas • TEP • Infecciosas (TBC, abscesos...) • Coagulopatías • Patologías inflam/inmunológicas • Trauma • Cuerpos extraños DD: • Gingivorragia • Hematemesis • Sangrados naso/oro faringe	Salida de sangre por cavidad oral → espumosa, rojo brillante. Tos, disnea, dolor tx. <u>EF:</u> • Examinar cavidad oral, fosas nasales.	LAB • Hemograma • Coagulograma • Esputo • Otros según sospecha (gasometría, dímero, PPD, marcadores tumorales, orina, ANA, ANCA, etc). ECG, ECOCARDIOGRAMA • Eval repercusión hemodinámica. RX TX <i>Pruebas dirigidas:</i> TC (TC multislice: TCMS) • Varía según sospecha: - TCAR sin contraste: bronquiectasias. - Alto riesgo: contraste - Amenazante: angioTCMS. BRONCOSCOPÍA • P/confirmación, dx causa, localización, control transitorio de la hrr.	HEMOPTISIS LEVE (< 20-30 ml/d) • Tto ambulatorio. • Reposo relativo, abstención TBQ. • Antitusígenos si tiene tos molesta. • ATB ante sospecha de infección. HEMOPTISIS MODERADA • Internación. • Reposo absoluto, decúbito ipsilateral al lugar de hrr. • ATB empírico. • CSV. • Dieta absoluta? • Acceso venoso grueso. • Inhibidores de la fibrólisis: - Ácido aminocaproico. - Ácido tranexámico. HEMOPTISIS MASIVA/AMENAZANTE • UTI • Protección de la VA: - IOT - Bloqueo bronquial • Broncoscopia (tto inicial de elección) - Rígida (permeabilidad) y flexible (terapéutica). • Embolización (tto + seguro y eficaz) - Ante as patológicas en angio-TCMS. • Cx Colocación catéter-balón Fcos hemostáticos • Vasoconstrictores (adrenalina) • Ác tranexámico • Fibrinógeno-trombina Fotocoagulación con láser Electrocoagulación con plasma argón Etc																

Esquema:
HNF/HBPM (5d)
+
Antagonista VitK
(titular dosis hasta RIN 2-3)

Colocación catéter-balón
Fcos hemostáticos

- Vasoconstrictores (adrenalina)
- Ác tranexámico
- Fibrinógeno-trombina

Fotocoagulación con láser
Electrocoagulación con plasma argón
Etc

