

# PROVA D'ESAME DI RICERCA OPERATIVA

(Prof. Fasano Giovanni)

Università Ca'Foscari Venezia - Sede di via Torino

29 gennaio 2019

**Regole per l'esame: la violazione delle seguenti regole comporta il ritiro dell'elaborato e l'allontanamento dello studente dall'aula**

- È necessario rispondere alle domande e risolvere gli esercizi usando **esclusivamente** i fogli distribuiti dal docente.
- Ogni risposta/calcolo deve essere opportunamente **motivata/o** dallo studente.
- È necessario **scrivere** Nome-Cognome-Matricola sul presente foglio e su **ciascun foglio** contenente le risposte dello studente (i fogli privi di tale informazione saranno cestinati e non considerati per la valutazione). In aggiunta, è necessario indicare (**SI/NO**) se il voto della Prova Intermedia (7 Novembre 2019) deve essere considerato dal docente.
- Il **tempo complessivo** per la prova è di
  - **1h 20'** : per gli studenti che hanno superato la Prova Intermedia;
  - **2h 00'** : per gli studenti che NON hanno superato la Prova Intermedia.
- È necessario **risolvere** gli esercizi e **rispondere** alle domande, secondo le seguenti modalità:
  - gli studenti che hanno superato la Prova Intermedia devono risolvere/rispondere **solo** gli/alle esercizi/domande con (**\*\*\***);
  - gli studenti che NON hanno superato la Prova Intermedia devono risolvere/rispondere **tutti** gli/le esercizi/domande;
- È **vietato** parlare durante la prova.
- È **vietato** usare durante la prova: testi, appunti, note, dispense, dispositivi cellulari, tablets, palmari, calcolatori/calcolatrici programmabili.
- Durante la prova **non è possibile** allontanarsi dall'aula.

Nome: . . . . .

Cognome: . . . . .

Matricola: . . . . .

Considerare la Prova Intermedia: ☐ SI ☐ NO

---

**Esercizio 1** (\*\*\*)

Dato il problema di Knapsack binario (dove  $a > 0$  e  $b > 0$ )

$$\begin{aligned} \min \quad & -3x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + 2x_5 + x_6 \\ & ax_1 - x_2 + ax_3 + ax_4 - ax_5 \leq 2b \\ & x \in \{0, 1\}^6. \end{aligned} \tag{L_0}$$

Determinare la relazione tra i parametri  $a$  e  $b$  in modo tale che il punto  $\bar{x} = (1, 1, 0, 1, 0, 0)^T$  sia una soluzione.

**SOLUZIONE:**

Trasformiamo prima il problema ( $L_0$ ) nel seguente problema

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 - x_6 \\ & ax_1 - x_2 + ax_3 + ax_4 - ax_5 \leq 2b \\ & x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, \dots, 6. \end{aligned}$$

Inoltre alcune variabili sono immediatamente assegnabili sulla base dei segni dei propri coefficienti, e si ha:  $x_2 = 1$ ,  $x_3 = 0$ ,  $x_5 = 1 - y_5$ ,  $x_6 = 0$ , ottenendo il problema equivalente

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + x_4 + 2y_5 - 1 \\ & ax_1 + ax_4 + ay_5 \leq 2b + a + 1 \\ & x_1, x_4, y_5 \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Riordinando i rapporti tra i coefficienti delle variabili nella funzione obiettivo ed i coefficienti delle stesse nel vincolo, si ottiene (essendo  $a > 0$ )

$$\frac{3}{a} \geq \frac{2}{a} \geq \frac{1}{a}$$

da cui il problema diventa

$$\begin{aligned} \max \quad & 3x_1 + 2y_5 + x_4 - 1 \\ & ax_1 + ay_5 + ax_4 \leq 2b + a + 1 \\ & x_1, x_4, y_5 \in \{0, 1\}. \end{aligned}$$

Sostituendo ora nel vincolo del problema sopra la soluzione  $\bar{x}$  proposta (per la quale risulta infatti  $x_1 = x_4 = y_5 = 1$ ), si ottiene la relazione

$$3a \leq 2b + a + 1 \quad \implies \quad 2(a - b) \leq 1$$

che è la relazione richiesta.

---

**Esercizio 2   (\*\*\*)**

Sia dato un problema di B&B. Si supponga che all'iterazione corrente la lista  $\mathcal{L}$  dei problemi aperti sia data da  $\mathcal{L} = \{(P1), (P2), (P3), (P4)\}$ . Inoltre sia il valore *ottimo corrente* della funzione obiettivo  $\tilde{z} = 10$ , corrispondente al punto  $\tilde{x}$ . È noto che per la soluzione *rilassata* del problema  $(Pi)$  si ha

	Valore funz. obiettivo di $Pi$ , nella soluz. rilassata $x_i$	soluzione rilassata $x_i$ di $Pi$
P1	$z_1 = 9$	$x_1$ intera
P2	$z_2 = 10$	$x_2$ intera
P3	$z_3 = 11$	$x_3$ frazionaria
P4	$z_4 = 12$	$x_4$ intera

Qualora all'iterazione corrente venga estratto il problema  $(Pi)$  da  $\mathcal{L}$ , si dica come gestirne correttamente la soluzione, per il progresso dell'algoritmo di B&B.

**SOLUZIONE:**

Nello schema del B&B possono presentarsi due scenari: il problema è di *minimo* oppure di *massimo*. Trattiamo separatamente i due casi, estraendo uno per volta dalla lista i quattro problemi:

**MINIMO:**

- P1  $\rightarrow$  il problema P1 va chiuso ed aggiornata la soluzione corrente, i.e.  $\tilde{z} \leftarrow z_1, \tilde{x} \leftarrow x_1$ ;
- P2  $\rightarrow$  il problema P2 va chiuso ma senza aggiornare la soluzione corrente  $\tilde{z}, \tilde{x}$ ;
- P3  $\rightarrow$  il problema P3 va chiuso ma senza aggiornare la soluzione corrente  $\tilde{z}, \tilde{x}$ ;
- P4  $\rightarrow$  il problema P4 va chiuso ma senza aggiornare la soluzione corrente  $\tilde{z}, \tilde{x}$ ;

**MASSIMO:**

- P1  $\rightarrow$  il problema P1 va chiuso ma senza aggiornare la soluzione corrente  $\tilde{z}, \tilde{x}$ ;
- P2  $\rightarrow$  il problema P2 va chiuso ma senza aggiornare la soluzione corrente  $\tilde{z}, \tilde{x}$ ;
- P3  $\rightarrow$  il problema P3 va chiuso effettuando un branching ma senza aggiornare la soluzione corrente  $\tilde{z}, \tilde{x}$ ;
- P4  $\rightarrow$  il problema P4 va chiuso aggiornando la soluzione corrente, i.e.  $\tilde{z} \leftarrow z_4, \tilde{x} \leftarrow x_4$ .

---

### Esercizio 3 (\*\*\*)

È necessario assegnare 200 job a 6 processori  $(p_1, \dots, p_6)$  diversi, per gestire la centralina di un satellite artificiale. I primi 100 job vanno assegnati ai processori  $p_1, p_2$  e  $p_3$ , mentre i rimanenti job devono essere assegnati a  $p_3, p_4, p_5$  e  $p_6$ . Le regole di assegnazione dei job prevedono che:

- ad ogni processore devono essere assegnati da 10 a 50 job;
- ogni job deve essere assegnato ad uno ed uno soltanto dei processori;
- il numero di job assegnati al processore  $p_i$  ( $i = 1, 2$ ) deve essere *non inferiore* al numero di job assegnati al processore  $p_{i+1}$ ;
- se viene assegnato il job 150 al processore  $p_4$ , allora al medesimo processore *non si può* assegnare anche il job 151;
- se al processore  $p_6$  vengono assegnati almeno 20 job, allora va considerato un costo aggiuntivo pari a 500\$.

Descrivere un modello di PL/PLI, per l'assegnazione dei job ai processori, considerando un costo unitario (i.e. 1 \$) per l'assegnazione di ciascun job a ciascun processore.

#### SOLUZIONE:

**Scelta variabili:**

$$x_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se il job } i\text{-simo viene assegnato al processore } p_j, \quad j = 1, 2, 3, 4 \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$
$$y_6 = \begin{cases} 1 & \text{se al processore } p_6 \text{ vengono assegnati almeno 20 job} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

**Funzione obiettivo:**

$$\min \sum_{i=1}^{200} \sum_{j=1}^6 x_{ij} + 500y_6$$

**Vincoli:**

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^6 x_{ij} &= 1, & i &= 1, \dots, 200, \\ x_{ij} &= 0, & i &= 1, \dots, 100, & j &= 4, 5, 6, \\ x_{ij} &= 0, & i &= 101, \dots, 200, & j &= 1, 2, \\ 10 &\leq \sum_{i=1}^{200} x_{ij} \leq 50, & j &= 1, \dots, 6 \\ \sum_{i=1}^{200} x_{i1} &\leq \sum_{i=1}^{200} x_{i2}, \\ \sum_{i=1}^{200} x_{i2} &\leq \sum_{i=1}^{200} x_{i3}, \\ x_{150,4} + x_{151,4} &\leq 1, \\ y_6 &\geq \frac{\sum_{i=1}^{200} x_{i6} - 19}{M}, & M &\gg 1 \end{aligned}$$

---

**Esercizio 4**

Dato il poliedro

$$\mathcal{P} : \begin{cases} x - y + 2z \leq 1 \\ y - az \geq 2 \\ x + az \geq -1 \\ 2y + z \leq 0, \end{cases}$$

determinare il parametro  $a$  in modo tale che il poliedro ammetta *almeno due* vertici.

**SOLUZIONE:**

Il poliedro contiene al massimo un numero di vertici pari a

$$\frac{4!}{3!(4-3)!} = 4.$$

Selezionando i primi tre vincoli (ignorando momentaneamente il IV vincolo) ed imponendo vincoli di uguaglianza si ha

$$\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ y - az = 2 \\ x + az = -1 \end{cases}$$

da cui (imponendo  $a \neq 1$ )

$$x = \frac{-1-a}{1-a}, \quad y = \frac{2}{1-a}, \quad z = \frac{2}{1-a}, \quad (1)$$

che soddisfa anche il IV vincolo, purchè risulti  $a > 1$ . Affinchè il punto trovato sia anche vertice deve soddisfare la relazione

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -a \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} = 2(a-1) \neq 0.$$

Pertanto, per  $a > 1$  il punto (1) risulta essere un vertice di  $P$ .

Con analogo ragionamento, selezionando i vincoli del poliedro con l'esclusione del III vincolo, e passando alle uguaglianze, si ha

$$\begin{cases} x - y + 2z = 1 \\ y - az = 2 \\ 2y + z = 0 \end{cases}$$

da cui (imponendo  $a \neq -1/2$ )

$$x = \frac{11+2a}{1+2a}, \quad y = \frac{2}{1+2a}, \quad z = -\frac{4}{1+2a}, \quad (2)$$


che soddisfa anche il III vincolo, purchè risulti  $a > -1/2$ . Affinchè il punto trovato sia anche vertice deve soddisfare la relazione

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -a \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1+2a \neq 0.$$

Pertanto, per  $a > -1/2$  il punto (2) risulta essere un vertice di  $P$ . Infine, per  $a > 1$  entrambi i punti in (1) e (2) risulteranno vertici del poliedro.

## Esercizio 5

Dato il seguente grafo: verificare se il vettore di flusso è ammissibile, calcolare il massimo valore del flusso per il nodo 's', ed indicare un taglio a capacità minima del grafo.



### SOLUZIONE:

Dopo una facile verifica si nota che per ciascun nodo il flusso entrante coincide con quello escente. Inoltre i vincoli sulla capacità di ciascun arco sono soddisfatti, pertanto deduciamo che il vettore di flusso assegnato è ammissibile.

Il valore del flusso iniziale è

$$f_0 = 5.$$

È possibile considerare i seguenti cammini aumentanti ed i relativi valori del flusso corrispondenti:

- $P_1 = \{s, a, b, t\}$ , con  $\delta^+ = 2$ ,  $\delta^- = +\infty$  e  $\delta = \min\{\delta^+, \delta^-\} = 2$ , da cui  $f_1 = f_0 + \delta = 7$
- $P_2 = \{s, f, t\}$ , con  $\delta^+ = 5$ ,  $\delta^- = +\infty$  e  $\delta = \min\{\delta^+, \delta^-\} = 5$ , da cui  $f_2 = f_1 + \delta = 12$
- $P_3 = \{s, d, c, e, t\}$ , con  $\delta^+ = 2$ ,  $\delta^- = +\infty$  e  $\delta = \min\{\delta^+, \delta^-\} = 2$ , da cui  $f_3 = f_1 + \delta = 14$
- $P_4 = \{s, d, b, t\}$ , con  $\delta^+ = 3$ ,  $\delta^- = 6$  e  $\delta = \min\{\delta^+, \delta^-\} = 3$ , da cui  $f_4 = f_3 + \delta = 17$
- $P_5 = \{s, a, d, f, t\}$ , con  $\delta^+ = 2$ ,  $\delta^- = 2$  e  $\delta = \min\{\delta^+, \delta^-\} = 2$ , da cui  $f_5 = f_4 + \delta = 19$ .

Inoltre un taglio a capacità minima è dato dal seguente:

$$W = \{s\}, \quad \bar{W} = \{a, b, c, d, e, f, t\},$$

che dopo un facile controllo soddisfa infatti la condizione

$$F(W, \bar{W}) = C(W, \bar{W}).$$

---

**Domanda Scritta 1    (\*\*\*)**

Si enuncino i rudimenti della Teoria della Dualità per problemi di Programmazione Lineare.

---

**Domanda Scritta 2    (\*\*\*)**

Data la matrice  $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$  ed il poliedro  $P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax \geq b\}$ , lo si trasformi esplicitamente in *forma standard*.

---

**Domanda Scritta 3**

Dato il problema  $\min_{x \in C} f(x)$ , con  $C \subseteq \mathbb{R}^n$  convesso ed  $f(x)$  convessa su  $C$ , dimostrare che ogni suo minimo locale è anche un minimo globale.