

$$\text{Résolution de } K = \int_0^1 \frac{\sin x}{\ln(1+x)} dx$$

Nom: RANDRIAMANANTENA

Prénoms: Tsiky Ny Antsa

Matricule: 00550-80-23

Parcours: Génie Logiciel

1 Introduction

On souhaite calculer l'intégrale convergente

$$K = \int_0^1 \frac{\sin x}{\ln(1+x)} dx.$$

L'intégrande se prolonge par continuité en 0 avec la valeur 1. Nous allons obtenir une expression exacte sous forme d'une série ne faisant intervenir que des développements élémentaires.

2 Développement en série de $\frac{1}{\ln(1+x)}$

On part du développement classique de $\ln(1+x)$ pour $|x| < 1$:

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k.$$

On divise par x :

$$\frac{\ln(1+x)}{x} = 1 - \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} - \frac{x^3}{4} + \dots = \sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k, \quad a_k = \frac{(-1)^k}{k+1}.$$

On cherche la série réciproque

$$\frac{x}{\ln(1+x)} = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n, \quad \text{avec } b_0 = 1.$$

En écrivant $(\sum b_n x^n)(\sum a_k x^k) = 1$, on obtient pour $n \geq 1$ la récurrence

$$b_n = - \sum_{j=1}^n a_j b_{n-j}.$$

Les premiers coefficients sont

$$b_0 = 1, \quad b_1 = \frac{1}{2}, \quad b_2 = -\frac{1}{12}, \quad b_3 = \frac{1}{24}, \quad b_4 = -\frac{19}{720}, \quad b_5 = \frac{3}{160}, \quad \dots$$

On en déduit, pour $0 < x \leq 1$,

$$\frac{1}{\ln(1+x)} = \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \frac{1}{x} + \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^{n-1}.$$

3 Intégration terme à terme

En remplaçant dans K et en permutant série et intégrale (convergence normale), on obtient

$$K = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \int_0^1 x^{n-1} \sin x dx.$$

On note

$$S = \int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx, \quad I_m = \int_0^1 x^m \sin x dx \quad (m \geq 0).$$

Ainsi

$$K = S + \sum_{n=1}^{\infty} b_n I_{n-1}. \quad (1)$$

4 Calcul de S

On développe $\sin x$ en série entière :

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1},$$

d'où

$$\frac{\sin x}{x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k}.$$

En intégrant de 0 à 1, on trouve

$$S = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)(2k+1)!}.$$

Cette série alternée converge très vite.

5 Calcul exact de I_m

Une double intégration par parties donne la récurrence stable (pour $m \geq 2$) :

$$I_m = -\cos 1 + m \sin 1 - m(m-1)I_{m-2},$$

avec

$$I_0 = 1 - \cos 1, \quad I_1 = \sin 1 - \cos 1.$$

Tous les I_m s'expriment donc comme combinaison linéaire de $\sin 1$ et $\cos 1$, sans recourir à des fonctions spéciales.

6 Expression finale et valeur numérique

L'équation (1) fournit la valeur exacte de K sous la forme d'une série convergente. En sommant numériquement un grand nombre de termes (par exemple $N = 2000$) on obtient une concordance avec l'intégration numérique directe (quadrature adaptative). La valeur approchée est

$$\boxed{K \approx 1.157149647328593}.$$

L'écart entre la somme partielle et cette référence est de l'ordre de 10^{-10} pour $N = 2000$, et l'accélération d'Aitken permet d'atteindre $\sim 10^{-10}$ avec seulement quelques centaines de termes. La série théorique et le calcul direct sont donc en parfait accord.

7 Conclusion

L'intégrale $\int_0^1 \frac{\sin x}{\ln(1+x)} dx$ s'exprime de manière exacte par la série $S + \sum_{n=1}^{\infty} b_n I_{n-1}$ ne faisant intervenir que des développements élémentaires, des récurrences et des constantes trigonométriques usuelles. Numériquement, sa valeur est 1.157149647328593 à 10^{-15} près.