

Содержание

I	Приложение функции нескольких переменных	2
1.	Касательные к пространственным прямым и касательные к поверхностям	2
2.	Экстремум функции нескольких переменных	6
3.	Условные экстремумы ФНП	12
4.	Отыскание \max и \min значений для ФНП	17
II	Обыкновенные дифференциальные уравнения и их системы	20
5.	Введение. Дифференциальные уравнения 1-го порядка	20
6.	ДУ в "дифференциалах". ДУ с разделяющимися переменными	25
7.	Однородные ДУ первого порядка	31
8.	Линейные дифференциальные уравнения. ДУ Бернулли	35
9.	ДУ в полных дифференциалах	40
10.	ДУ Клеро и Лагранжа	46
11.	Дифференциальные уравнения высшего порядка уравнения высшего порядка, допускающие понижения порядка	51
12.	Линейные ДУ n-го порядка	57
13.	Фундаментальная система решений ЛОДУ	60
14.	Общее решение линейного ДУ n-го порядка	66
15.	Метод вариации произвольных постоянных	69
16.	Лин. диф. ур-я n-го порядка с постоянными коэффициентами	74

17.Случай комплексных корней характеристического многочлена. Общий случай построения ФСР	80
18.Метод неопределённых коэф. для отыскания частного решения ЛОДУ n-го порядка с пост. коэф.	84
19.Системы обыкновенных ДУ	91
20.Система линейных ДУ	95
21.Система лин.диф. ур-й с пост. коэф.	98
 III Числовые ряды	 100
22.Основные определения	100
23.Признаки сходимости положительных рядов	105

Часть I

Приложение функции нескольких переменных

1. Касательные к пространственным прямым и касательные к поверхностям

Определение 1.1 (Касательная к пространственным кривым). Пусть L — гладкая пространственная кривая без особых точек или

$$L : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t \in U(t_0)$$

$$x(t), y(t), z(t) \in C'(U(t_0)) \quad (x'_t, y'_t, z'_t) \neq (0, 0, 0)$$

Геометрически выглядит следующим образом



Рис. 1.

Обозначим

$$M_0(x_0, y_0, z_0) \quad \text{при } t = t_0 \quad \Delta t \neq 0, \quad t = t_0 + \Delta t, \quad \Delta t \in U(t_0)$$

Тогда уравнение касательной

$$MM_0 : \frac{x - x_0}{x(t_0 + \Delta t) - x_0} = \frac{y - y_0}{y(t_0 + \Delta t) - y_0} = \frac{z - z_0}{z(t_0 + \Delta t) - z_0}$$

Равенство выше является каноническим. Если разделить элементы на Δt и рассмотреть $\Delta t \rightarrow 0$ то получим следующее

$$l_0 : \frac{x - x_0}{x'_0} = \frac{y - y_0}{y'_0} = \frac{z - z_0}{z'_0}$$

Так как

$$\frac{x(t_0 - \Delta t) - x(t_0)}{\Delta t} \rightarrow x'_t(t_0) = x'_0 \quad \Delta t \rightarrow 0$$

l_0 — касательная к кривой L в точке M_0

l_0 — прямая линия в пространстве $x_0'^2 + y_0'^2 + z_0'^2 \neq 0$

Определение 1.2 (Касательная плоскость к поверхности). .

Пусть $S : F(x, y, z) = 0$ — поверхность в пространстве.

$F(x, y, z)$ — непрерывная функ. в окрестности точки $M_0(x_0, y_0, z_0) \in S$

Плоскость $\pi : Ax + By + Cz + D = 0$, где $A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$ называется касательная плоскость к S в точке M_0 если

1) $M_0 \in \pi$

2) Любая кривая линия $L \subset S, M_0 \in L$ гладкой кривой с касательным вектором $\vec{\tau} \neq \vec{0}$ выполняется условие

$$\vec{n} \perp \vec{\tau}, \vec{n} = A, B, C \quad \Leftrightarrow \quad (\vec{n}, \vec{\tau}) = 0$$




Рис. 2.

Теорема 1.1 (О существовании касательной плоскости). Пусть

$$F(x, y, z) \in C'(U(M_0)), \quad F'_x{}^2(M_0) + F'_y{}^2(M_0) + F'_z{}^2(M_0) \neq 0$$

Тогда для поверхности $S : F(x, y, z) = 0$, $M_0(x_0, y_0, z_0) \in S$ существует касательная плоскость

$$\pi : F'_x(M_0)(X - x_0) + F'_y(M_0)(Y - y_0) + F'_z(M_0)(Z - z_0) = 0$$

Доказательство.

$$L : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases} \quad t \in U(t_0) \quad x(t), y(t), z(t) \in C'(U(t_0))$$

$$x_0 = x(t_0), y_0 = y(t_0), z_0 = z(t_0), \quad M_0(x_0, y_0, z_0) \in L$$

$$\vec{\tau} = x'_t(t_0), y'_t(t_0), z'_t(t_0)$$

$$\vec{n} = F'_x(M_0), F'_y(M_0), F'_z(M_0)$$

Докажем, что скалярное произведение равно нулю

$$L \subset S \Rightarrow \forall t \in U(t_0) \quad F(x(t), y(t), z(t)) = 0$$

Из дифференцируемости сложной функции получаем

$$(F(x(t), y(t), z(t)))'_t = F'_x x'_t + F'_y y'_t + F'_z z'_t$$

при $t = t_0$

$$F'_x(M_0) x'_t(t_0) + F'_y(M_0) y'_t(t_0) + F'_z(M_0) z'_t(t_0) = 0 \Rightarrow (\vec{n}, \vec{\tau}) = 0$$

$$\Rightarrow \pi : F'_x(M_0)(X - x_0) + F'_y(M_0)(Y - y_0) + F'_z(M_0)(Z - z_0) = 0$$

■

Определение 1.3 (Градиент). Градиент функции F в точке M_0 обозначается так

$$\{F'_x(M_0); F'_y(M_0); F'_z(M_0)\} = \text{grad } F|_{M_0}$$

Теорема 1.2 (Существование касательной плоскости). .

Рассматривается случай явно заданной поверхности

Пусть $f(x, y) \in C'(U(N_0))$, $N_0(x_0, y_0)$.

Тогда для явно заданной поверхности $S : z = f(x, y)$ существует касательная плоскость в точке $M_0(x_0, y_0, z_0)$, где $z_0 = f(N_0)$ вида

$$\pi : Z - z_0 = f'_x(N_0)(X - x_0) + f'_y(N_0)(Y - y_0)$$

Доказательство.

$$S : f(x, y) - z = 0, F = f(x, y) - z$$

$$F'_x = (f(x, y) - z)'_x = f'_x(N)$$

Аналогично для других производных

$$F'_y = f'_y(N); F'_z = -1;$$

Т.к. мы задали явную функцию F , то по теореме 1 получаем

$$\pi : f'_x(N_0)(X - x_0) + f'_y(N_0)(Y - y_0) + f'_z(N_0)(Z - z_0) = 0$$

$$\pi : f'_x(N_0)(X - x_0) + f'_y(N_0)(Y - y_0) - (Z - z_0) = 0, \text{ примечание } z_0 = f(x_0, y_0)$$

$$\pi : Z = f(x_0, y_0) + f'_x(N_0)(X - x_0) + f'_y(N_0)(Y - y_0)$$

■

Определение 1.4 (Нормаль к поверхности). Пусть $S : F(x, y, z) = 0$, $(x, y, z) \in U(M_0)$ гладкая поверхность. $M_0(x_0, y_0, z_0) \in S$.

Тогда нормаль n к поверхности S в точке M_0 называется прямая линия n , $M_0 \in n$, $n \perp \pi$, где π — касательная плоскость

Замечание 1.1. Если в условии определения $\nabla \text{grad } F|_{M_0} \neq \vec{0}$, то каноническое уравнение n

$$n : \frac{x - x_0}{F'_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F'_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F'_z(M_0)}$$

2. Экстремум функции нескольких переменных

Определение 2.1 (Экстремума ФНП). Пусть функция $u = f(M) = f(x_1, \dots, x_n)$ — является функцией n - переменных определённых в некоторой окрестности $U(M_0)$ и $M_0(x_1^0, \dots, x_n^0)$.

Тогда

- 1) M_0 — точкой (локального) минимума функции $f(M)$, если $\exists \delta > 0, \forall M \in U_\delta(M_0), f(M) \geq f(M_0)$
- 2) M_0 — точкой (локального) максимума функции $f(M)$, если $\exists \delta > 0, \forall M \in U_\delta(M_0), f(M) \leq f(M_0)$
- 3) M_0 — точкой (локального) экстремума $f(M)$, если $M_0 = \min f(M)$ или $M_0 = \max f(M)$

Определение 2.2 (Строгий экстремум функции нескольких переменных).

Пусть функция $u = f(M) = f(x_1, \dots, x_n)$ — является функцией n - переменных определённых в некоторой окрестности $U(M_0)$ и $M_0(x_1^0, \dots, x_n^0)$

Тогда

- 1) M_0 — точкой строгого минимума функции $f(M)$, если $\exists \delta > 0, \forall M \in \dot{U}(M_0), f(M) > f(M_0)$
- 2) M_0 — точкой строгого максимума функции $f(M)$, если $\exists \delta > 0, \forall M \in \dot{U}(M_0), f(M) < f(M_0)$
- 3) M_0 — точкой строгого экстремума функции $f(M)$, если соблюдается пункт 1 или 2

Теорема 2.1 (Необходимое условие локального экстремума). Пусть существует функция

$$u = f(M) = f(x_1, \dots, x_n), M \in U_0(M_0)$$

где $M_0(x_1^0, \dots, x_n^0)$ и $\exists f'_{x_1}, \dots, f'_{x_n}$

Тогда если M_0 — точка локального экстремума, то

$$f'_{x_1}(M_0) = 0, \dots, f'_{x_n}(M_0) = 0 \Leftrightarrow df(M_0) = 0$$

Доказательство. Пусть M_0 — минимум $f(M)$, т.е.

$$\exists \delta > 0, \forall M \in U_\delta(M_0), f(M) \geq f(M_0)$$

Рассмотрим частную производную от первого аргумента через предел. Для этого возьмём точку $M(x_1, x_2^0, \dots, x_n^0)$ в окрестности точки M_0 , тогда получаем

$$f'_{x_1}(M_0) = \lim_{x_1 \rightarrow x_1^0} \left(\frac{f(x_1, x_2^0, \dots, x_n^0) - f(x_1^0, \dots, x_n^0)}{x_1 - x_1^0} \right)$$

Так как M_0 — минимум $f(M)$, то

$$f(M) - f(M_0) \geq 0$$

Осталось рассмотреть два случая для знаменателя

1) если $x_1 > x_1^0$, то $f'_{x_1} \geq 0$

2) если $x_1 < x_1^0$, то $f'_{x_1} \leq 0$

Из всего этого следует, что

$$f'_{x_1}(M_0) = 0$$

Аналогично доказываются случаи для других производных ■

Лемма 2.1 (О сохранении знака непрерывной функции). Пусть

$$u = \varphi(M) = \varphi(x_1, \dots, x_n) \in C(U(M_0))$$

и

1) $\varphi(M_0) > 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 \forall M \in U_\delta(M_0) \varphi(M) > 0$

2) $\varphi(M_0) < 0 \Rightarrow \exists \delta > 0 \forall M \in U_\delta(M_0) \varphi(M) < 0$

Доказательство.

1) Логика доказательства аналогична первому семестру

$$\varphi(M_0) > 0$$

$$\varepsilon = \frac{\varphi(M_0)}{2} > 0 \exists \delta > 0 \forall M \in U_\delta(M_0) |\varphi(M) - \varphi(M_0)| < \varepsilon$$

Раскроем знак модуля

$$\varphi(M_0) - \frac{\varphi(M_0)}{2} < \varphi(M) < \varphi(M_0) + \frac{\varphi(M_0)}{2}$$

$$\Rightarrow \forall M \in U_\delta(M_0) \varphi(M) > \frac{\varphi(M_0)}{2} > 0$$

$$\Rightarrow \varphi(M) > 0$$

2) Аналогично доказательству выше

■

Лемма 2.2 (О свойстве коэффициентов в квадратичной форме).

Пусть $q(u, v) = Au^2 + 2Buv + Cv^2$ — некая квадратичная форма (аналог $q(u, v) = a_{uu}u^2 + a_{vv}v^2 + a_{uv}uv$). Тогда

- 1) $\forall (u, v) \neq (0; 0) \quad q(u, v) > 0 \Leftrightarrow A > 0, \quad AC - B^2 > 0$ — положительно определённая квадратичная форма
- 2) $\forall (u, v) \neq (0; 0) \quad q(u, v) < 0 \Leftrightarrow A < 0, \quad AC - B^2 > 0$ — отрицательно определённая квадратичная форма

Доказательство. Для доказательства воспользуемся критерием Сильвестра (2 семестр)

Распишем квадратичную форму для n переменных

$$q(u_1, \dots, u_n) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} u_i u_j, \quad a_{ij} = a_{ji}$$

Матрица для неё будет следующей

$$A_1 = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad A_1^T = A_1$$

По критерию Сильвестра для квадратичной формы справедливо

- 1) $q > 0 : \Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0$
- 2) $q < 0 : \Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0$

Если $n = 2$ то квадратичная форма имеет вид

$$A_1 = \begin{pmatrix} A & B \\ B & C \end{pmatrix} \quad \Delta_1 = A, \quad \Delta_2 = AC - B^2$$

Таким образом очевидно что если $q > 0$, то $A > 0, \quad AC - B^2 > 0$

Аналогично для $q < 0$ следует $A = \Delta_1 < 0, \quad AC - B^2 = \Delta_2 > 0$

■

Теорема 2.2 (Достаточное условие экстрема $f(x, y)$). Пусть функция $u = f(M) = f(x, y) \in C^2(U(M_0))$ и $df(M_0) = 0$.

Обозначим через $A = f''_{xx}(M_0)$, $B = f''_{xy}(M_0)$, $C = f''_{yy}(M_0)$, Тогда

- 1) $A > 0, AC - B^2 > 0$ (т.е. квадратичная форма положительна)
 $\Rightarrow M_0$ — точка строгого минимума функции
- 2) $A < 0, AC - B^2 > 0$ (т.е. квадратичная форма отрицательна)
 $\Rightarrow M_0$ — точка строгого максимума функции
- 3) $AC - B^2 < 0 \Rightarrow M_0$ — не экстремум функции

Доказательство. Воспользуемся формулой Тейлора для $k = 1$, тогда

$$\forall M \in U(M_0) \exists N \in [M_0, M], N \in U(M_0)$$

$$f(M) = f(M_0) + \frac{1}{1!} df(M_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(N), \text{ где } M(x, y), M_0(x_0, y_0)$$

$$\Delta x = x - x_0 = dx, \Delta y = y - y_0 = dy$$

Распишем чему равны производные в формуле

$$df(M_0) = f'_x(M_0) + f'_y(M_0) = 0 \text{ (по условию)}$$

$$d^2 f(N) = A_1 d^2 x + 2B_1 dx dy + C_1 d^2 y, \text{ где } A_1 = f''_{xx}(M_0), B_1 = f''_{xy}(M_0), C_1 = f''_{yy}(M_0)$$

Таким образом

- 1) а) Для удобства введём

$$\varphi_1(M) = f''_{xx}(M)$$

Т.к. $A = f''_{xx}(M_0) = \varphi_1(M_0) > 0$ по условию, то по лемме 1 получаем

$$\exists \delta_1 > 0 \forall N_1 \in U_{\delta_1}(M_0) \Rightarrow \varphi_1(N) > 0$$

- б) Для удобства введём

$$\varphi_2(M) = f''_{xx} f''_{yy} - f''_{xy}^2$$

Т.к. $AC - B^2 = \varphi_2(M_0) > 0$ по условию, то аналогично по лемме 1 получаем

$$\exists \delta_2 > 0 \forall N_2 \in U_{\delta_2}(M_0) \Rightarrow \varphi_2(N) > 0$$

Объединим пункты выше в один

$$\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} \forall N \in U_\delta(M_0) \varphi_1 > 0, \varphi_2 > 0$$

$$\Rightarrow M \in U_\delta(M_0) \Rightarrow N \in U_\delta(M_0), A_1 > 0, A_1 C_1 - B_1^2 > 0$$

Из строчки выше мы видим, что по лемме 2 в точке N квадратич-

ная форма будет положительна другими словами

$$d^2 f(N) > 0$$

Из формулы Тейлора и пункта выше следует

$$\forall M \in \mathring{U}_\delta(M_0) \quad f(M) - f(M_0) = \frac{1}{2!} d^2 f(N) > 0$$

Получаем

$$f(M) > f(M_0), \quad \forall M \in \mathring{U}_\delta(M_0) \Rightarrow M_0 - \text{точка минимума функции}$$

2) Доказывается аналогично

3) Так как квадратичная форма знакопеременная, то найдётся такая $\delta > 0$, в окрестности которой будет справедливо

$$(A_1 C_1 - B_1^2)(AC - B^2) > 0, \quad (AC - B^2) < 0 \Rightarrow A_1 C_1 - B_1^2 < 0 \Rightarrow B_1^2 - A_1 C_1 > 0$$

Помним, что

$$d^2 f(N) = A_1 d^2 x + 2B_1 dx dy + C_1 d^2 y$$

Так как $dy \neq 0$, то пусть $t = \frac{dx}{dy}$. Разделим равенство на $d^2 y$, получим

$$\frac{d^2 f(N)}{d^2 y} = A_1 t^2 + 2B_1 t + C_1 = [D = A_1 C_1 - B_1^2 > 0] = A_1(t - \theta_1)(t - \theta_2)$$

$$\frac{d^2 f(N)}{d^2 y} = A_1(t - \theta_1)(t - \theta_2)$$

$$d^2 f(N) = A_1(\Delta x - \theta_1 \Delta y)(\Delta x - \theta_2 \Delta y) \quad dx = \Delta x \quad dy = \Delta y$$

Из множителей можно выделить уравнения прямых и рассмотреть изменение знака у $d^2 f(N)$ (метод интервалов)



Рис. 3.

$$l_1 : (x - x_0) - \theta_1 (y - y_0) = 0$$

$$l_2 : (x - x_0) - \theta_2 (y - y_0) = 0$$

Таким образом мы видим

$$\begin{aligned}\forall \varepsilon < \delta, \varepsilon > 0 \quad & \exists M_1 \ d^2 f(N_1) > 0 \ f(M) > f(M_1) \\ & \exists M_2 \ d^2 f(N_2) > 0 \ f(M) < f(M_2)\end{aligned}$$

■

Теорема 2.3 (Достаточное условие экстремума функции n - переменных).

Пусть есть функция $u = f(M) = f(x_1, \dots, x_n) \in C^2(U(M_0))$ и $df(M_0) = 0$.

Обозначим $d^2 f(M_0) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} dx_i dx_j$, $a_{ij} = a_{ji}$

Тогда

- 1) $d^2 f(M_0) > 0 \Leftrightarrow \Delta_1 > 0, \dots, \Delta_n > 0 \Rightarrow M_0$ — точка строгого минимума функции
- 2) $d^2 f(M_0) < 0 \Leftrightarrow \Delta_1 < 0, \dots, \Delta_2 > 0, \dots, (-1)^n \Delta_n \Rightarrow M_0$ — точка строгого максимума функции
- 3) $d^2 f(M_0)$ неопределённая форма \Leftrightarrow в M_0 — нет экстремума функции

Доказательство. Аналогично доказательству предыдущей теоремы, воспользуемся формулой Тейлора

$$f(M) = f(M_0) + \frac{1}{1!} df(M_0) + \frac{1}{2!} d^2 f(N), \quad f(M) - f(M_0) = \frac{1}{2} d^2 f(N)$$

1)

$$\begin{aligned}\Delta_1(M_0) > 0, \dots, \Delta_n(M_0) > 0 \\ \Rightarrow \text{из критерия Сильвестра } \exists \delta > 0 \ \forall N \in U_\delta(M_0) \\ \Rightarrow \Delta_1(N) > 0, \dots, \Delta_n(N) > 0 \\ \Rightarrow d^2 f(N) > 0 \\ \Rightarrow f(M) > f(M_0), \ \forall M \in \dot{U}_\delta(M_0) \Rightarrow M_0 \text{ — точка минимума функции}\end{aligned}$$

2) Доказывается аналогично

3) Принимаем без доказательств

■

Замечание 2.1. Если квадратичная форма равна нулю, то требуются дополнительные исследования. Например взятие производной выше второй, рассмотрение точек в $\delta(M_0)$ окрестности

3. Условные экстремумы ФНП

Пример 3.1. Найти экстремум для функции $u = x^2 + y^2$, ограниченной поверхностью $S : x + y = 1$



Рис. 4.

Решение

$$y = 1 - x \Rightarrow u = x^2 + 1 + x^2 - 2x$$

$$u'_x = 4x - 2 = 0$$

$$u''_x = 4 > 0$$

$$\begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

точек нет

Таким образом $M_0(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ — экстремум (строгий минимум)

В следующем примере предыдущий алгоритм не работает.

Пример 3.2. Найти экстремум для функции $u = x$, ограниченной поверхностью $S : x^2 + y^2 = 1$



Рис. 5.

Если взять частную производную по x , то получим ($u'_x \neq 0$) что экстремум отсутствует, но по построению видно, что их два. Ошибка в том, что от "эллипса" мы перешли к "отрезку" путём взятия производной.

Чтобы избавиться от этого параметризуем x и y следующим образом

$$\begin{cases} x = \cos(t) \\ y = \sin(t) \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}, t \in [0; 2\pi]$$

Тогда получим

$$\begin{aligned} u &= \cos(t) \\ u'_t &= -\sin(t) \\ t_{\min} &= 0, t_{\max} = \pi, \text{ видно по построению} \\ u''_t &= -\cos(t) \end{aligned}$$

Таким образом, ключевым моментом является сохранение гладкости функции при взятии производных (т.е. если)

Замечание 3.1 (Условие связи. Условное). Условие связи это функция(и) $\varphi_n(M)$, которая(ые) применяется(ются) к функции $f(M)$, чтобы наложить ограничения (условия) на неё.

Определение 3.1 (Условный экстремум). Пусть $u = f(M) = f(x_1, \dots, x_n)$ определена в некоторой окрестности $U(M_0)$, $M(x_1^0, \dots, x_n^0)$ и выполнено условие связи $S : \varphi_1(M) = 0, \dots, \varphi_k(M) = 0$, $M_0 \in S$. Тогда

- 1) M_0 — точка локального условного минимума функции $f(M)$ при условии $M \in S \Leftrightarrow \exists \delta > 0 \forall M \in U_\delta(M_0) \cap S f(M) \geq f(M_0)$
- 2) M_0 — точка локального условного максимума функции $f(M)$ при условии $M \in S \Leftrightarrow \exists \delta > 0 \forall M \in U_\delta(M_0) \cap S f(M) \leq f(M_0)$
- 3) M_0 — точка условного экстремума функции $f(M) \Leftrightarrow M_0$ точка условного минимума или условного максимума

Аналогичны будут рассуждения для строгого условного экстремума (помним, что он рассматривается в проколотой окрестности).

Повторимся, что условный экстремум отличается от обычного тем, что поиск ограничен S

Определение 3.2 (Формула Лагранжа задачи на усл. экстремум).

Пусть $f(M), \varphi_1(M), \dots, \varphi_k(M)$ — функции n переменных x_1, \dots, x_n , определенных в $U(M_0)$. Тогда функция

$$L(M, \lambda) = f(M) + \lambda_1 \varphi_1(M) + \dots + \lambda_k \varphi_k(M)$$

называется функцией Лагранжа задачи на условный экстремум функции $f(M)$ при условии $M \in S : \varphi_1 = \dots = \varphi_k = 0$

Формула Лагранжа позволяет связать функцию и дополнительное условие воедино, что очень удобно.

Теорема 3.1 (Необходимый признак условного экстремума). Пусть

$$f(M), \varphi_1(M), \dots, \varphi_k(M) \in C^{-1}(U(M_0))$$

и M_0 — внутренняя точка гладкой части поверхности S

$$S : \varphi_1(M) = 0, \dots, \varphi_k(M) = 0, \quad M_0 \in S$$

Обозначим через

$$L(M, \lambda) = f(M) + \lambda_1 \varphi_1(M) + \dots + \lambda_k \varphi_k(M)$$

функцию Лагранжа задачи на условный экстремум функции $f(M)$, где $M \in S$. Тогда, если точка M_0 — условный экстремум функции $f(M)$, то существует $\lambda_0(\lambda_1^0, \dots, \lambda_k^0)$, для которой

$$dL(M_0, \lambda_0) = 0, \quad \text{где } M_0(x_1^0, \dots, x_n^0), \lambda_0(\lambda_1^0, \dots, \lambda_k^0)$$

Доказательство. Рассмотрим следующий случай: $n = 2, k = 1$ (размерность пространства и количество функций задающих поверхность), то есть $u = f(x, y), (x, y) \in U(M_0), M_0(x_0, y_0), M_0$ — точка условного экстремума $S : \varphi(x, y) = 0$

Так как $\varphi(x, y)$ — гладкая функция, то мы можем её параметризовать

$$S : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \in U(t_0)$$

Тогда

$$M_0(x, y) = M_0(x(t_0), y(t_0)), \quad x(t), y(t) \in C'(U(t_0))$$

И следовательно по условию

$$\forall t \in U(t_0) \quad \varphi(x(t), y(t)) = 0$$



Рис. 6. вместо z тут u

При этом $(x'(t_0), y'(t_0)) \neq (0, 0)$, то есть параметризация "хорошая" (Важность факта можно понять из примера 2).

Таким образом задача на условный экстремум переходит в задачу на обычный экстремум функции $u = f(x(t), y(t))$ (таким образом получили функцию от одной переменной).

По формуле частной производной

$$u'(t) = f'_x x'_t + f'_y y'_t$$

Аналогично для $\varphi'(t)$.

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} f'_x x'_t + f'_y y'_t = 0 \\ \varphi'_x x'_t + \varphi'_y y'_t = 0 \end{cases}$$

Так как M_0 - условный экстремум (по усл.), то t_0 - экстремум функции $u(t)$, значит $u'_t(t_0) = 0$, т.е. t_0 - решение первого уравнения системы. Причём мы имеем два решения: в t_0 и когда $x'_t, y'_t = 0$ (это справедливо, т.к. $(x'(t_0), y'(t_0)) \neq (0, 0)$)

Так как по условию $\varphi(t) = 0$, то и $\varphi'(t) = 0$ для любого t . Значит, второе уравнение справедливо всегда.

Получается по теореме Крамера следует

$$\begin{pmatrix} f'_x & f'_y \\ \varphi'_x & \varphi'_y \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \frac{f'_x(M_0)}{\varphi'_x(M_0)} = \frac{f'_y(M_0)}{\varphi'_y(M_0)} = -\lambda_0$$

Примечание. Если знаменатель равен нулю, то и числитель будет ему равен. Поэтому всё ОК

Таким образом из отношения можно получить следующую систему

$$\begin{cases} f'_x(M_0) + \lambda_0 \varphi'_x(M_0) = 0 \\ f'_y(M_0) + \lambda_0 \varphi'_y(M_0) = 0 \end{cases}$$

Добавим ещё одно уравнение из условия, получим

$$\begin{cases} f'_x(M_0) + \lambda_0 \varphi'_x(M_0) = 0 \\ f'_y(M_0) + \lambda_0 \varphi'_y(M_0) = 0 \\ \varphi(M_0) = 0 \end{cases}$$

Которая на самом деле ни что иное как

$$\begin{cases} L'_x(M_0, \lambda_0) = 0 \\ L'_y(M_0, \lambda_0) = 0 \\ L'_\lambda(M_0) = 0 \end{cases}$$

Если мы сложим все три равенства то получим производную функции Лагранжа, которая равна нулю

$$dL(M_0, \lambda_0) = 0$$

■

Теорема 3.2 (Необходимый признак усл. экстремума в общем случае).

Пусть

$$\begin{aligned} & \exists M(x_1, \dots, x_n), \exists M_0(x_1^0, \dots, x_n^0) \\ & f(M), \varphi_1(M), \dots, \varphi_k(M) \in C^2(U(M_0)) \\ & L(M, \lambda) = f(M) + \lambda_1 \varphi_1(M) + \dots + \lambda_k \varphi_k(M) \end{aligned}$$

и $\exists \lambda_0(\lambda_1^0, \dots, \lambda_k^0)$ для которой $dL(M_0, \lambda_0) = 0$ Рассмотрим

$$S : d\varphi_j(M_0) = 0 \quad j = 1, \dots, k$$

$$S' : \sum_{i=1}^n \frac{\delta \varphi_j}{\delta x_i} \quad j = 1, \dots, k$$

S' — система k линейных однородных уравнений относительно n неизвестных dx_1, \dots, dx_n размерность $m = n - r$, r — ранг матрицы поэтому dx_1, \dots, dx_n — независимые (свободные) переменные.

Второй дифференциал

$$d^2L = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \frac{\delta^2 L(M_0, \lambda_0)}{\delta x_i \delta x_j} dx_i dx_j = q(dx_1, \dots, dx_m)$$

Тогда

1) $q > 0 \Rightarrow M_0$ — точка строгого условного минимума функции

2) $q < 0 \Rightarrow M_0$ — точка строгого условного максимума функции

3) q — неопределённая форма \Rightarrow в M_0 нет экстремума

Доказательство. Принимаем без доказательств ■

Замечание 3.2. Условие $q > 0$ или $q < 0$ проверяется с помощью критерия Сильвестра. Данный факт используется для доказательства теоремы.

Замечание 3.3. По аналогии со вторым параграфом. Требуются дополнительные исследования, если второй дифференциал равен нулю.

Пример 3.3. Дано:

$$u = x^2 + y^2 + z^2 \quad S : xy + z = 2$$

Решение:

Поверхность S можно описать одной гладкой функцией (т.е. $\varphi = xy + z - 2$). Тогда получаем

$$L = x^2 + y^2 + z^2 + 2\lambda(xy + z - 2)$$

Найдём частные производные

$$\begin{aligned} L'_x = 2x - 2\lambda y = 0 \quad L'_y = 2y - 2\lambda x = 0 \quad L'_z = 2z - 2\lambda \\ L'_\lambda = xy + z - 2 = 0 \end{aligned}$$

Решаем систему и получаем следующие подозрительные точки

$M_0(0, 0, 2)$	$M_1(1, 1, 1)$	$M_2(-1, -1, 1)$
$\lambda_0 = 2$	$\lambda_1 = 1$	$\lambda_2 = -1$

Теперь требуется проверить точки на экстремумы. Найдём производные

$$\begin{aligned} L''_{xx} = 2 \quad L''_{xy} = -2\lambda \quad L''_{xz} = 0 \\ L''_{yy} = 2 \quad L''_{yz} = 0 \\ L''_{zz} = 2 \end{aligned}$$

Дважды продифференцируем функцию Лагранжа. Помним, что λ – коэффициент. В итоге получаем

$$d^2L = 2(dx)^2 + 2(dy)^2 + 2(dz)^2 - 4\lambda dx dy$$

Также $S' : y dx + x dy + dz = 0$

При подстановке M_0 и с помощью значений из S' получаем значение функции Лагранжа.

$$q_0 = 2(dx)^2 - 8 dx dy + 2(dy)^2$$

по критерию Сильвестра q_0 – знакопеременна. Значит в M_0 нет экстремума. При $M_{1,2}$

$$q_{1,2} = 4(dx)^2 + 4(dy)^2$$

видим, что $M_{1,2}$ – точка условного минимума

4. Отыскание max и min значений для ФНП

Пример 4.1. Найти экстремумы для функции $u = x^2 + y^2$ ограниченной поверхностью $D : |x| + 2|y| \leq 5$




Рис. 7.

Таким образом, мы имеем дело с компактом (огр. множеством).

1) $u'_x = 2x = 0, u'_y = 2y = 0$
 $M_0(0,0), u(M_0) = 0$ — минимум

2) Для удобства будем рассматривать первую четверть, так как компакт представляет собой ромб, который симметричен относительно осей (Замечание. Область определена через 4 дифференцируемые функции).

$$L_1 = x^2 + y^2 + \lambda(x + 2y - 5)$$

$$dL_1 = (2x + \lambda)dx + (2y + 2\lambda)dy + (x + 2y - 5)d\lambda = 0$$

$$\begin{cases} 2x + \lambda = 0, & x = -\frac{\lambda}{2} \\ 2y + 2\lambda = 0, & y = -\lambda \\ x + 2y = 5 \end{cases}$$

Подставим значения x и y в последнее уравнение, получим

$$\lambda = -2$$

следовательно экстремум в точке $M_1(1,2)$

Так как мы рассматриваем первую четверть, то в оставшихся трёх получим $M_2(-1,2), M_3(-1,-2), M_4(1,-2)$

Для данных точек значение функции

$$u(M_{1,2,3,4}) = 1 + 4 = 5$$

3) Так как функция компакта не является гладкой, то рассмотрим следующие точки:

$$\begin{array}{ll} N_1(5, 0), N_2(-5, 0) & N_3(0, \frac{5}{2}), N_4(0, -\frac{5}{2}) \\ u(N_{1,2}) = 25 & u(N_{3,4}) = \frac{25}{4} \end{array}$$

Таким образом $u_{max} = u(N_{1,2}) = 25$.

Окончательный ответ:

$$\forall (x, y) \in D, 0 \leq u(x, y) \leq 25$$

Замечание 4.1 (Как выглядит в общем случае). Пусть $u = f(x_1, \dots, x_n)$ определена в замкнутой односвязанной области $D : \varphi_1(M) \geq 0, \dots, \varphi_k(M) \geq 0$

1) $M \in \mathring{D} : \varphi_1(M) > 0, \dots, \varphi_k(M) > 0$
 Должно соблюдаться $f(M), \varphi_1(M), \dots, \varphi_k(M) \in C'(\mathring{D})$ — гладкая по каждой части границы
 Для $df(M) = 0 \exists M_1, \dots, M_l \in \mathring{D}$ — гладкая n -мерная часть

2) Гладкая $(n - 1)$ мерная часть границы D

$$\begin{array}{ll} L_1 = f + \lambda_1 \varphi_1 & , \dots, L_k = f + \lambda_k \varphi_k \\ dL_1 = 0 & dL_k = 0 \\ N_{11}, \dots, N_{1l_1} + \lambda & N_{11}, \dots, N_{1l_k} + \lambda \end{array}$$

$$\varphi_1(N_{11}) = 0, \varphi_2(N_{11}) > 0, \dots, \varphi_k(N_{11}) > 0$$

3) Гладкая $(n - 2)$ мерная часть границы D . Рассмотрим функции вида

$$L = f(M) + \lambda_i \varphi_i(M) + \lambda_j \varphi_j(M)$$

$$\begin{array}{ll} S : \varphi_i(M) = 0, & \varphi_j(M) = 0 \quad (i \neq j) \\ 1 \leq i \leq k & 1 \leq j \leq k \end{array}$$

Рассматриваем

$$dL(M, \lambda_i, \lambda_j) = 0$$

Получаем следующий набор точек K_1, \dots, K_s

...

$n + 1$) Рассматриваем θ -мерное гладкое пространство (вершины или "плохие" точки). Получим следующее множество: P_1, \dots, P_q

Таким образом, ответ:

$$U_{max} = \max\{u(M_1), \dots, u(P_q)\}$$
$$U_{min} = \min\{u(M_1), \dots, u(P_q)\}$$

Тут надо написать обобщающий алгоритм, т.е. что по факту для поиска экстремумов мы рассматриваем множества различных функций Лагранжа для различного количества границ.

Часть II

Обыкновенные дифференциальные уравнения и их системы

5. Введение. Дифференциальные уравнения 1-го порядка

Определение 5.1 (Дифференциальное уравнение). Уравнение вида $F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ называют обыкновенным дифференциальным уравнением n -го порядка. Решением называют функцию $y = y(x)$, которая n раз дифференцируема на интервале I :


$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

Определение 5.2 (ДУ разрешённое относительно старшей производной). Если дифференциальное уравнение имеет вид

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$$

то тогда его называют обыкновенным дифференциальным уравнением n -го порядка разрешённого относительно старшей производной

Пример 5.1 (моделный). Пусть $f(x) \in C'_{(a,b)}$, $y' = f(x)$ — дифференциальное уравнение n -го порядка, разрешённое относительно 1й производной.



Если $y = y(x)$ решение, то

$$y'(x) = f(x)$$

$$y = \int f(x)dx + C = \varphi(x) + C \quad x \in (a, b)$$

Если $y = \psi(x)$ решение ДУ, то

$$\exists C, \forall x \in (a, b) \quad \psi = \varphi(x) + C$$

Для любого (x_0, y_0) в полосе, т.е. для $x_0 \in (a, b)$ существует решение $y = \varphi(x) - \varphi(x_0) + y_0$, $(y_0 \in \mathbb{R})$

Таким образом мы видим, что для одного дифференциального уравнения существует множество решений. Для конкретизации задачи используют условие Коши.

Определение 5.3 (Задача Коши). Система вида

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases} \quad (\text{конкретизация первообразной})$$

Называется условием Коши, а задача о поиске решения это задача Коши




Рис. 8.

Теорема 5.1 (Существование и единственность решения задачи Коши).

Теорема для ДУ 1го порядка.

Пусть $f(x, y) \in C(U(M_0))$ и $\exists f'_y(M) \in C(U(M_0))$. Тогда существует такая $\delta > 0$ и существует решение $y' = y(x) \in U_\delta(M_0)$ задачи Коши с соответствующим условием $y' = f(x)$ $y(x_0) = y_0$ и такое решение в $U_\delta(x_0)$ единственно

Доказательство. Принимаем без доказательств ■

Определение 5.4 (Поле направлений ДУ). Пусть $y' = f(x, y)$, $f(x, y) \in C(D)$. $\forall M_0(x_0, y_0)$ — внутренняя точка области D . Запишем уравнение касательной к графику решения задачи Коши

$$l_0 : Y - y_0 = f(x_0, y_0)(X - x_0)$$

где $f(x_0, y_0) = k$ — угловой коэффициент прямой. А задача Коши

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

Пусть $\vec{\tau}$ — единичный вектор касательной. Тогда множество $\{\vec{\tau}\}$ — поле направлений




Рис. 9. Поле направлений

Вместе с понятием поля направлений вводят (для удобства) такую вещь как изоклины, т.е. линии, вдоль которых поле имеет одно и тоже направление. Задаётся уравнением $f(x, y) = C$

Тут важно заметить, что понятие поля направлений очень сильно связано с физикой, так как с помощью них можно легко описывать физические поля (электрическое, магнитное).


С помощью полей направлений доказывается теорема о единственности задачи Коши

Пример 5.2. Дано:

$$y' = \frac{y}{x}$$

Требуется построить поле направлений.

Решение.



Изоклины для данного ДУ задаются уравнением

$$\frac{y}{x} = C$$

Получается, изоклины представляют собой прямые, проходящие через начало координат. Уравнение изоклин $y = Cx$. Если подставлять пары (x, y) , то мы заметим, что вектора поля направлений совпадают с изоклинами.

Таким образом поле направлений состоит из множества прямых, проходящих через начало отсчёта (Точка $(0, 0)$ выколота).

Пример 5.3. Дано

$$y' = -\frac{x}{y}$$

Требуется построить поле направлений.

Решение.

Изоклины для данного ДУ задаются уравнением

$$-\frac{x}{y} = C$$

Аналогично примеру выше, видим что изоклины проходят через начало координат.

Рассмотрим несколько изоклин.

- 1) $C = -1$, тогда $y = x$. Прямая в первой и третьей четверти. Для неё значение углового коэффициента $k = -1$. Следовательно угол равен $\frac{3\pi}{4}$ для первой четверти
- 2) Рассмотрим $C \in (-\infty; -1)$, тогда нетрудно заметить, что угол φ соответственно изменялся для первой четверти от $\frac{\pi}{2}$ до $\frac{3\pi}{4}$ (оба не включительно).
- 3) Рассмотрим $C \in (-1; 0)$. Тогда угол φ соответственно изменялся для первой четверти от $\frac{3\pi}{4}$ до π .




Рис. 10. Иллюстрация примера

Определение 5.5 (Общее решение). Пусть $y' = f(x, y)$ — ДУ первого порядка. Функция $y = \varphi(x, C)$ называется общим решением этого ДУ если:

- 1) $\forall C \in \mathbb{R}$ y как функция от x является решением ДУ
- 2) Для любого решения $y = y^*(x)$, $\exists C^* \in \mathbb{R}$, $y^*(x) \equiv \varphi(x, C^*)$

Замечание 5.1. Уравнение $\Phi(x, y, C) = 0$ — называется общим интегралом ДУ. $y' = f(x, y)$ если:

- 1) всякая неявная функция $y = y(x, C)$ при фиксированном C является решением ДУ
- 2) всякое решение задаётся неявной функцией $y = y(x, C^*)$ для некоторого C^*

Пример 5.4. Для $y' = \frac{y}{x}$ очевидно из рисунка, что общее решение

$$y = Cx$$

Пример 5.5. Для $y' = -\frac{x}{y}$ очевидно из рисунка, что общий интеграл

$$x^2 + y^2 = C^2$$

Общее решение отсутствует

Точка особая, если нарушается существование и единственность задачи Коши

Замечание 5.2. $y = \varphi(x, C)$ — «общее» решение, $y = \hat{y}(x)$ — особое решение по отношению к общему решению.

Замечание 5.3. Дано $y' = f(x)$, тогда

$$y = \int f(x)dx + C$$

Решение ДУ «в квадратурах».

Важно заметить, что интегралов может быть несколько. Например,

$$y^{(n)} = f(x)$$

интегрируется в квадратурах, через последовательное интегрирование. Другим примером является сумма интегралов.

6. ДУ в "дифференциалах". ДУ с разделяющимися переменными

Определение 6.1. Пусть $M(x, y), N(x, y) \in C(D)$. Тогда уравнение вида

$$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$$

называется ДУ в "дифференциалах" при этом

1) Решение этого ДУ - дифференциальные уравнения $y = y(x), x \in I$, где I - отрезок, причём
 $\forall x \in I \quad M(x, y(x)) + N(x, y(x))y'(x) = 0$

2) кривая линия $L : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \in I$ — называется интегральной кривой для данного ДУ
 \Leftrightarrow
 L - гладкая кривая и $\forall t \in I, \quad M(x(t), y(t))x'_t + N(x(t), y(t))y'_t = 0$
 $dx = x'_t dt, \quad dy(t) = y'_t dt$

К чему замечание и два примера?

Замечание 6.1.

$$\begin{aligned} y' = f(x, y) &\Leftrightarrow f(x, y)dx - dy = 0 \\ &Mdx + Ndy = 0 \mid \div dx \\ &M + Ny' = 0 \\ &y' = -\frac{M}{N} \end{aligned}$$

Пример 6.1. Дано

$$y' = \frac{y}{x}$$

Тогда уравнение в «дифференциалах»

$$y dx - x dy = 0$$

Только одна особая точка. Если $x = 0$, то интегральная кривая

Пример 6.2. Дано

$$y' = -\frac{x}{y}$$

Тогда уравнение в «дифференциалах»

$$y dy + x dx = 0$$

Интегральные кривые — замкнутые окружности

Определение 6.2. ДУ вида $f(x)dx = g(y)dy$ — называется ДУ с разделёнными переменными

$$f(x) \in C(I), g(y) \in C(J), \text{ где } I, J \text{ — интервалы}$$

Теорема 6.1 (Общий интеграл ДУ с разделяющимися переменными).

В условиях определения выше пусть $F(x)$ первообразная к $f(x)$ на I , а $G(y)$ для $g(y)$ на J

Тогда $F(x) = G(y) + C$ является общим интегралом ДУ $f(x)dx = g(y)dy$

Замечание 6.2. В данной теореме мы просто говорим о взаимной связи первообразных с производными

Доказательство. По условию:

$$L : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \in (\alpha; \beta)$$

Т.е. дана интегральная кривая ДУ $f(x)dx = g(y)dy \Leftrightarrow \exists C \in \mathbb{R} \ F(x(t)) = G(y(t)) + C$

\Rightarrow Рассмотрим $f(x(t)) x'_t = g(y(t)) y'_t$. Тогда

$$\begin{aligned} f(x(t)) x'_t &= g(y(t)) y'_t \\ (F(x(t)))'_t &= (G(y(t)))'_t \quad [\text{Зам. } (F(x(t)))' = f(x(t))x'_t] \\ (F(x(t)) - G(y(t)))'_t &= 0 \end{aligned}$$

Так как производная равна нулю, то при взятии первообразных справа будет константа, получаем

$$\exists C \equiv \text{const} \quad t \in (\alpha; \beta), \quad F(x(t)) = G(y(t)) + C$$

\Leftarrow Если $\forall t \in (\alpha; \beta) \ F(x(t)) = G(y(t)) + C$ то

$$\begin{aligned} [F(x(t))]'_t &= [G(y(t))]'_t + [C]'_t \\ f(x(t)) x'_t &= g(y(t)) y'_t \end{aligned}$$

Таким образом L — интегральная кривая ДУ $f(x) dx = g(y) dy$

■

Замечание 6.3. Решение в "квадратурах":

$$\int f(x) dx = \int g(y) dy + C$$

Пример 6.3. Дано $y dx - x dy = 0$. Решить ДУ.

$$y dx - x dy = 0$$

$$\frac{dx}{x} = \frac{dy}{y}$$

$$\int \frac{dx}{x} = \int \frac{dy}{y}$$

$$\ln(|x|) = \ln(|y|) - \ln(C_1), \text{ где } C = \ln(C_1)$$

$$\text{Ответ: } y = C_1 x$$

Пример 6.4. Дано

$$x dx - y dy = 0$$

Требуется решить ДУ.

Решение

$$x dx - y dy = 0$$

$$\int x dx = - \int y dy$$

Для удобства возьмём константу $\frac{C^2}{2}$

$$\frac{x^2}{2} = -\frac{y^2}{2} + \frac{C^2}{2}$$

$$x^2 + y^2 = C^2$$

$$\text{Ответ: } x^2 + y^2 = C^2$$

Определение 6.3. ДУ вида

$$y' = f(x)g(y), \quad f(x), g(y) \in C$$

называется ДУ с разделяющимися переменными

Замечание 6.4. Общий интеграл ДУ с разделяющимися переменными $y \mapsto \frac{dy}{dx}$, умножим на dx , получим

$$dy = f(x) g(y) dx$$

$$\frac{dy}{g(y)} = f(x) dx$$

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x) dx + C$$

Таким образом, получили общий интеграл.

Замечание. Было деление на $g(y)$.

Пример 6.5. Дано

$$y' = \frac{y}{x}$$

Решение

$$\begin{aligned}y' &= \frac{y}{x} \\ \frac{dy}{dx} &= \frac{y}{x} \\ \frac{dy}{y} &= \frac{dx}{x} \\ \int \frac{dy}{y} &= \int \frac{dx}{x} \\ \ln|y| &= \ln|x| + \ln|C| \\ y &= Cx\end{aligned}$$

Пример 6.6. Дано

$$y' = -\frac{x}{y}$$

Решение

$$\begin{aligned}y' &= -\frac{x}{y} \\ \frac{dy}{dx} &= -\frac{x}{y} \\ y \, dy &= -x \, dx \\ \int y \, dy &= -\int x \, dx \\ \frac{y^2}{2} &= -\frac{x^2}{2} + \frac{C^2}{2} \\ y^2 + x^2 &= C^2\end{aligned}$$

Определение 6.4. ДУ 1го порядка приводящееся к ДУ с разделяющимися переменными

$$y' = f(ax + by + c)$$

где $a, b \neq 0$, $f(z) \in C(I)$

Замечание 6.5. Введём

$$z = a x + b y + C, \quad z = z(x)$$

Тогда

$$z' = a + b y' = a + b f(x)$$

$$\frac{dz}{dx} = a + b f(x)$$

$$dx = \frac{dz}{a + b f(x)}$$

$$x + C = \int \frac{dz}{a + b f(x)}$$

Получаем систему

$$\begin{cases} x + C = \int \frac{dz}{a + b f(x)} \\ z = a x + b y + C \end{cases}$$

Отдельно требуется рассмотреть случай $a + b f(z) = 0$

Пример 6.7. Дано

$$y' = \cos(x - y)$$

Решение.

$$z = x - y$$

$$z' = 1 - y'$$

$$z' = 1 - \cos(z)$$

Получили ДУ с разделяющимися переменными. Решаем

$$\frac{dz}{1 - \cos(z)} = dx$$

$$\int \frac{dz}{1 - \cos(z)} = \int dx$$

$$\int \frac{dz}{2 \sin^2\left(\frac{z}{2}\right)} = x + C$$

$$\operatorname{ctg}\left(\frac{z}{2}\right) = x + C$$

$$\begin{aligned}
z &= 2 \operatorname{arctg}(-x - C) + 2\pi k & k \in \mathbb{N} \\
x - y &= 2 \operatorname{arctg}(-x - C) + 2\pi k & k \in \mathbb{N} \\
y &= x - 2 \operatorname{arctg}(-x - C) - 2\pi k & k \in \mathbb{N}
\end{aligned}$$

Не забываем, что мы делили. Следовательно, требуется рассмотреть частный случай. $1 - \cos(z) = 0$

$$\begin{aligned}
1 - \cos(z) &= 0 \\
\cos(x - y) &= 1 \\
x - y &= -2\pi k & k \in \mathbb{N} \\
y &= x + 2\pi k & k \in \mathbb{N}
\end{aligned}$$

Проверим является ли значение выше упущенным решением.

$$\begin{aligned}
y' &= 1 & (\text{производная взята из равенства выше}) \\
\cos(x - y) &= \cos(-2\pi k) = 1 & (\text{подстановка в условие})
\end{aligned}$$

Левая и правая части условия равны, следовательно $y = x + 2\pi k$ входит в множество решений.

Множество решений выглядит следующим образом




Рис. 11.

7. Однородные ДУ первого порядка

Определение 7.1. Пусть функция $f(t)$ определена и непрерывна на некотором интервале и $f(t) \not\equiv t$. Тогда ДУ

$$y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

называются однородными ДУ первого порядка.

Замечание 7.1. $F(x_1, \dots, x_n)$ называются однородными функциями веса k , если

$$\forall t \in \mathbb{R} \quad F(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^k F(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

Пример. $f\left(\frac{y}{x}\right) = f\left(\frac{y}{x}\right)$ — однородное ДУ веса $k = 0$

Замечание 7.2 (Как решить однородное ДУ). Дано

$$y' = f\left(\frac{x}{y}\right)$$

Введём

$$t(x) = t = \frac{y}{x}$$

Тогда

$$y = tx, \quad y' = t'x + x = f(t)$$

Таким образом получаем ДУ с разделяющимися переменными

$$t' = \frac{f(t) - t}{x}$$

Решаем

$$\frac{dt}{dx} = \frac{f(t) - t}{x}$$

Так как мы будем делить на $f(t) - t$, то потребуются рассмотреть два случая

$$1) f(t) - t \neq 0$$

$$2) f(t) - t = 0$$

$$\int \frac{dt}{f(t) - t} = \int \frac{dx}{x}$$

$$\exists \alpha \in \mathbb{R} \quad f(\alpha) = \alpha, \quad y = \alpha x$$

$$\ln(|x|) = \int \frac{dt}{f(t) - t} + \ln(C) \quad y' = \alpha = f(\alpha) = f\left(\frac{x}{y}\right)$$

$$\begin{cases} x = Ce^{\int \frac{dt}{f(t)-t}} \\ y = tx \end{cases}$$

Пример 7.1. Дано

$$y' = \frac{x y + y^2}{x^2}$$

Решение.

$$y' = \frac{x y + y^2}{x^2} = \frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2$$

Делаем замену

$$t = \frac{y}{x}, \quad y = t x$$

$$dy = x dt + t dx \quad \Rightarrow \quad \frac{dy}{dx} = y' = \frac{x dt}{dx} + t = t' x + t$$

Подставляем и получаем

$$t' x + t = t + t^2$$

$$\frac{dt}{t^2} = \frac{dx}{x}$$

$$-\frac{1}{t} = \ln|x| - \ln(C) = -\frac{x}{y}$$

$$\frac{x}{y} = \ln\left(\frac{C}{x}\right) \quad C \neq 0$$

$$y = \frac{x}{\ln\left(\frac{C}{x}\right)} \quad C \neq 0$$

Правильно найден случай?

Также требуется рассмотреть частный случай, когда $t = 0$, тогда $y = 0$

Замечание 7.3. Дано:

$$y' = f\left(\frac{a_1 x + b_1 y + c_1}{a_2 x + b_2 y + c_2}\right)$$

где

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0, \quad c_1^2 + c_2^2 \neq 0$$

Вопрос. Как превести эту дробь к однородному ДУ 1-го порядка? $f\left(\frac{y}{x}\right)$

Ответ:

$$\begin{cases} a_1 x + b_1 y + c_1 = 0 \\ a_2 x + b_2 y + c_2 = 0 \end{cases} \quad \Delta = \begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix} \neq 0$$

Тогда по теореме Крамера получим, что существует единственное решение $(\alpha; \beta)$ этой системы линейных алгебраических уравнений.

Сделаем замену

$$\begin{cases} x = x_1 + \alpha \\ y = y_1 + \beta \end{cases}$$

Получим

$$\begin{aligned} a_1 x + b_1 y + c_1 &= a_1(x_1 + \alpha) + b_1(y_1 + \beta) + c_1 = \\ &= a_1 x_1 + b_1 y_1 + \underbrace{a_1 \alpha + b_1 \beta + c_1}_{0 \text{ (как корни ур-я)}} = \\ &= a_1 x_1 + b_1 y_1 \end{aligned}$$

Помимо этого, если взять дифференциалы от заменённых функций, получим

$$\begin{cases} dx = dx_1 \\ dy = dy_1 \end{cases}$$

Таким образом мы можем перейти к отношению линейных функций. Из первоначального уравнения получаем.

$$\begin{aligned} y' = \frac{dy}{dx} = \frac{dy_1}{dx_1} &= f\left(\frac{a_1 x + b_1 y + c_1}{a_2 x + b_2 y + c_2}\right) = f\left(\frac{a_1 x_1 + b_1 y_1}{a_2 x_1 + b_2 y_1}\right) = \\ &= f\left(\frac{a_1 + b_1 \frac{y_1}{x_1}}{a_2 + b_2 \frac{y_1}{x_1}}\right) = g\left(\frac{y_1}{x_1}\right) \end{aligned}$$

Таким образом

$$\frac{dy_1}{dx_1} = g\left(\frac{y_1}{x_1}\right)$$

получили однородное ДУ 1-го порядка, где

$$\begin{cases} x_1 = x - \alpha \\ y_1 = y - \beta \end{cases}$$

Пример 7.2. Дано

$$y' = \frac{x + y + 1}{x - y}$$

Решение.

1) Найдём коэффициенты α и β . Для этого рассмотрим систему.

$$\begin{cases} \alpha + \beta + 1 = 0 \\ \alpha - \beta = 0 \end{cases} \quad \text{Получаем } \alpha = \beta = -\frac{1}{2}$$

2) Зная α и β Делаем замену x и y на

$$x = x_1 - \frac{1}{2}y = y_1 - \frac{1}{2}$$

Получаем

$$\begin{aligned} y' &= \frac{x + y + 1}{x - y} = \frac{x_1 + y_1}{x_1 - y_1} \\ \frac{dy_1}{dx_1} &= \frac{x_1 + y_1}{x_1 - y_1} \end{aligned}$$

3) Пусть $t = \frac{y_1}{x_1}$, следовательно $y_1 = t x_1$. Тогда

$$dy_1 = x_1 dt + t dx_1 \quad \Rightarrow \quad \frac{dy_1}{dx_1} = \frac{dt}{dx_1} x_1 + t$$

А после замены y_1 справа получаем

$$\frac{x_1 + t x_1}{x_1 - t x_1} = \frac{x_1 + t x_1}{x_1 - t x_1} = \frac{1 + t}{1 - t}$$

Таким образом

$$\begin{aligned} \frac{dt}{dx_1} x_1 + t &= \frac{1 + t}{1 - t} \\ \frac{dt}{dx_1} x_1 &= \frac{1 + t - t + t^2}{1 - t} \\ \frac{1 - t}{1 + t^2} dt &= \frac{dx_1}{x_1} \\ \int \frac{1 - t}{1 + t^2} dt &= \ln|x_1| \end{aligned}$$

После интегрирования получаем

$$\ln|x_1| + C_1 = \arctg(t) - \frac{1}{2} \ln|1 + t^2|$$

Заменяем $t = \frac{y_1}{x_1}$ и получаем

$$\begin{aligned} \ln|x_1| + C_1 &= \arctg\left(\frac{y_1}{x_1}\right) - \frac{1}{2} \ln\left|1 + \left(\frac{y_1}{x_1}\right)^2\right| \\ \cancel{\ln|x_1|} + C_1 &= \arctg\left(\frac{y_1}{x_1}\right) - \frac{1}{2} \ln|x_1^2 + y_1^2| + \cancel{\ln|x_1^2|} \end{aligned}$$

Ответ

$$\arctg\left(\frac{y_1}{x_1}\right) - \frac{1}{2} \ln|x_1^2 + y_1^2| = C$$

8. Линейные дифференциальные уравнения. ДУ Бернулли

Определение 8.1 (Линейное ДУ). ДУ вида

$$a(x) y' + b(x) y + c(x) = 0$$

называется линейным дифференциальным уравнением, а

$$y' + p(x) y = q(x)$$

является приведённой формой линейного ДУ первого порядка, где

$$p(x) \in C_{(a; b)}, \quad q(x) \in C_{(a; b)}$$

Определение 8.2. Пусть

$$y' + p(x) y = q(x) \tag{1}$$

$$y' + p(x) y = 0 \tag{2}$$

ДУ (2) - линейное однородное ДУ, соответствующее линейному ДУ (1)

Замечание 8.1. Метод Лагранжа для решения линейных неоднородных ДУ первого порядка, в вариации произвольной постоянной
Дано

$$y' + p(x) y = q(x)$$

Решение

1) Ищем решение для однородного уравнения

$$y' + p(x) y = 0$$

$$\frac{dy}{y} = -p(x) dx$$

$$\ln(y) = - \int p(x) dx + \ln(C)$$

$$y = C v(x)$$

Замечание. $v(x) = e^{-\int p(x) dx}$

Таким образом, получили **частное** (из-за деления на y) решение для однородного ДУ.

2) ищем решение первоначального ДУ в виде $y = C(x) v(x)$, где $C(x)$ — постоянная, зависящая от x (произвольная постоянная)

$$\begin{aligned} y &= C(x) v(x) \\ y' &= C' v + C v' \end{aligned}$$

Подставим в уравнение из условия

$$\begin{aligned} C' v + C v' + p C v &= q \\ C' v + C (v' + p v) &= q \end{aligned}$$

Так как на шаге 1 $v' + p v = 0$, то получаем

$$\begin{aligned} C (v' + p v) &= 0 \\ C' v(x) &= q(x) \\ C' &= \frac{q(x)}{v(x)} \\ C(x) &= \int \frac{q(x)}{v(x)} dx + const \end{aligned}$$

Подставим значение $v(x)$ из шага 1, получим

$$C(x) = \int q(x) e^{\int p(x) dx} dx + const \quad x \in (a; b)$$

Или

$$C(x) = u(x) + const$$

3) полное решение ДУ имеет вид

Пункт «б» является обобщением «а»?

$$а) y = (u(x) + C) v(x) = u(x) v(x) + C v(x)$$

$$б) y = y_{\text{(частное решение неоднородного)}} + C y_{\text{(частное решение однородного)}}$$

Замечание 8.2 (По поводу решения задач Коши). Пусть

$$p(x), q(x) \in C_{(a; b)}, \quad x_0 \in (a; b), \quad y_0 \in \mathbb{R}$$

Тогда задача Коши

$$X = \begin{cases} y' + p(x)y = q(x) \\ y'|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

имеет единственное решение, определённое на $(a; b)$ вида

$$y = \underbrace{e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}}_{v(x)} \left(\underbrace{y_0}_c + \underbrace{\int_{x_0}^x \underbrace{g(s)e^{\int_{x_0}^s p(t)dt} ds}_{\frac{g(s)}{v(s)}}}_{u(x)} \right)$$

Пример 8.1. Дано

$$xy' + y = 3x^3$$

Решение.

Делим на x получим

$$y' + \frac{y}{x} = 3x^2$$

1) Решаем однородное уравнение. Находим решение для $\dot{y} = v(x)$

$$v' + \frac{v}{x} = 0$$

$$\frac{dv}{v} = -\frac{dx}{x}$$

$$\ln(v) = -\ln(x) + \ln(C)$$

$$v = \frac{C}{x} \text{ — общее решение}$$

$$\text{При } C = 1 \quad v(x) = \frac{1}{x} \text{ — частное решение}$$

2) Решаем общее уравнение. где $y = v(x)u(x)$

$$\text{Так как } y = \frac{u}{x}, \text{ то } y' = \frac{u'}{x} - \frac{u}{x^2}$$

Подставляем в первоначальное уравнение. Получаем

$$\frac{u'}{x} - \frac{u}{x^2} + \frac{u}{x^2} = 3x^2$$

$$u' = 3x^3$$

$$u(x) = \frac{3}{4}x^4 + c$$

3) Совмещаем результаты шагов 1 и 2. Получаем ответ

$$y = \frac{3}{4}x^4 + \frac{c}{x} \quad x \in \mathbb{R}$$

Определение 8.3. ДУ вида

$$y' + p(x)y = q(x)y^\alpha \quad \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$$

называется ДУ Бернулли

Замечание 8.3 (Решение ДУ Бернулли). ДУ Бернулли интегрируется методом Лагранжа в вариации произвольной постоянной

- 1) Ищем $v = v(x)$ частное решение соответствующее линейному однородному ДУ

$$\begin{aligned} v' + p(x)v &= 0 \\ v(x) &= e^{-\int p(x) dx} \end{aligned}$$

- 2) Ищем общее решение ДУ для $u = u(x)$, где $y = u(x)v(x)$

$$\begin{aligned} u'v + \underbrace{u(v' + pv)}_{=0 \text{ (см. зам. 2)}} &= qu^\alpha v^\alpha \\ u'v(x) &= q(x)u^\alpha v^\alpha(x) \end{aligned}$$

Замечание. Нам известно то, что с аргументом.
Далее разделим на $u^\alpha v(x)$

$$\begin{aligned} \frac{du}{u^\alpha} &= q(x)v^{\alpha-1}(x) dx \\ \int \frac{du}{u^\alpha} &= \int q(x)v^{\alpha-1}(x) dx \\ \frac{u^{1-\alpha}}{1-\alpha} &= \int q(x)v^{\alpha-1}(x) dx + C \\ u = u(x, C) &= \left((1-\alpha) \left(\int q(x)v^{\alpha-1}(x) dx + C \right) \right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \end{aligned}$$

- 3) Таким образом, ответ

$$y = u(x, C)v(x)$$

Пример 8.2. Дано

$$xy' - y = xy^2$$

Решение.

Для соответствия ДУ Бернулли разделим на x . Получим

$$y' - \frac{y}{x} = y^2$$

Видим, что

$$p(x) = -\frac{1}{x}, \quad q(x) = 1, \quad \alpha = 2$$

1) Ищем частное решение однородного ДУ

$$\begin{aligned} v' - \frac{v}{x} &= 0 \\ \frac{dv}{v} &= \frac{dx}{x} \\ \ln |v| &= -\ln |x| + \ln(C) \\ v &= Cx \end{aligned}$$

Если $C = 1$, то получаем частное решение $v(x) = x$

2) Рассмотрим $y = u(x)v(x) = ux$

Подставим в уравнение из условия, получим

$$\begin{aligned} u'x + u - u &= u^2x^2 \\ u' &= u^2x \\ \frac{du}{u^2} &= xdx \\ -\frac{1}{u} &= \frac{x^2}{2} - C \\ u &= \frac{1}{C - \frac{x^2}{2}} \end{aligned}$$

3) Ответ

$$\begin{aligned} y &= \frac{x}{C - \frac{x^2}{2}} \\ y &= \frac{2x}{2C - x^2} \end{aligned}$$

9. ДУ в полных дифференциалах

Определение 9.1. ДУ вида

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad M(x, y), N(x, y) \in C'(D)$$

называется ДУ «в полных дифференциалах», если $\exists F(x, y) \in C^2(D)$ для которой

$$\begin{aligned} F'_x &= M(x, y) \\ F'_y &= N(x, y) \end{aligned}$$

то есть ДУ имеет вид $dF(x, y) = 0$

Примечание. Дифференциал

$$dF(x, y) = F'_x dx + F'_y dy = M dx + N dy$$

является полным, поэтому и название уравнения «в полных дифференциалах».

Теорема 9.1 (Об общем интеграле). В условиях определения 1, уравнение $F(x, y) = C$ даёт общий интеграл ДУ $dF(x, y) = 0$ (предполагаем, что D -односвязная область (ограниченная простой замкнутой кривой))

Доказательство. Интегральная кривая $dF(x, y) = 0$

$$L : \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} \quad t \in I$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\exists C = \text{const}, \quad \forall t \in I, \quad F(x(t), y(t)) = C$$

\Rightarrow По условию имеем

$$F'_x(x(t), y(t)) x'_t + F'_y(x(t), y(t)) y'_t = 0$$

Значит

$$\begin{aligned} (F(x(t), y(t)))' &= 0, \quad t \in I \\ \Rightarrow \exists C = \text{const} \quad \forall t \in I \quad F(x(t), y(t)) &= C \end{aligned}$$

⇐ По условию

$$\forall t \in I \quad F(x(t), y(t)) = C$$

Продифференцируем равенство, получим

$$F'_x x'_t + F'_y y'_t = 0$$

По определению следует, что

L — интегральная кривая ДУ $F'_x dy + F'_y dx = 0$ и значит $dF(x, y) = 0$

■

Замечание 9.1 (решение задачи Коши).

$$\begin{cases} dF(x, y) = 0 \\ y|_{x=x_0} = y_0 \end{cases}$$

$F(x, y) = F(x_0, y_0)$ (в неявном виде)

Пример 9.1. Дано


$$F(x, y) = x^2$$

Что ищем?

Решение.

$$\begin{aligned} F'_x &= 2xy \\ F'_y &= x^2 \end{aligned}$$

Тогда уравнение «в полных дифференциалах» будет выглядеть так



$$\begin{aligned} 2xy dx + x^2 dy &= 0 \\ x^2 y + x^2 y &= C_1 \\ x^2 y &= C = \frac{C_1}{2} \end{aligned}$$

Общее решение

Рис. 12. Общее решение

$$y = \frac{C}{x^2}$$

Не проверено и не разобрано

Теорема 9.2. Упущена формулировка теоремы

Доказательство. Пусть $M_0(x_0, y_0)$ - внутренняя точка в области D

\Rightarrow Пусть есть $F(x, y) \in C^2$ такая, что

$$F'_x = M(x, y), \quad F'_y = N(x, y) \quad \forall (x, y) \in \mathring{D}$$

Найдём $M'_y = F''_{xy} \in \mathring{D}$ и $N'_x = F''_{yx} \in C(\mathring{D})$
т.к. они непрерывны, значит

$$F''_{xy} = F''_{yx} \Rightarrow M'_y = N'_x \quad M'_y, N'_x \in \mathring{D}$$

$\Leftarrow \forall (x, y) \in \mathring{D} \quad M'_y(x, y) = N'_x(x, y), \quad (x_0, y_0) \in \mathring{D}, \quad U((x_0, y_0)) \subset D$
Найдём частный интеграл F'_x , где $y = \text{const}$

$$F'_x = M(x, y) \Rightarrow F(x, y) = \int_{x_0}^x M(x; y) dx + \varphi(y)$$

Значит

$$F_y = \left(\int_{x_0}^x M(x, y) dx + \varphi(y) \right)'_y = \int_{x_0}^x M'(x, y) dx + \varphi'(y) \equiv N(x, y)$$

Получается... ???тут интеграл с переменным верхним пределом???

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^x N'(x, y) dx + \varphi'(y) &\equiv N(x, y) \\ N(x, y)|_{x_0}^x + \varphi' &\equiv N(x, y) \\ \cancel{N(x, y)} - N(x_0, y) + \varphi'_y &\equiv \cancel{N(x, y)} \\ \varphi'_y &= N(x_0, y) \\ \varphi(y) &= \int_{y_0}^y N(x_0, y) dy \end{aligned}$$

Таким образом

$$F(x, y) = \int_{x_0}^x M(t, y) dt + \int_{y_0}^y N(x_0, s) ds$$

Замечание. По поводу односвязности.

Односвязность позволяет соединить точки P и P_0 внутри обл.(не

D , т.е. некой области)

$$\begin{aligned}\exists F(x, y) \text{ определённая в } U(P_0) : F'_x &= M(x, y) \\ F'_y &= N(x, y) \\ (\forall (x, y) \in U(P_0))\end{aligned}$$

«двигаем» точку P_0 до P . Тогда

$$\exists F(x, y) \in \mathring{D} \quad F'_x = M \quad F'_y = N \quad (\forall (x, y) \in \mathring{D})$$

Рисунки (3 шт.)!

■

Определение 9.2 (Интегрирующий множитель). Пусть

$$M(x, y), N(x, y) \in C'(D)$$

Тогда функцию $\mu = \mu(x, y)$ называют интегрирующим множителем ДУ

$$M dx + N dy = 0$$

Или (\Leftrightarrow)

$\mu(x, y)$ — непрерывная функция, ДУ

$$\mu M dx + \mu N dy = 0$$

является ДУ «в полных дифференциалах».

Или кратко

$$u(x, y) \in C'(D) \quad (\mu M)'_y = (\mu N)'_x$$

в односвязных компонентах области D и частях D

Замечание 9.2. (отыскание интегрирующего множителя в некоторых случаях)

Пусть

$$\frac{M'_y - N'_x}{N} = f(x)$$

Тогда сущ. инт. множ.

$$\mu = \mu(x) \quad \mu(x) = e^{\int f(x) dx}$$

(в односвязных компонентах и частях D)

Доказательство.

$$\begin{aligned}\mu'_y M + \mu M'_y &= \mu'_x N + \mu N'_x \\ \mu (M'_y - N'_x) &= \mu'_x N - \mu'_y M \\ \frac{du}{\mu} &= \frac{M'_y - N'_x}{N} dx = f(x) dx \\ \ln |\mu| &= \int f(x) dx \Rightarrow \\ \mu(x) &= e^{\int f(x) dx}\end{aligned}$$

■

Пример 9.2. Дано

$$x y dx + (x^2 + y^2) dy = 0$$

Решение

$$\begin{aligned}M &= xy & N &= x^2 + y^2 \\ M'_y &= x & N'_y &= 2x\end{aligned}$$

$$\frac{M'_y - N'_x}{M} = -\frac{x}{x y} = -\frac{1}{y} = g(y)$$

Из замечания выше следует

$$\begin{aligned}\exists \mu = \mu(y) &= e^{\int g(y) dy} = e^{\int \frac{dy}{y}} = e^{\ln y} = y \\ \mu &= y\end{aligned}$$

Т.о. $y = \mu$

$$\begin{aligned}x y^2 dx + (x^2 y + y^3) dy &= 0 \\ M_1 &= x y^2 \\ N_1 &= x^2 y + y^3 \\ M'_{1_y} &= 2 x y = N'_{1_x}\end{aligned}$$

Таким образом получили ДУ в полных дифференциалах.
Решаем его

$$\begin{aligned} & \begin{cases} F'_x = xy^2 \\ F'_y = x^2y + y^3 \end{cases} \\ F(x, y) &= \int xy^2 dx = y^2 \int x dx = \frac{y^2x^2}{2} + \varphi(y) \\ F'_y &= \left(\frac{1}{2}x^2y^2 + \varphi(y)\right)'_y = x^2y + y^3 \\ x^2y + \varphi'_y &= x^2y + y^3 \\ \varphi'_y &= y^3 \\ \text{Let } \varphi(y) &= \frac{y^4}{4} \\ F(x, y) &= \frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{4}y^4 \\ \Rightarrow \frac{1}{2}x^2y^2 + \frac{1}{4}y^4 &= c \end{aligned}$$

Получили общий интеграл

10. ДУ Клеро и Лагранжа

Замечание 10.1 (По поводу параграфа (от автора)). Если до этого мы рассматривали уравнения, разрешённые относительно производной, то в данном параграфе мы рассмотрим два вида ДУ, которые таковыми не являются.

Определение 10.1. Пусть функция

$$\varphi(t) \in C'(I) \quad \text{and} \quad \varphi(t) \not\equiv t$$

Тогда ДУ вида

$$y = x y' + \varphi(y')$$

называют дифференциальным уравнением Клеро

Замечание 10.2 (Решение ДУ Клеро). Дано

$$y = x y'(x) + \varphi(y'(x))$$

Решение.

Продифференцируем по x . Получим

$$\cancel{y'_x(x)} = \cancel{y'_x(x)} + x y''_{xx}(x) + \varphi'_t(y') y''_{xx}$$

Примечание. Пишем индекс t , так как производная от сложной функции.

Таким образом

$$y''(x + \varphi'_t) \equiv 0$$

Рассмотрим 2 случая

1) $y''_{xx} = 0$ Получаем

$$(y'_x)' = 0$$

$$y'_x \equiv C$$

$$y = C x + C_1$$

Требуется проверка, так как мы могли получить лишние решения после дифференцирования (это не опечатка?)

Проверка. Подставляем ответ в первоначальное решение.

$$C_x + C_1 = C_x + \varphi(C)$$

$$C_1 = \varphi(C)$$

Таким образом общее решение ДУ Клеро выглядит так

$$y = C_x + \varphi(C)$$

Нетрудно заметить, что решение выглядит как семейство прямых линий.

2) Рассмотрим второй множитель

$$\begin{aligned} x + \varphi'_t(t) &\equiv 0 \\ x &\equiv -\varphi'_t(t) \end{aligned}$$

Нашли решение относительно x теперь найдём решение относительно y .

Пусть $y' = t$, тогда

$$y = x t + \varphi(t)$$

Подставляем x получаем

$$y = -t \varphi'_t + \varphi$$

Таким образом, особое решение ДУ Клеро имеет вид

$$L : \begin{cases} x = -\varphi'_t(t) \\ y = \varphi - t \varphi'_t \end{cases}$$

что является уравнение прямой L .

Графически решение выглядит следующим образом




Рис. 13.

Замечание 10.3 (О геометрическом смысле ДУ Клеро). Ищем кривую L , касательные к которой обладают некоторым свойством. Рисунок для условия в конце.

Уравнение касательной к L в точке $(x, y) \in L$

$$Y - y = y' (X - x) = y' X - x y'$$

Уравнение относительно Y в общем виде

$$Y = k X + b, \quad \text{где} \quad k = y', \quad b = y - x y'$$

Объявим свойство касательной как $b = \varphi(k)$. Тогда

$$\begin{aligned} y - x y' &= \varphi(y') \\ y &= x y' + \varphi(y') \end{aligned}$$

Таким образом, мы получили уравнение Клеро.




Рис. 14.

Определение 10.2. Пусть есть функции

$$(\varphi(t), \psi(t)) \in C'(I) \quad \varphi(t) \not\equiv t \text{ (функция нелинейна)}$$

Тогда уравнение вида

$$y = x \varphi(y') + \psi(y')$$

называют ДУ Лагранжа.

Замечание 1. Уравнение похоже на Клеро, но тут кривая связана с нормальными.

Замечание 2. Уравнение Лагранжа общий случай уравнения Клеро.

Замечание 10.4 (Как решать). Дано

$$y = x \varphi(y') + \psi(y')$$

Решение.

Введём следующую параметризацию

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$$

Тогда формуле параметрически заданной функции получаем

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = t \quad \Rightarrow \quad y'_t = t x'_t$$

Так как y'_x и y' одно и то же, получаем из условия

$$y = x \varphi(t) + \psi(t)$$

Продифференцируем по t Получим

$$y'_t = x'_t \varphi + x \varphi'_t + \psi'_t$$

Помним, что $y'_t = t x'_t$. С учётом этого уравнение выше приобретает вид

$$\begin{aligned} x'_t \varphi + x \varphi'_t + \psi'_t &= t x'_t \\ x'_t (\varphi - t) + x \varphi'_t &= -\psi'_t \end{aligned}$$

Таким образом получили линейное ДУ 1-го порядка. Решение

$$\begin{aligned} x'_t + \frac{\varphi'_t}{\varphi - t} x &= \frac{\psi'_t}{\varphi - t} \\ x'_0 + \frac{\varphi'_t}{\varphi - t} x_0 &= 0 \\ x'_0 &= \frac{\varphi'_t}{t - \varphi} x_0 \\ \frac{dx_0}{x_0} &= \frac{\varphi'_t dt}{t - \varphi} \end{aligned}$$

Интегрируем и получаем решение для однородного ДУ затем находим ответ для неоднородного уравнения (x_1). Таким образом мы нашли

$$x = x_1(t) + C x_0(t)$$

Подставляем значение x в $y'_t = t x'_t$ или $y = x \varphi(t) + \psi(t)$ (оба варианта справедливы?). Получаем окончательный ответ.

Таким образом, общий интеграл ДУ Лагранжа

$$\begin{cases} x = x_1(t) + C x_0(t) \\ y = y_1(t) + C y_0(t) \end{cases}$$

Замечание. Нужно проверить

$$\frac{y'_t}{x'_t} = t$$

особое решение, когда $\varphi(t) - t = 0$

11. Дифференциальные уравнения высшего порядка уравнения высшего порядка, допускающие понижения порядка

Определение 11.1. ДУ n -го порядка это уравнение вида

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

решение которого является функцией $y = y(x)$, $x \in I$, которая n раз дифференцируема на I и справедливо

$$F(x, y, y'(x), y''(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

Определение 11.2. Если

$$y^{(n)} = F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

то оно называется дифференциальное уравнение n -го порядка разрешённого относительно старшей производной

Пример 11.1 (Как можно описать множество решений). Дано

$$y^{(n)} = f(x), \quad f(x) \in C(I), \quad \text{где } I - \text{интервал}$$

Для краткости запишем через эквивалентность

$$\begin{aligned} y^{(n)}(x) &\equiv f(x) \\ (y^{(n-1)}(x))' &\equiv f(x) &\Leftrightarrow & y^{(n-1)}(x) = F_1(x) + C_1 \\ (y^{(n-2)}(x))'' &\equiv f(x) &\Leftrightarrow & y^{(n-2)}(x) = F_2(x) + C_1 x + C_2 \end{aligned}$$

Из этого следует

$$\begin{aligned} y^{(n-3)} &= F_3(x) + \frac{C_1}{2} x^2 + C_2 x + C_3 \\ &\dots \\ y &= F_n(x) + \frac{C_1}{(n+1)!} x^{n-1} + \dots + C_{n-1} x + C_n \\ y &= F_n(x) + C'_1 x^{n-1} + \dots + C'_{n-1} x + C'_n \end{aligned}$$

где

$$F_n(x) = \underbrace{\int dx \int dx \dots \int f(x) dx}_{n \text{ раз}}$$

Замечание. В последней строке сделана замена вида: $C'_1 = \frac{C_1}{(n+1)!} \dots C'_n = C_n$.

Определение 11.3 (Общее решение). Пусть $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ — ДУ n -го порядка.

Тогда функция

$$y = \varphi(x, C_1, \dots, C_n)$$

называется общим решением этого ДУ если

- 1) $\forall C_1, \dots, C_n$ $y = \varphi(x, C_1, \dots, C_n)$ является решением как функция от x
- 2) Для любого решения $y = \varphi^*(x)$ найдётся такой набор $C_1^*, \dots, C_n^* \in \mathbb{R}$, $\forall x \in I$, что $\varphi^*(x) = \varphi(x, C_1^*, \dots, C_n^*)$. То есть общее решение учитывает все наборы констант (все варианты решения)

Определение 11.4 (Общий интеграл). Если общее решение задано неявной функцией

$$\Phi(x, y, C_1, \dots, C_n) = 0$$

то это общий интеграл

Определение 11.5 (Задача Коши для ДУ n -го порядка). Она описывается следующим образом

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \\ y|_{x=x_0} = y_0, \quad y'|_{x=x_0} = y'_0, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

где функция $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ определена в области $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$, а $M_0(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)})$ — внутренняя точка области D

Теорема 11.1 (Сущ. и ед. задачи Коши для ДУ n -го порядка).

Пусть функция $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ определена в области $D \in \mathbb{R}^{n+1}$ и

$$f(M), \quad \frac{\delta f(M)}{\delta y}, \quad \frac{\delta f(M)}{\delta y'}, \quad \dots, \quad \frac{\delta f(M)}{\delta y^{(n-1)}}$$

непрерывны в некоторой окрестности $U(M_0) \subset D$, где $M_0(x_0, y_0, \dots, y_0^{(n-1)})$

Тогда $\exists \delta > 0$ и существует единственная функция $y = y(x)$, $x \in U_\delta(x_0)$, которая является решением задачи Коши

$$\begin{cases} y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}) \\ y|_{x=x_0} = y_0, \quad y'|_{x=x_0} = y'_0, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

Доказательство. Принимаем без доказательств.

Примечание. Доказательство аналогично случаю для одной переменной.

■

Замечание 11.1 (О ДУ допускающих понижение порядка). Рассмотрим ДУ вида $F(x, y', \dots, y^{(n)}) = 0$, т.е. не содержащих в явном виде y . Для них справедлива следующая замена:

$$z = z(x) = y'(x), \quad z'(x) = y''(x), \quad \dots, \quad z^{(n-1)}(x) = y^{(n)}(x)$$

Тогда

$$\begin{cases} F(x, z, \dots, z^{(n-1)}) = 0 \\ z = y' \end{cases}$$

Таким образом, общее решение

$$y' = z = z(x, C_1, \dots, C_{n-1})$$

Ответ

$$y = \int z(x, C_1, \dots, C_{n-1}) dx + C_n$$

Пример 11.2. Дано

$$x^2 y'' - (y')^2 = 0$$

Решение.

Заменяем $z = y'$, $z' = y''$. Получаем

$$\begin{aligned} x^2 z' - z^2 &= 0 \\ \frac{dz}{z^2} &= \frac{dx}{x^2} \\ \int \frac{dz}{z^2} &= \int \frac{dx}{x^2} \\ -\frac{1}{z} &= -\frac{1}{x} - C_1 \\ z &= \frac{x}{C_1 x + 1} \\ y' &= \frac{x}{C_1 x + 1} \\ y &= \int \frac{x}{C_1 x + 1} \end{aligned}$$

Таким образом получаем

$$1) C_1 = 0 \Rightarrow y = \frac{x^2}{C_2}$$

2) Для $C_1 \neq 0$ получим

$$y = \frac{1}{C_1} \int \frac{(C_1 x + 1) - 1}{C_1 x + 1} dx + C_2$$

$$y = \frac{x}{C_1} - \frac{1}{C_1^2} \ln(|C_1 x + 1|) + C_2$$

3) Частный случай $z = 0, y' = 0 \Rightarrow y = C_2$

Замечание 11.2. Рассмотрим ДУ вида $F(x, y^{(k)}, \dots, y^{(n)}) = 0$, т.е. не содержащие в явном виде $y, y', \dots, y^{(k-1)}$, $k \geq 2s$.

В данном случае всё аналогично предыдущему замечанию

$$z = y^{(k)}, z' = y^{(k+1)}, \dots, z^{(n-k)} = y^{(n)}$$

$$\begin{cases} F(x, z, \dots, z^{(n-k)}) = 0 \\ z = y^{(k)} \end{cases}$$

Таким образом, общее решение для z

$$z = z(x, C_1, \dots, C_{n-k})$$

$$F_k^{(k)} = z(x, C_1, \dots, C_{n-k})$$

$$y^{(k)} = F_k^{(k)}$$

$$y = F_k(x, C_1, \dots, C_{n-k}) + C_{n-k+1} x^{k-1} + \dots + C_n$$

Пример 11.3. Дано

$$x y''' - y'' = 0 \Rightarrow k = 2$$

Решение

Пусть $z = y''$, $z' = y'''$ тогда

$$x z' - z = 0$$

$$\int \frac{dz}{z} = \int \frac{dx}{x} + \ln|C_1|$$

$z = C_1 x$ Делаем обратную замену

$$y'' = C_1 x$$

$$y' = \frac{C_1 x^2}{2} + C_2$$

$$y = \underbrace{\frac{C_1 x^3}{6}}_{F_2(x, C_1)} + \underbrace{C_2 x + C_3}_{\text{многочлен ст. } k-1}$$

По факту мы рассмотрели следующее уравнение в поле

$$y''' = \frac{y''}{x}, \quad D \in \mathbb{R}^4 \setminus \{x = 0\}$$

Замечание. Частный случай ($z = 0$) входит в общее решение. Таким образом, решение выше полное.

Замечание 11.3. Рассмотрим ДУ вида $F(y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$ т.е. не содержащее x в явном виде.

Аналогично делаем замену

$$y' = p(y)$$

Отметим $y'_x(x) = p(y(x))$ — сложная функция. Значит

$$y'' = p' p$$

$$y''' = (p'' p + (p')^2) p = f_2(p, p', p'')$$

...

$$y^{(k+1)} = f_k(p, p', \dots, p^{(k)})$$

Таким образом получаем следующую систему

$$\begin{cases} F(y, p, p' p, f_2(p, p', p''), \dots, f_k(p, p', \dots, p^{(k)})) = 0 \\ y' = p \end{cases}$$

Следовательно общее решение относительно p

$$p = p(y, C_1, \dots, C_{n-1})$$

Зная, что $y' = p$ получаем

$$\frac{dy}{p(y, C_1, \dots, C_{n-1})} = dx$$

Таким образом решение относительно x следующее

$$x = \int \frac{dy}{p(y, C_1, \dots, C_{n-1})} + C_n$$

Пример 11.4. Дано

$$y'' = 2 y y'$$

Решение

$$y' = p(y)$$

$$y'' = p' p$$

$$p' p = 2 y p$$

$$p(p' - 2 y) = 0$$

Получаем два случая

Первый:

$$p = 0 \Rightarrow y' = 0, y = C_1$$

Второй:

$$p' - 2y = 0$$

$$p' = 2y$$

$$dp = 2y dy$$

$$\int dp = \int 2y dy$$

$$p = y' = y^2 + C_1$$

$$\frac{dy}{dx} = y^2 + C_1$$

$$\int dx = \int \frac{dy}{y^2 + C_1}$$

$$x + C_2 = \int \frac{dy}{y^2 + C_1}$$

При вычислении интеграла рассмотрим три случая

1) $C_1 = 0$

$$-\frac{1}{y} = x + C_2$$

$$y = -\frac{1}{x + C_2}$$

2) $C_1 > 0$

$$x + C_2 = \frac{1}{\sqrt{C_1}} \operatorname{arctg} \left(\frac{y}{\sqrt{C_1}} \right)$$

$$y = \sqrt{C_1} \operatorname{tg}((x + C_2) \sqrt{C_1})$$

3) $C_1 < 0, C_1 = -|C_1|$

$$x + C_2 = \frac{1}{2\sqrt{|C_1|}} \ln \left| \frac{y - \sqrt{|C_1|}}{y + \sqrt{|C_1|}} \right|$$

12. Линейные ДУ n-го порядка

Определение 12.1. Пусть сущ. функции $p_1(x), \dots, p_n(x), f(x) \in C_{(a;b)}$. Тогда ДУ вида

$$y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = f(x)$$

называется линейным ДУ n-го порядка с коэффициентами $p_1(x), \dots, p_n(x)$ и правой частью $f(x)$

Теорема 12.1 (Сущ. и ед. задачи Коши для ЛДУ n-го порядка).

Пусть $p_1(x), \dots, p_n(x), f(x) \in C_{(a;b)}$.

Тогда $\forall x_0 \in (a; b), \forall y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)} \in \mathbb{R}$ задача Коши

$$\begin{cases} y^{(n)} + p_1(x)y^{(n-1)} + \dots + p_n(x)y = f(x) \\ y|_{x=x_0} = y_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

имеет единственное решение $y = y(x), x \in (a, b)$ определённое на всём интервале $(a; b)$.

Доказательство. Принимаем без доказательств

■

Для более компактной записи введём следующее определение

Определение 12.2 (Линейный дифференциальный оператор). Перед тем как непосредственно вводить определение рассмотрим два случая.

- 1) Рассмотрим оператор дифференцирования: $\frac{d}{dx}$, тогда его действие будет выглядеть так

$$\frac{d}{dx} f(x) = \frac{df(x)}{dx} = f'(x)$$

Данный оператор линейный, так как

$$a) (v + u)' = v' + u'$$

$$б) (cu)' = cu'$$

(Примечание. признак линейности см. во 2м сем.)

- 2) Для другого оператора $\frac{d^k}{dx^k}$ действие будет выглядеть

$$\frac{d^k}{dx^k} f(x) = \frac{d^k f(x)}{dx^k} = f^{(k)}(x)$$

Сам оператор также является линейным

Таким образом, очевидно, что в общем случае можно определить оператор

$$L = \frac{d^n}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{d}{dx} + p_n(x) E$$

это линейный дифференциальный оператор n -го порядка, где

$$Ef(x) = f(x) \quad E - \text{единичный оператор}$$

Его действие на n раз диф. ф-ю $f(x)$

$$L = \frac{d^n f(x)}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1} f(x)}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{df(x)}{dx} + p_n(x) f(x)$$

$$L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + p_{n-1}(x) y' + p_n(x) y$$

Замечание 12.1. Теперь ЛДУ n -го порядка можно описать так

$$L(y) = f(x)$$

Замечание 12.2 (Линейность оператора L). .

Пусть

$$L = \frac{d^n}{dx^n} + p_1(x) \frac{d^{n-1}}{dx^{n-1}} + \cdots + p_{n-1}(x) \frac{d}{dx} + p_n(x) E$$

Тогда

- 1) $L(\varphi_1(x) + \varphi_2(x)) = L(\varphi_1(x)) + L(\varphi_2(x))$
- 2) $L(C \varphi(x)) = C L(\varphi(x))$
- 3) $L(C_1 \varphi_1(x) + C_2 \varphi_2(x) + \cdots + C_n \varphi_n(x)) = C_1 L(\varphi_1(x)) + C_2 L(\varphi_2(x)) + \cdots + C_n L(\varphi_n(x))$

Доказательство.

- 1) Рассмотрим следующие тривиальные выражения

$$\begin{aligned} \varphi_1(x) + \varphi_2(x) &= \varphi_1(x) + \varphi_2(x) \\ (\varphi_1(x) + \varphi_2(x))' &= \varphi_1'(x) + \varphi_2'(x) \\ (\varphi_1(x) + \varphi_2(x))'' &= \varphi_1''(x) + \varphi_2''(x) \\ &\dots \\ (\varphi_1(x) + \varphi_2(x))^{(n)} &= \varphi_1^{(n)}(x) + \varphi_2^{(n)}(x) \end{aligned}$$

Каждую из строк соответственно умножим на $p_n, p_{n-1}, \dots, p_1, 1$. Затем сложим все уравнения. И нетрудно заметить, что таким образом получаем

$$L(\varphi_1(x) + \varphi_2(x)) = L(\varphi_1(x)) + L(\varphi_2(x))$$

2) аналогично доказывается (рассмотрим выражения $c\varphi, (c\varphi)^{(n)}$)

3) аналогично (или методом мат. индукции по k)

■

Определение 12.3.

$$L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + p_{n-1}(x) y' + \dots + p_n(x) y = f(x) \quad (3)$$

$$L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + p_{n-1}(x) y' + \dots + p_n(x) y = 0 \quad (4)$$

ДУ (2) называют линейным однородным ДУ, а (1) лин. неоднородным ДУ

В краткой форме соответствует

$$L(y) = f(x)$$

$$L(y) = 0$$

Замечание 12.3. .

ЛОДУ — линейное однородное дифференциальное уравнение

ЛНДУ — линейное неоднородное дифференциальное уравнение

Теорема 12.2 (О линейности мн-ва решений ЛОДУ). Пусть функции $p_1(x), \dots, p_n(x), f(x) \in C_{(a;b)}$ и $L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + p_{n-1}(x) y' + \dots + p_n(x) y$. Тогда ЛОДУ $L(y) = 0$ имеет множество решений удовлетворяющее следующему свойству линейности.

Если $\varphi_1(x), \dots, \varphi_k(x)$ решение $L(y) = 0$, то

$\forall C_1, \dots, C_k \in \mathbb{R}$ функция

$$y = C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_k \varphi_k(x)$$

является решением $L(y) = 0$

Замечание. Количество решений произвольно и не обязательно равно n .

Доказательство..

Дано

$$L(\varphi_1(x)) \equiv 0, \dots, L(\varphi_k(x)) \equiv 0$$

Тогда для $\forall C_1, \dots, C_k$ и свойствам из замечания 2 получаем

$$L(C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_n \varphi_n(x)) = C_1 L(\varphi_1(x)) + \dots + C_n L(\varphi_n(x)) \equiv 0$$

Следовательно $y = C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_k \varphi_k(x)$ является решением $L(y) = 0$

■

13. Фундаментальная система решений ЛО-ДУ

Определение 13.1 (Линейно зависимая система функций). Система функций $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_k(x)\}$ определённая на $(a; b)$ называется линейно зависимой

$$\Leftrightarrow \begin{array}{ll} \exists \alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R} & \alpha_1^2 + \dots + \alpha_k^2 \neq 0 \\ \forall x \in (a; b) & \alpha_1 \varphi_1(x) + \dots + \alpha_k \varphi_k(x) = 0 \end{array}$$

Примечание. Говорят: лин. зав. на интервале $(a; b)$. Важно отметить, что мы рассматриваем систему на интервале.

Пример 13.1. Дана линейно зависимая система на \mathbb{R}

$$\{x, x+1, x-1\}$$

Требуется найти набор коэффициентов.

Решение

$$\begin{aligned} \alpha x + \beta(x+1) + \gamma(x-1) &\equiv 0 \\ (\alpha + \beta + \gamma)x + \beta - \gamma &\equiv 0 \end{aligned}$$

Очевидно, что решение будет тогда, когда выполнена следующая система

$$\begin{cases} \alpha + \beta + \gamma = 0 \\ \beta - \gamma = 0 \end{cases}$$

Таким образом, решение

$$\begin{cases} \alpha = -2\beta \\ \beta = \beta \\ \gamma = \beta \end{cases}$$

Ответом может быть, например, частный случай при $\beta = 1$ тогда $\alpha = -2, \beta = 1, \gamma = 1$
 $-2x + (x+1) + (x-1) \equiv 0$ — система линейно зависима на \mathbb{R}

Определение 13.2 (Линейно независимая система функций). Система функций $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_k(x)\}$ опр-на на $(a; b)$ называется линейно независимой на $(a; b)$

Или

$$\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_k(x)\} \text{ не явл. лин. зав. на } (a; b)$$

Или

$$\forall x \in (a; b) \quad \alpha_1 \varphi_1(x) + \dots + \alpha_k \varphi_k(x) = 0$$
$$\text{Где } \alpha_1 = \dots = \alpha_k = 0$$

Определение 13.3 (Фундаментальная система решений ЛОДУ).

Пусть

$$p_1(x), \dots, p_n(x) \in C_{(a;b)}$$

ЛОДУ

$$L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + p_{n-1}(x) y' + \dots + p_n(x) y = 0$$

Система функций $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ определена на $(a; b)$ называется фундаментальной системой решений ЛОДУ $L(y) = 0$

\Leftrightarrow

- 1) $L(\varphi_1(x)) \equiv 0, \dots, L(\varphi_n(x)) \equiv 0$
Где $x \in (a; b)$ и $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ — решения ЛОДУ
- 2) число функций равно $n = \{\text{порядок ЛОДУ}\}$
- 3) $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ — лин. незав. система на $(a; b)$

Определение 13.4. Пусть функции $\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)$ n раз дифф-мая функция на $(a; b)$

Тогда функциональный определитель

$$W(x) = W(\varphi_1, \dots, \varphi_n) = \begin{vmatrix} \varphi_1 & \dots & \varphi_n \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)} & \dots & \varphi_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

называется определителем Вронского или Вронскиан для системы функций $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$

Теорема 13.1. В условиях определения 4, если система функций

$$\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\} \quad \text{линейно зависима на } (a; b)$$

то

$$\forall \alpha \in (a; b), \quad W(x) = W(\varphi_1, \dots, \varphi_n) = 0$$

Доказательство. $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n$, причём $\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2 \neq 0$ а также

$$\forall x \in (a; b) \quad \alpha_1 \varphi_1(x) + \dots + \alpha_n \varphi_n(x) = 0$$

Зафиксируем один из коэффициентов и будем считать, что $\alpha_1 \neq 0$ (в случае, если другой коэффициент не равен нулю, то его можно поменять местами с α_1)

$$\begin{aligned} W &= \begin{pmatrix} \varphi_1 & \dots & \varphi_n \\ \vdots & \dots & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)} & \dots & \varphi_n^{(n-1)} \end{pmatrix} = \frac{1}{\alpha_1} \begin{pmatrix} \alpha_1 \varphi_1 & \dots & \varphi_n \\ \dots & \dots & \dots \\ \alpha_1 \varphi_1^{(n-1)} & \dots & \varphi_n^{(n-1)} \end{pmatrix} = \\ &= [\text{Добавляем к первому столбцу столбцы умноженные на } \alpha_2, \dots, \alpha_n] = \\ &= \frac{1}{\alpha_1} \begin{pmatrix} \alpha_1 \varphi_1 + \dots + \alpha_n \varphi_n & \varphi_2 & \dots & \varphi_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_1 \varphi_1^{(n-1)} + \dots + \alpha_n \varphi_n^{(n-1)} & \varphi_2^{(n-1)} & \dots & \varphi_n^{(n-1)} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{\alpha_1} \begin{pmatrix} \alpha_1 \varphi_1 + \dots + \alpha_n \varphi_n & \varphi_2 & \dots & \varphi_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ (\alpha_1 \varphi_1 + \dots + \alpha_n \varphi_n)^{(n-1)} & \varphi_2^{(n-1)} & \dots & \varphi_n^{(n-1)} \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{\alpha_1} \begin{pmatrix} 0 & \varphi_2 & \dots & \varphi_n \\ 0 & \varphi_2' & \dots & \varphi_n' \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \varphi_2^{(n-1)} & \dots & \varphi_n^{(n-1)} \end{pmatrix} = 0 \quad \forall x \in (a; b) \end{aligned}$$

■

Замечание 13.1. Пусть $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ n раз дифференцируемая система функций на $(a; b)$, $W(x) = W(\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x))$ — вронскиан системы $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$

Тогда если $\exists x_0 \in (a; b) \quad W(x_0) \neq 0$ то система $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ линейна независима на $(a; b)$

Доказательство. Доказательство от противного.

Пусть $W(x_0) \neq 0$ и система линейно зависима на промежутке. Следовательно теореме выше получаем, что вронскиан равен нулю $\forall x \in (a; b)$, следовательно, в частности, $W(x_0) = 0$, что противоречит первоначальному условию $W(x_0) \neq 0$. Таким образом, получаем противоречие и следовательно система линейно независима на интервале. ■

Вспомним теорему 1 из предыдущего параграфа (она нужна для доказательства следующей теоремы)

Теорема 13.2. Пусть $p_1(x), \dots, p_n(x), f(x) \in C_{(a; b)}$.

Тогда $\forall x_0 \in (a; b), \forall y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)} \in \mathbb{R}$ задача Коши

$$\begin{cases} L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + \dots + p_n(x) y = f(x) \\ y|_{x=x_0} = y_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

имеет единственное решение $y = y(x), x \in (a, b)$ определённое на всём интервале $(a; b)$.

Теорема 13.3. Пусть в условиях теоремы выше функции $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ являются решением ЛОДУ $L(y) = 0$ и $\exists x_0 \in (a; b), W(x_0) = 0$.

Тогда $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ линейно зависима на всём промежутке и (по т. 1) $\forall x \in (a, b) W(x) = 0$

Доказательство. Рассмотрим алгебраическую систему уравнений относительно C_1, \dots, C_n , получим

$$\begin{cases} C_1 \varphi_1(x_0) + \dots + C_n \varphi_n(x_0) = 0 \\ C_1 \varphi'_1(x_0) + \dots + C_n \varphi'_n(x_0) = 0 \\ \vdots \\ C_1 \varphi_1^{(n-1)}(x_0) + \dots + C_n \varphi_n^{(n-1)}(x_0) = 0 \end{cases}$$

n уравнений относительно n переменных C_1, \dots, C_n и $\Delta = W(x_0) = 0$. Значит ранг матрицы меньше n , следовательно существует бесконечное множество решений (см. 2 сем.), то есть

$$\exists (C_1^*, \dots, C_n^*) \neq (0, \dots, 0)$$

Рассмотрим

$$\varphi^*(x) = C_1^* \varphi_1(x_0) + \dots + C_n^* \varphi_n(x_0)$$

$\varphi^*(x)$ — является решением задачи Коши

$$\begin{cases} L(y) = 0 \\ y|_{x=x_0} = 0, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = 0 \end{cases}$$

То есть

$$\varphi^*(x_0) = 0, (\varphi^*)'(x_0) = 0, \dots, (\varphi^*)^{(n-1)}(x_0) = 0$$

Очевидно, что для $y \equiv 0$, также является решением той же задачи Коши на интервале. Примечание $L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + \dots + p_n(x) y$. Из всего этого следует

$$\varphi^*(x_0) \equiv 0 \Rightarrow \forall x \in (a; b) \quad C_1^* \varphi_1(x) + \dots + C_n^* \varphi_n(x) = 0$$

где $(C_1^*, \dots, C_n^*) \neq (0, \dots, 0)$.

Значит по определению линейно зависимой системы, получаем что система $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ линейно зависима на $(a; b)$ ■

Теорема 13.4 (О существовании ФСР ЛОДУ n -го порядка). Пусть функции $p_1(x), \dots, p_n(x) \in C_{(a; b)}$, тогда существует набор функций $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ являющийся ФСР для

$$L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + \dots + p_n(x) y = 0$$

Доказательство. Возьмём $x_0 \in (a; b)$ и рассмотрим n задач Коши вида:

$L(y) = 0$	$L(y) = 0$	\dots	$L(y) = 0$
$y _{x=x_0} = 1$	$y _{x=x_0} = 0$	\dots	$y _{x=x_0} = 0$
$y' _{x=x_0} = 0$	$y' _{x=x_0} = 1$	\dots	\vdots
\vdots	\vdots	\dots	$y^{n-2} _{x=x_0} = 0$
$y^{n-1} _{x=x_0} = 0$	$y^{n-1} _{x=x_0} = 0$	\dots	$y^{n-1} _{x=x_0} = 1$
$y = \varphi_1(x)$	$y = \varphi_2(x)$	\dots	$y = \varphi_n(x)$
$x \in (a; b)$	$x \in (a; b)$	\dots	$x \in (a; b)$

Вопросы!

Таким образом имеем следующий вронскиан

$$W(x_0) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} = 1 \neq 0$$

Из того, что определитель не равен нулю следует

- 1) $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ — решения $L(y) = 0$ на $x \in (a; b)$
- 2) Количество решений равно порядку ДУ ($L(y) = 0$), которое равно n
- 3) $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ — линейно независимы на $(a; b)$ (по следствию к теореме 1)

Из этого по определению 3 следует, что $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ — ФСР $L(y) = 0$

■

Теорема 13.5 (Формула Лиувилля). Пусть $p_1(x), \dots, p_n(x) \in C_{(a; b)}$ и $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ — ФСР ЛОДУ $L(y) = 0$.

Возьмём $x_0 \in (a; b)$ и обозначим через $W_0 = W(x_0) \neq 0$. Тогда справедлива формула Лиувилля

$$W(x) = W_0 e^{-\int_{x_0}^x p_1(t) dt}$$

Доказательство. Для наглядности рассмотрим случай $n = 2$, тогда

$$L(y) = y'' + p_1(x) y' + p_2(x) y = 0$$

Пусть $\{\varphi_1(x), \varphi_2(x)\}$ — ФСР, то есть

$$\begin{cases} \varphi_1'' + p_1 \varphi_1' + p_2 \varphi_1 = 0 \\ \varphi_2'' + p_1 \varphi_2' + p_2 \varphi_2 = 0 \end{cases}$$

Рассмотрим вронскиан и его производную.

$$\begin{aligned} W(x) &= \begin{vmatrix} \varphi_1 & \varphi_2 \\ \varphi_1' & \varphi_2' \end{vmatrix} = \varphi_1 \varphi_2' - \varphi_2 \varphi_1' \\ W'(x) &= \cancel{\varphi_1' \varphi_2'} + \varphi_1 \varphi_2'' - \varphi_1'' \varphi_2 - \cancel{\varphi_1' \varphi_2'} \end{aligned}$$

Воспользуемся системой выше для замены φ_1'' и φ_2'' . Получим.

$$\begin{aligned} \begin{cases} \varphi_1'' = -p_1 \varphi_1' - p_2 \varphi_1 \\ \varphi_2'' = -p_1 \varphi_2' - p_2 \varphi_2 \end{cases} \\ W'(x) &= \varphi_1 (-p_1 \varphi_2' - p_2 \varphi_2) + \varphi_2 (p_1 \varphi_1' + p_2 \varphi_1) \\ W'(x) &= -p_1 (\varphi_1 \varphi_2' - \varphi_1' \varphi_2) = -p_1 W \end{aligned}$$

Решаем тривиальное ДУ

$$\frac{dW}{dx} = -p_1(x) W$$

Очевидно

$$\int_{x_0}^x \ln(W) = - \int_{x_0}^x p_1(t) dt$$

Ответ

$$W(x) = W(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p_1(t) dt}$$

■

14. Общее решение линейного ДУ n-го порядка

Теорема 14.1 (Об общем решении ЛОДУ n-го порядка). Пусть

$$p_1(x), \dots, p_n(x) \in C_{(a;b)} \text{ и } \{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$$

ФСР ЛОДУ

$$L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + \dots + p_n y = 0$$

Тогда функция

$$y = C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_n \varphi_n(x)$$

описывает множество всех решений ЛОДУ $L(y) = 0$, то есть

$$1) \forall C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R} \quad y = C_1 \varphi_1 + \dots + C_n \varphi_n \text{ — решение } L(y) = 0$$

$$2) \forall y = \varphi^*(x) \text{ — решение } L(y) = 0. \text{ Тогда}$$

$$\exists C_1^*, \dots, C_n^* \in \mathbb{R} \quad x \in (a; b)$$

$$\varphi^*(x) = C_1^* \varphi_1 + \dots + C_n^* \varphi_n$$

Доказательство.

$$1) \text{ Дано } L(\varphi_1) = 0, \dots, L(\varphi_n) = 0$$

$$\forall C_1, \dots, C_n \quad L(C_1 \varphi_1 + \dots + C_n \varphi_n) = C_1 \underbrace{L(\varphi_1)}_{=0} + \dots + C_n \underbrace{L(\varphi_n)}_{=0}$$

$$\Rightarrow y = C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_n \varphi_n(x) \text{ — решение } L(y) = 0, x \in (a; b)$$

$$2) \text{ Пусть } y = \varphi^*(x) \text{ — решение } L(y) = 0 \quad x \in (a; b)$$

Возьмём точку $x_0 \in (a; b)$ и скажем, что

$$y_0 = \varphi_1^*(x_0), \dots, y_0^{(n-1)} = (\varphi_n^*)^{(n-1)}(x_0)$$

Тогда $y = \varphi^*(x)$ является решением задачи Коши

$$\begin{cases} L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + \dots + p_n(x) y = f(x) \\ y|_{x=x_0} = y_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

С другой стороны будем искать решение этой задачи Коши в виде $y = C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_n \varphi_n(x)$ тогда решение имеет вид

$$\begin{cases} C_1 \varphi_1(x_0) + \dots + C_n \varphi_n(x_0) = y_0 \\ C_1 \varphi_1'(x_0) + \dots + C_n \varphi_n'(x_0) = y_0' \\ \vdots \\ C_1 \varphi_1^{(n-1)}(x_0) + \dots + C_n \varphi_n^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

Это система n алгебраических уравнений относительно n переменных C_1, \dots, C_n , определитель которой $\Delta = W(x_0) \neq 0$, так как мы рассматриваем ФРС (система уравнений линейно независима по определению).

По т. Крамера следует, что существует решение и притом единственное, то есть

$$\exists(C_1^*, \dots, C_n^*)$$

Следовательно $y = C_1^* \varphi_1(x) + \dots + C_n^* \varphi_n(x)$ — решение задачи Коши для $\varphi^*(x)$ по теореме о существовании и единственности задачи Коши.

■

Теорема 14.2 (Об общем решении ЛНДУ n -го порядка). Пусть $p_1(x), \dots, p_n(x), f(x) \in (a; b)$ и $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ — ФРС ЛОДУ

$$L(y) = y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + \dots + p_n(x) y = 0 \quad x \in (a; b)$$

Обозначим через $\psi(x)$ некоторое решение ЛНДУ $L(y) = f(x)$. Тогда общее решение ЛНДУ имеет вид

$$y = \psi(x) + C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_n \varphi_n(x)$$

То есть

1) $\forall C_1, \dots, C_n \in \mathbb{R} \quad y = \psi + C_1 \varphi_1 + \dots + C_n \varphi_n$ является решением $L(y) = f(x)$

2) Для любого решения $\psi^*(x)$ ЛНДУ $L(y) = f(x)$
 $\exists C_1, \dots, C_n \quad x \in (a; b) \quad \psi^* = \psi + C_1^* \varphi_1 + \dots + C_n^* \varphi_n$

Доказательство.

$\forall x_0 \in (a; b), \exists y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)}, \psi(x)$ — решение задачи Коши

$$\begin{cases} L(y) = f(x) \\ y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y'_0, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)}, \end{cases}$$

По теореме о существовании и единственности задачи Коши

1) Аналогично доказательству выше имеем

$$\forall C_1, \dots, C_n \\ L(\psi + C_1 \varphi_1 + \dots + C_n \varphi_n) = \underbrace{L(\psi)}_{=f(x)} + C_1 \underbrace{L(\varphi_1)}_{=0} + \dots + C_n \underbrace{L(\varphi_n)}_{=0} = f(x)$$

2) $y = \psi^*(x)$ решение $L(\psi^*) = f(x)$, с другой стороны $L(\psi) = f(x)$ тоже решение (по усл.)

Тогда рассмотрим следующее выражение

$$L(\psi^* - \psi) = [\text{по св-ву лин. оп.}] = L(\psi^*) - L(\psi) = f(x) - f(x) = 0$$

Значит $L(\psi^* - \psi)$ — ЛОДУ. Следовательно по теореме 1 для ЛОДУ справедливо

$$\exists C_1^*, \dots, C_n^* \quad \forall x \in (a; b) \varphi^* = \psi^* - \psi = C_1^* \varphi_1 + \dots + C_n^* \varphi_n$$

Нетрудно заметить и вывести

$$\psi^* = \psi + C_1^* \varphi_1 + \dots + C_n^* \varphi_n$$

■

15. Метод вариации произвольных постоянных

Теорема 15.1. Пусть

$$p_1(x), \dots, p_n(x), f(x) \in C_{(a;b)}$$

и известна ФСР $\{\varphi_1(x), \dots, \varphi_n(x)\}$ ЛОДУ

$$L(y) = y^{(n)} + p_1 y^{(n-1)} + \dots + y p_n(x) = 0$$

Ищем ЛНДУ в виде $L(x) = f(x)$ в виде

$$y = C_1(x) \varphi_1(x) + \dots + C_n(x) \varphi_n(x)$$

где функции $\{C_1(x), \dots, C_n(x)\}$ дифференцируемые на $(a; b)$ и $\{C'_1(x), \dots, C'_n(x)\}$ удовлетворяет следующим свойствам алгебраических уравнений

$$\begin{cases} C'_1 \varphi'_1(x) + \dots + C'_n \varphi'_n(x) = 0 \\ C'_1 \varphi'_1(x) + \dots + C'_n \varphi'_n(x) = 0 \\ \vdots C'_1 \varphi_1^{(n-2)}(x) + \dots + C'_n \varphi_n^{(n-2)}(x) = 0 \\ C'_1 \varphi_1^{(n-1)}(x) + \dots + C'_n \varphi_n^{(n-1)}(x) = f(x) \end{cases}$$

Тогда такая система имеет решения

$$C'_1 = u_1(x), \dots, C'_n = u_n(x)$$

$$y = \varphi_1(x) \int u_1(x) dx + \dots + \varphi_n(x) \int u_n(x) dx + C_1 \varphi_1(x) + \dots + C_n \varphi_n(x)$$

где C_1, \dots, C_n — константы

Доказательство. Рассмотрим уравнение

$$y = C_1 \varphi_1 + \dots + C_n \varphi_n$$

Возьмём n производных, причём заметим, что φ , и C_1 зависимы от x .

Тогда получаем

$$\begin{array}{lcl}
p_n * | & y = C_1 \varphi_1 + \dots + C_n \varphi_n \\
p_{n-1} * | & y' = C_1 \varphi'_1 + \dots + C_n \varphi'_n + \underbrace{C'_1 \varphi_1 + \dots + C'_n \varphi_n}_{\equiv 0} \\
p_{n-2} * | & y'' = C_1 \varphi''_1 + \dots + C_n \varphi''_n + \underbrace{C'_1 \varphi'_1 + \dots + C'_n \varphi'_n}_{\equiv 0} \\
& \vdots \\
p_1 * | & y^{(n-2)} = C_1 \varphi_1^{(n-2)} + \dots + C_n \varphi_n^{(n-2)} + \underbrace{C'_1 \varphi_1^{(n-3)} + \dots + C'_n \varphi_n^{(n-3)}}_{\equiv 0} \\
1 * | & y^{(n-1)} = C_1 \varphi_1^{(n-1)} + \dots + C_n \varphi_n^{(n-1)} + \underbrace{C'_1 \varphi_1^{(n-2)} + \dots + C'_n \varphi_n^{(n-2)}}_{\equiv f(x)}
\end{array}$$

расписать

$$\begin{array}{lcl}
p_n * | & y = C_1 \varphi_1 + \dots + C_n \varphi_n \\
p_{n-1} * | & y' = C_1 \varphi'_1 + \dots + C_n \varphi'_n \\
p_{n-2} * | & y'' = C_1 \varphi''_1 + \dots + C_n \varphi''_n \\
& \vdots \\
p_1 * | & y^{(n-2)} = C_1 \varphi_1^{(n-2)} + \dots + C_n \varphi_n^{(n-2)} \\
1 * | & y^{(n-1)} = C_1 \varphi_1^{(n-1)} + \dots + C_n \varphi_n^{(n-1)} + f(x)
\end{array}$$

Сложим все функции, получим

$$L(y) = C_1 \underbrace{L(\varphi_1)}_{\equiv 0(\Phi CP)} + \dots + C_n \underbrace{L(\varphi_n)}_{\equiv 0(\Phi CP)} + f(x)$$

Таким образом $L(y) = f(x)$.

Рассмотрим

$$\begin{cases}
C'_1 \varphi_1 + \dots + C'_n \varphi_n = 0 \\
C'_1 \varphi'_1 + \dots + C'_n \varphi'_n = 0 \\
\vdots \\
C'_1 \varphi_1^{(n-3)} + \dots + C'_n \varphi_n^{(n-3)} = 0 \\
C'_1 \varphi_1^{(n-2)} + \dots + C'_n \varphi_n^{(n-2)} = f(x)
\end{cases}$$

Систему из n алгебраических уравнений относительно n переменных C'_1, \dots, C'_n . Видим, что определитель матрицы $W(x) \neq 0 \quad \forall x \in (a; b)$

(Т.к. $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ — ФСР). Следовательно, по теореме Крамера существует единственное решение

$$C'_1 = u_1(x), \dots, C'_n = u_n(x)$$

Таким образом

$$C_1(x) = \int u_1(x) dx + C_1, \dots, C_n(x) = \int u_n(x) dx + C_n$$

Значит решение ЛНДУ

$$y = \left(\int u_1(x) dx + C_1 \right) \varphi_1(x) + \dots + \left(\int u_n(x) dx + C_n \right) \varphi_n(x)$$

■

Замечание 15.1 (Нахождение произвольных постоянных и описание ответа).

Пользуясь методом Крамера $x_k = \frac{\Delta_k}{\Delta}$ получаем

$$\begin{aligned} u_k(x) &= \frac{1}{W(x)} \begin{bmatrix} \varphi_1 & \dots & 0 & \dots & \varphi_n \\ \varphi'_1 & \dots & 0 & \dots & \varphi'_n \\ \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\ \varphi_1^{(n-1)} & \dots & f(x) & \dots & \varphi_n^{(n-1)} \end{bmatrix} = \\ &= (-1)^{(k+n)} \frac{W(\varphi_1, \dots, \varphi_{k-1}, \varphi_{k+1}, \dots, \varphi_n)}{W(x)} f(x) = \\ &= \frac{(-1)^{(k+n)} f(x) W_k(x)}{W(x)} \end{aligned}$$

Вопрос. Почему функция от двух переменных?

Для описания решения введём

$$G(x, t) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k+n} \varphi_k(x) \frac{W_k(t)}{W(t)}$$

Тогда решение имеет вид

$$y = \underbrace{\int_{x_0}^x G(x, t) f(t) dt}_{y_{\text{ч.н.}}} + \underbrace{\sum_{k=1}^n C_k \varphi_k(x)}_{y_{\text{о.о.}}}$$

Пример 15.1. Дано

$$x y'' + y' = x$$

Решение.

Приведём к каноническому виду (делим на x)

$$y'' + \frac{y'}{x} = 1$$

Получили $L(y)$. Решаем в два этапа

1) Рассматриваем однородное уравнение $L(y) = 0$

$$y'' + \frac{y'}{x} = 0$$

$$y' = z, \quad y'' = z'$$

$$z' + \frac{z}{x} = 0$$

$$\int \frac{dz}{z} = - \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln|z| = -\ln|x| + \ln C_1$$

$$z = y' = \frac{C_1}{x}$$

$$y = y_{o.o.} = C_1 \ln|x| + C_2 - y_0$$

2) Решаем неоднородное уравнение с произвольными постоянными $C_1(x)$, $C_2(x)$
и φ_1 , φ_2

$$y = C_1(x) \ln|x| + C_2(x)$$

$$\varphi_1 = \ln|x|, \quad \varphi_2 = 1$$

$$\varphi_1' = \frac{1}{x}, \quad \varphi_2' = 0$$

Накладываем 1 дополнительное условие (т.к. можем Почему?)

$$C_1' \ln|x| + C_2' = 0$$

$$\begin{cases} C_1' \ln|x| + C_2' = 0 \\ C_1' \frac{1}{x} + C_2' = 0 \end{cases} \quad (\text{Из условия})$$

Решаем, получаем

$$\begin{cases} C_1' \ln|x| + C_2' = 0 \\ C_1' \frac{1}{x} = 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_2' = -C_1' \ln|x| \\ C_1' = x \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_2' = -x \ln|x| \\ C_1(x) = \frac{x^2}{2} + C_1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} C_2(x) = -\int x \ln|x| dx \\ C_1(x) = \frac{x^2}{2} + C_1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} C_2(x) &= -\int x \ln|x| dx = \left[u = \ln|x|, \quad dv = x dx; \quad du = \frac{1}{x}, \quad v = \frac{x^2}{2} \right] = \\ &= -\frac{x^2}{2} \ln|x| + \frac{x^2}{4} + C_2 \end{aligned}$$

Зная значения $C_1(x)$ и $C_2(x)$ получаем

$$y = \frac{x^2}{2} \ln|x| - \frac{x^2}{2} \ln|x| + \frac{x^2}{4} + C_1 \ln|x| + C_2$$

Ответ

$$y = \frac{x^2}{4} + C_1 \ln|x| + C_2$$

16. Лин. диф. ур-я n-го порядка с постоянными коэффициентами

Определение 16.1. ДУ вида

$$L(y) = y^{(n)} + a_1(x) y^{(n-1)} + a_{n-1}(x) y' + \dots + a_n(x) y = f(x)$$

где $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$ (постоянные), $f(x) \in C_{(a;b)}$ называются линейные ДУ n-го порядка с постоянными коэффициентами (т.е. не зависящих от x)

Замечание 16.1 (Основа метода реш. ДУ $L(y) = 0$). Ищем решения вида

$$\begin{array}{l|l} a_n & y = e^{\alpha x} \\ a_{n-1} & y' = \alpha e^{\alpha x} \\ & \vdots \\ a_1 & y^{(n-1)} = \alpha^{n-1} e^{\alpha x} \\ 1 & y^{(n)} = \alpha^n e^{\alpha x} \end{array}$$

Складываем, получаем

$$L(y) = e^{\alpha x} P(\alpha), \quad \text{где} \quad P(\alpha) = \alpha^n + a_1 \alpha^{n-1} + \dots + a_n$$

По условию $e^{\alpha x}$ решение $L(y) = 0$. Это равносильно следующему утверждению. $P(\alpha) = 0$, то есть α - корень многочлена $P(\lambda)$, где λ - переменная

Определение 16.2. Пусть

$$L(y) = y^{(n)} + a_1(x) y^{(n-1)} + a_{n-1}(x) y' + \dots + a_n(x) y = 0$$

— ЛОДУ с постоянными коэффициентами a_1, \dots, a_n

Тогда многочлен

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n$$

называется характеристическим многочленом ЛОДУ $L(y) = 0$

Теорема 16.1 (ФСР, случай простых корней $P(\lambda)$). Пусть

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n$$

— характеристический многочлен ЛОДУ $L(y) = 0$ с постоянными коэффициентами

Тогда если все корни $P(\lambda)$ вещественны и различны, то есть $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$ корни $P(\lambda)$ причём $\alpha_i \neq \alpha_j (i \neq j)$ то ФСР $L(y) = 0$ выглядит так

$$\{e^{\alpha_1 x}, e^{\alpha_2 x}, \dots, e^{\alpha_n x}\}$$

Доказательство. Для начала напомним определение ФСР

- 1) $L(e^{\alpha_i x}) = 0 \quad i = 1, \dots, n$
- 2) ϕ -и n -штук равно порядку ДУ $L(y) = 0$
- 3) $\{e^{\alpha_1 x}, e^{\alpha_2 x}, \dots, e^{\alpha_n x}\}$ - линейно не зависима

Справедливость пункта 1 следует из замечания 1, соблюдение 2 – из условия. Значит требуется доказать корректность пункта 3.

Последнее будем доказывать от противного. Пусть система линейно зависима и тогда один из коэффициентов $C_1 \neq 0$. Рассмотрим

$$\begin{aligned} C_1 e^{\alpha_1 x} + \dots + c_n e^{\alpha_n x} &\equiv 0 \quad | \div e^{\alpha_1 x} \\ C_1 e^{(\alpha_1 - \alpha_n)x} + \dots + C_{n-1} e^{(\alpha_{n-1} - \alpha_n)x} &\equiv 0 \quad | \text{Дифференцируем} \\ C_1 (\alpha_1 - \alpha_n) e^{(\alpha_1 - \alpha_n)x} + \dots + C_{n-1} (\alpha_{n-1} - \alpha_n) e^{(\alpha_{n-1} - \alpha_n)x} &\equiv 0 \end{aligned}$$

Опять делим и дифференцируем, и так до тех пор пока не получим

$$C_1 \underbrace{(\alpha_1 - \alpha_n)}_{\neq 0} \underbrace{(\alpha_1 - \alpha_{n-1})}_{\neq 0} \dots \underbrace{(\alpha_1 - \alpha_2)}_{\neq 0} e^{(\alpha_1 - \alpha_n)x} \equiv 0$$

Разности не равны нулю, так как все корни различны. Тогда остаётся только $C_1 = 0$, но в самом начале мы сказали, что $C_1 \neq 0$, получаем противоречие.

Значит $C_1 = \dots = C_n = 0$, следовательно система линейно не зависима, и она ФСР ■

Пример 16.1. Дано

$$y''' - 3y'' + 2y' = 0$$

Решение

$$P(\lambda) = \lambda^3 - 3\lambda^2 + 2\lambda = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 2)$$

Таким образом, корни $P(\lambda)$

$$\lambda_1 = 1 \quad \lambda_2 = 0 \quad \lambda_3 = 2$$

Значит ФСР и общее решение выглядят следующим образом

$$\{1, e^x, e^{2x}\} \quad y = c_1 + c_2 e^x + c_3 e^{2x}$$

Замечание 16.2 (Напоминание). Характеристический многочлен

$$P(\lambda) = (\lambda - \alpha_1)^{k_1} \dots (\lambda - \alpha_s)^{k_s} (\lambda^2 + p_1\lambda + q_1)^{m_1} \dots (\lambda^2 + p_t\lambda + q_t)^{m_t}$$

разложенный на линейные и квадратные корни, где

1) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ все попарно различные вещественные корни соответствующей кратности k_1, \dots, k_s $s \geq 0$ $s \in \{N \cup \{0\}\}$

2) Комплексные корни

$$\lambda^2 + p\lambda + q = (\lambda - z_j)(\lambda - \bar{z}_j)$$

$$z_j = \alpha_{s+j} + i\beta_j \quad \bar{z}_j = \alpha_{s+j} - i\beta_j \quad \beta_j \geq 0$$

$\alpha(z_j \bar{z}_j)$ — попарно различные пары комплексно сопряжённых корней кратности m_j $j = 1, \dots, t$ $t \geq 0$ $t \in \{N \cup \{0\}\}$

Замечание 16.3. Помним про критерий кратности из 2-го семестра (Потребуется позже)

Лемма 16.1 (о действии линейного ДУ оператора на произведение).
Пусть

$$L(y) = y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_{n-1} y' + \dots + a_n y \quad y^{(n)} \mapsto \lambda^k \quad y \mapsto 1$$

Характеристический многочлен

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n$$

Тогда $\forall \alpha \in \mathbb{R}$ и $\forall u(x)$ — n раз дифференцируемой справедлива формула

$$L(u(x) e^{\alpha x}) = e^{\alpha x} (u(x) P(\alpha) + \frac{1}{1!} u'(x) P'(\alpha) + \dots + \frac{1}{2!} u''(x) P''(\alpha) + \dots + \frac{1}{n!} u^{(n)}(x) P^{(n)}(\alpha))$$

Доказательство. Докажем случай для $n=2$
Тогда.

$$\begin{array}{l|l} a_2 & y = u e^{\alpha x} \\ a_1 & y = u' e^{\alpha x} + u \alpha e^{\alpha x} \\ 1 & y'' = u'' e^{\alpha x} + 2 u' \alpha e^{\alpha x} + u \alpha^2 e^{\alpha x} \end{array}$$

Складываем всё и получаем

$$\begin{aligned} a_2 y + a_1 y' + y'' &= e^{\alpha x} (a_2 u + a_1 u' + a_1 u \alpha + u'' + 2 u' \alpha + u \alpha^2) \\ L(y) &= e^{\alpha x} (a_2 u + u \alpha^2 + a_1 u \alpha + a_1 u' + 2 u' \alpha + u'') \\ L(y) &= e^{\alpha x} (u (\alpha^2 + a_1 \alpha + a_2) + u' (2 \alpha + a_1) + u'') \end{aligned}$$

Очевидно, что производные характеристического многочлена выглядят так

$$\begin{aligned} P_n(\lambda) &= \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n \\ P'_n(\lambda) &= n \lambda^{n-1} + a_1 (n-1) \lambda^{n-2} + \dots + a_{n-1} \\ P''_n(\lambda) &= n(n-1) \lambda^{n-2} + a_1 (n-1)(n-2) \lambda^{n-3} + \dots + 2! a_{n-2} \\ &\vdots \\ P_n^{(n)}(\lambda) &= n! \end{aligned}$$

Значит

$$L(y) = e^{\alpha x} (u P(\alpha) + u' P'(\alpha) + \frac{1}{2} u'' P''(\alpha))$$

■

Теорема 16.2. Пусть α корень кратности $k \geq 1$ характеристического многочлена $P(\lambda)$ ЛОДУ

$$L(y) = y^{(n)} + a_1 y^{(n-1)} + a_{n-1} y' + \dots + a_n y = 0$$

с постоянными коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

Тогда функции

$$\underbrace{\{e^{\alpha x}, x e^{\alpha x}, \dots, x^{k-1} e^{\alpha x}\}}_{k \text{ штук}}$$

образуют линейно зависящую систему решений $L(y) = 0$

Доказательство. Пусть решение

$$y = x^l e^{\alpha x} \quad 0 \leq l \leq k-1$$

Рассмотрим

$$\begin{cases} u = x^l, & u' = l x^{l-1}, & \dots, & u^{(l)} = l!, & u^{(l+1)} = 0, & \dots, & u^{(n)} = 0 \\ P(\alpha) = 0, & \dots, & P^{(l)}(\alpha) = 0, & P^{(l+1)}(\alpha) = \text{something}, & \dots, & P^{(n)}(\alpha) = \text{something} \end{cases}$$

Умножим по столбцам и сложим, получим.

Требуется более подробный переход

$$L(y) = e^{\alpha x} \left(x^l \cdot 0 + \frac{l x^{l-1} \cdot 0}{1!} + \dots + \frac{0 \cdot l!}{l!} + \frac{0 \cdot p^{(l+1)}(\alpha)}{(l+1)!} + \dots + \frac{0 \cdot p^{(n)}(\alpha)}{n!} \right) = e^{\alpha x} \cdot 0 = 0$$

Получается что $e^{\alpha x} x^l$ решение $L(y) = 0$

Так как $0 \geq l \geq k-1$ получаем

$$C_1 e^{\alpha x} + C_2 x e^{\alpha x} + \dots + C_k x^{k-1} e^{\alpha x} = 0$$

так как $e^{\alpha x}$ общий множитель и он не равен нулю, тогда

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad C_1 + C_2 x + \dots + C_n x^{n-1} = 0$$

Очевидно, что сумма будет всегда равна тогда и только тогда, когда

$$C_1 = C_2 = \dots = C_n = 0$$

Значит система

$$\{e^{\alpha x}, x e^{\alpha x}, \dots, x^{k-1} e^{\alpha x}\}$$

— ЛНЗ система ■

Теорема 16.3 (Вклад в ФСР вещественных корней). Если в условиях теоремы 2 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ вещественные корни характеристического многочлена $P(\lambda)$ кратности k_1, \dots, k_s то набор функций

$$\{e^{\alpha_1 x}, x e^{\alpha_1 x}, \dots, x^{k_1-1} e^{\alpha_1 x}, \dots, e^{\alpha_s x}, x e^{\alpha_s x}, \dots, x^{k_s-1} e^{\alpha_s x}\}$$

образуют ЛНЗ систему решений ДУ $L(y) = 0$

Доказательство. Данные функции являются решениями $L(y) = 0$ (по теореме 2). Таким образом, остаётся доказать их ЛНЗ на \mathbb{R} .

Предположим, что линейная комбинация этих функций равна нулю

$$\forall x \in \mathbb{R} \quad P_1(x) e^{\alpha_1 x} + \dots + P_s(x) e^{\alpha_s x} = 0$$

Доказывать ЛНЗ системы будем от противного.

$$P_1(x) = C_0 x^k + \dots, \quad C_0 \neq 0 \quad k \leq k_1 - 1$$

Разделим линейную комбинацию на $e^{\alpha_s x}$, получим

$$P_1(x) e^{(\alpha_1 - \alpha_s)x} + \dots + P_s(x) \equiv 0 \quad \deg P_s \leq k_s - 1$$

k_s раз дифференцируем, получаем

$$Q_1(x) e^{(\alpha_1 - \alpha_s)x} + \dots + Q_{s-1}(x) e^{(\alpha_{s-1} - \alpha_s)x} \equiv 0$$

старший коэффициент Q_1 равен

$$0 (\alpha_1 - \alpha_s)^{k_s} \neq 0$$

аналогично для последующих старших коэффициентов.

Непонятно что происходит дальше

и т.д. $k_1(x) e^{(\alpha_1 - \alpha_s)x} \equiv 0$ ст.коэф. $\Rightarrow R_1 \equiv 0$

$R_1 = c_0(\alpha_1 - \alpha_s)^{k_s}(\alpha_1 - \alpha_{s-1})^{k_{s-1}} \dots (\alpha_1 - \alpha_2)^{k_2} \neq 0, \deg R = k \Rightarrow R \neq 0$

Противоречие

$\Rightarrow P_1 \equiv 0, \dots, P_s \equiv 0 \Rightarrow$ ф. дан. сис. ЛНЗ

■

Пример 16.2. Дано

$$y^{(5)} + 2y^{(4)} + y^{(3)} = 0$$

Решение.

Характеристический многочлен для этого уравнения следующий

$$P(\lambda) = \lambda^5 + 2\lambda^4 + \lambda^3 = \lambda^3(\lambda + 1)^2$$

Получаем для него корни α с кратностями k

$$\alpha_1 = 0, k_1 = 3 \quad \alpha_2 = -1, k_2 = 2$$

Значит ФСР

$$\{1, x, x^2, e^{-x}, x e^{-x}\}$$

А общее решение ЛОДУ

$$y = C_1 + C_2 x + C_3 x^2 + (C_4 + C_5 x) e^{-x}$$

17. Случай комплексных корней характеристического многочлена. Общий случай построения ФСР

Определение 17.1 (Комплексное число).

$$\alpha, \beta \in \mathbb{R} \quad \alpha + \beta i \in \mathbb{C}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Представление комплексного числа

$$e^{(\alpha + \beta i)x} = e^{\alpha x} (\cos(\beta x) + i \sin(\beta x))$$

Замечание

$$e^{z_1 + z_2} = e^{z_1} e^{z_2}$$

Определение 17.2. Пусть $u = u(x)$, $v = v(x)$ — функции вещественных переменных x , тогда

$$z = u(x) + i v(x) \quad x \in \mathbb{R}$$

— комплексная функция от вещественных аргументов.

А также

$$(u + i v)'_x = u'_x + i v'_x$$

Замечание 17.1.

$$L(u + i v) = L(u) + i L(v)$$

Замечание 17.2.

$$(e^{(\alpha + i \beta)x})'_x = (\alpha + i \beta) e^{(\alpha + i \beta)x}$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} (e^{(\alpha + i \beta)x})'_x &= [\text{опр. 1}] = (e^{\alpha x} \cos(\beta x) + i e^{\alpha x} \sin(\beta x))'_x = \\ &= (e^{\alpha x} \cos(\beta x))'_x + i (e^{\alpha x} \sin(\beta x))'_x = \\ &= e^{\alpha x} (\alpha \cos(\beta x) - \beta \sin(\beta x)) + i e^{\alpha x} (\alpha \sin(\beta x) + \beta \cos(\beta x)) \end{aligned}$$

С другой стороны

$$\begin{aligned} (\alpha + i \beta) e^{(\alpha + i \beta)x} &= [\text{опр. 1}] = (\alpha + i \beta) e^{\alpha x} (\cos(\beta x) + i \sin(\beta x)) = \\ &= e^{\alpha x} (\alpha \cos(\beta x) - \beta \sin(\beta x)) + i e^{\alpha x} (\alpha \sin(\beta x) + \beta \cos(\beta x)) \end{aligned}$$

■

Теорема 17.1. Пусть $\alpha \pm i\beta$ — пара комплексно сопряжённых корней характеристического многочлена $P(\lambda)$, ($\beta > 0$) кратности $m \geq 1$ ЛОДУ $L(y) = 0$ с постоянными коэффициентами (как в §12). Тогда функции

$$\{e^{\alpha x} \cos(\beta x), x e^{\alpha x} \cos(\beta x), \dots, x^{m-1} e^{\alpha x} \cos(\beta x), \\ e^{\alpha x} \sin(\beta x), x e^{\alpha x} \sin(\beta x), \dots, x^{m-1} e^{\alpha x} \sin(\beta x)\}$$

Образуют систему $2m$ линейно независимых решений ЛОДУ $L(y) = 0$

Доказательство. Доказательство аналогично доказательству теоремы 2 из предыдущего параграфа.

По условию

$$L(x^l e^{(\alpha+i\beta)x}) = 0 \quad 0 \leq l \leq m-1$$

Тогда корень

$$y = x^l e^{(\alpha+i\beta)x} = x^l e^{\alpha x} (\cos(\beta x) + i \sin(\beta x))$$

В более общем виде (по определению 2) корень

$$y = u + i v$$

Тогда по свойству линейного оператора для комплексного числа получаем

$$L(u + i v) = L(u) + i L(v)$$

Так как $L(y) = 0$, то тогда и слагаемые, его составляющие также равны нулю. Значит

$$u = x^l e^{\alpha x} \cos(\beta x) \quad v = x^l e^{\alpha x} \sin(\beta x)$$

Являются решениями ЛОДУ $L(y) = 0$.

Данные функции ЛНЗ над областью \mathbb{C} . Значит тем более функции ЛНЗ над $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. ■

Теорема 17.2 (Построение ФСР ЛОДУ n -го порядка с $const$ коэф). Пусть

$$P(\lambda) = (\lambda + \alpha_1)^{k_1} \dots (\lambda + \alpha_s)^{k_s} (\lambda^2 + p_1 \lambda + q_1)^{m_1} \dots (\lambda^2 + p_t \lambda + q_t)^{m_t}$$

характеристический многочлен ЛОДУ n -го порядка с постоянными коэффициентами

$$P(\lambda) = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_n, \quad L(y) = y^n + a_1 y^{n-1} + \dots + a_n$$

$\alpha_1, \dots, \alpha_s$ — попарно различные вещественные корни $P(\lambda)$ кратности k_1, \dots, k_s соответственно ($s \geq 0$).

$(\lambda^2 + p\lambda + q)^m = (\lambda - z)(\lambda - \bar{z})$ пары $(z_1, \bar{z}_1) \dots (z_t, \bar{z}_t)$ — все попарно различные корни кратности m_1, \dots, m_t соответственно ($t \geq 0$)

Замечание.

$$z_j = \alpha_{s+j} + i\beta_j \quad \beta_j > 0 \quad \bar{z}_j = \alpha_{s+j} - i\beta_j$$

Тогда

1) Если $\alpha \in \mathbb{R}$, корень кратности k , для $P\lambda$, тогда

$$\{e^{\alpha x}, x e^{\alpha x}, \dots, x^{k-1} e^{\alpha x}\}$$

2) Если $\alpha \pm i\beta$, пара комплексно сопряжённых корней кратности $m \geq 1$, тогда

$$\{e^{\alpha x} \cos(\beta x), x e^{\alpha x} \cos(\beta x), \dots, x^{m-1} e^{\alpha x} \cos(\beta x), \\ e^{\alpha x} \sin(\beta x), x e^{\alpha x} \sin(\beta x), \dots, x^{m-1} e^{\alpha x} \sin(\beta x)\}$$

Всего будет $k_1 + \dots + k_s + 2m_1 + \dots + 2m_t = n$ решений. Все они образуют ФСР $L(y) = 0$

Доказательство. Все эти n функций являются решением $L(y) = 0$. Их количество равно порядку ДУ $L(y) = 0$. Эти функции образуют ЛНЗ систему, так как функции

$$e^{\alpha_1 x}, \dots, x^{k_1-1} e^{\alpha_1 x}, \dots, e^{(\alpha_{s+1} \pm i\beta_1)x}, \dots, e^{(\alpha_{s+t} \pm i\beta_t)x} x^{m_t-1}$$

ЛНЗ на \mathbb{C} , следовательно они ЛНЗ на \mathbb{R} . Таким образом они образуют ФСР. ■

Пример 17.1. Дано

$$P(\lambda) = \lambda^2 (\lambda - 2)^3 (\lambda + 1)^4 (\lambda^2 + 2\lambda + 2)^2$$

Решение.

Видим, что корни характеристического многочлена имеют соответствующие кратности

$\alpha_1 = 0$	$\alpha_2 = 2$	$\alpha_3 = -1$	$\alpha \pm i\beta = -2 \pm i$
$k_1 = 2$	$k_2 = 3$	$k_3 = 4$	$m_1 = 2$

Тогда ФСП

$$\{1, x, e^{2x}, x e^{2x}, x^2 e^{2x}, e^{-x}, x e^{-x}, x^2 e^{-x}, x^3 e^{-x}, \\ e^{-2x} \cos(x), e^{-2x} \sin(x), x e^{-2x} \cos(x), x e^{-2x} \sin(x)\}$$

$$n = 2 + 3 + 4 + 2 \cdot 2 = 13$$

Тогда общее решение выглядит так

$$y = C_1 + C_2 x + (C_3 + C_4 x + C_5 x^2) e^{2x} + (C_6 + C_7 x + C_8 x^2 + C_9 x^3) e^{-x} + \\ + (C_{10} + C_{11} x) e^{-2x} \cos(x) + (C_{12} + C_{13} x) e^{-2x} \sin(x)$$

18. Метод неопределённых коэф. для отыскания частного решения ЛОДУ n-го порядка с пост. коэф.

В параграфе рассмотрим уравнения вида

$$L(y) = P_m(x)e^{\alpha x} \quad L(y) = P_m(x)e^{\alpha x} \cos \beta x \quad L(y) = Q_m(x)e^{\alpha x} \sin x$$

Теорема 18.1 (О суперпозиции частных решений). Пусть $y_1(x), \dots, y_k(x)$ - это частные решения соответствующих (1 к 1) ЛНДУ вида $L(y) = f_1(x), \dots, L(y) = f_k(x)$

Тогда для ЛНДУ вида

$$L(y) = A_1 f_1(x) + \dots + A_k f_k(x) \quad A_1, \dots, A_k \in \mathbb{R}$$

имеет частное решение вида

$$y = A_1 y_1(x) + \dots + A_k y_k(x)$$

Доказательство. Дано:

$$L(y) = f_1(x), \dots, L(y) = f_k(x)$$

Тогда свойству линейного оператора

$$L(A_1 y_1(x) + \dots + A_k y_k(x)) = A_1 L(y_1) + \dots + A_k L(y_k) = A_1 f_1(x) + \dots + A_k f_k(x)$$

■

Лемма 18.1 (Алгебраическая). Пусть

$$Q_m(x) = C_0 x^m + C_1 x^{m-1} + \dots + C_m \quad C_0 \neq 0$$

многочлен степени $m \geq 0$.

Тогда для любых чисел $\delta_0 \neq 0, \delta_1, \dots, \delta_n$ существует многочлен

$$u(x) = u_m(x) = A_0 x^m + \dots + A_n$$

степени m для которого

$$\delta_0 u + \delta_1 u' + \dots + \delta_n u^{(n)} = Q_m(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

То есть

$$C_0 x^m + C_1 x^{m-1} + \dots + C_m \equiv \delta_0 u + \delta_1 u' + \dots + \delta_n u^{(n)}$$

Доказательство. Для доказательства достаточно рассмотреть случай $m = n$ так как

1) если $n < m$, то возьмём набор (так как числа любые по условию)

$$\delta_{n+1} = \dots = \delta_m = 0$$

тогда многочлен $u_m(x)$ содержит n слагаемых

2) если $n > m$, то

$$u^{(m+1)} = 0, \dots, u^{(n)} = 0$$

так как многочлен $Q(x)$ степени m (по условию). Это всё значит, что

$$\delta_0 u + \delta_1 u' + \dots + \delta_n u^{(n)} \equiv Q_m(x)$$

два случая выше сводятся к $m = n$.

Для начала выразим коэффициенты C_m, \dots, C_1 из $Q_m(x)$, получим

$$C_m = Q_m(x), \quad 1! C_{m-1} = Q'_m(x), \quad \dots, \quad m! C_0 = Q^{(m)}(x)$$

Примечание. Последние не нулевые слагаемые у производных дают коэффициент в виде на постоянной i умноженной на факториал (из-за взятия производной у x^i)

Также по условию для $Q(x)$ и его производных существуют такие равенства

$$\begin{aligned} Q_m(x) &= \delta_0 u(x) + \delta_1 u'(x) + \dots + \delta_m u^{(m)}(x) \\ Q'_m(x) &= \delta_0 u'(x) + \delta_1 u''(x) + \dots + \delta_{m-1} u^{(m)}(x) + 0 \\ &\vdots \\ Q^{(m)}_m(x) &= \delta_0 u^{(m)}(x) \end{aligned}$$

Если мы подставим в качестве аргумента ноль в функцию $u(x)$ и аналогично способу выше выразим A_m, \dots, A_0 , то получим

$$A_m = u(0), \quad 1! A_{m-1} = u'(0), \quad \dots, \quad m! A_0 = u^{(m)}(0)$$

Теперь объединим всё таким образом, чтобы остались только C_i, δ_i, A_i , получим систему

$$\begin{cases} C_m = \delta_0 A_m + \delta_1 A_{m-1} + \dots + m! \delta_m A_0 \\ 1! C_{m-1} = 1! \delta_0 A_{m-1} + \delta_1 A_{m-1} + \dots + m! \delta_{m-1} A_0 \\ \vdots \\ m! C_0 = m! \delta_0 A_0 \end{cases}$$

это алгебраическая система из $(m+1)$ уравнений относительно $(m+1)$ переменных A_0, A_1, \dots, A_m и определитель

$$\Delta = \begin{vmatrix} \delta_0 & * & * & * \\ 0 & 1! \delta_0 & * & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & m! \delta_m \end{vmatrix} = [\text{по свойству треугольной матрицы}] = \delta_0^{(m+1)} 1! 2! \dots m!$$

Так как $\delta_0 \neq 0$ (по условию), то $\Delta \neq 0$. Тогда по теореме Крамера существует единственное решение в виде A_0, A_1, \dots, A_m и

$$\exists u(x) \quad \forall x \in \mathbb{R} \quad \delta_0 u + \delta_1 u' + \dots + \delta_n u^{(n)} = Q_m(x)$$

■

Теорема 18.2. Пусть

$$L(y) = y^{(n)} + \alpha_1 y^{(n-1)} + \dots + \alpha_n y = Q_m(x) e^{\alpha x}$$

ЛНДУ n -го порядка с постоянными коэффициентами a_1, \dots, a_n и правой частью специального вида $Q_m(x) e^{\alpha x}$, где

$$Q_m(x) = C_0 x^m + C_1 x^{m-1} + \dots + C_m \quad C_0 \neq 0, \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

— многочлен степени $m \geq 0$.

Обозначим через $P(\lambda)$ характеристический многочлен этого ДУ и положим $k = 0$, если $P(\alpha) \neq 0$ и k - кратность корня характеристического многочлена $P(\lambda)$, если $P(\alpha) = 0$

Тогда существует многочлен $u(x) = A_0 x^m + \dots + A_m$ степени m для которого $y = x^k e^{\alpha x} u(x)$ является частъ решения ЛНДУ $L(y) = Q_m(x) e^{\alpha x}$

Доказательство. Так как k описывает кратность корня характеристического многочлена, то очевидно, что по критерию кратности корня следует

- Если $k = 0$, то $P(\alpha) \neq 0$
- Если $k \geq 1$, то $P(\alpha) = 0, \dots, P^{(k-1)}(\alpha) = 0, P^{(k)}(\alpha) \neq 0$

Как получили равенство ниже? (Похоже на пар.12 т.2)

$$L(V(x) e^{\alpha x}) = e^{\alpha x} (V(x) P(\alpha) + \dots + \frac{1}{(k-1)!} V^{(k-1)}(x) P^{(k-1)}(\alpha) + \frac{1}{k!} V^{(k)}(x) P^{(k)}(\alpha) + \dots + \frac{1}{n!} V^{(n)}(x) P^{(n)}(\alpha))$$

Обозначим

$$\delta_0 = \frac{1}{k!} P^{(k)}(\alpha) \neq 0, \quad \delta_1 = \frac{1}{(k+1)!} P^{(k+1)}(\alpha) \neq 0, \quad \dots, \quad \delta_{n-k} = \frac{1}{n!} P^{(n)}(\alpha)$$

тогда по лемме выше получаем

$$\begin{aligned} \exists \omega(x) = B_0 x^m + \dots + B_m \\ \forall x \in R \quad \delta_0 \omega(x) + \delta_1 \omega'(x) + \dots + \delta_{n-k} \omega^{(n-k)}(x) = Q_m(x) \end{aligned}$$

Или последнее равенство в другом виде

$$L(V(x) e^{\alpha x}) = e^{\alpha x} (\delta_0 \omega + \delta_1 \omega' + \dots + \delta_{n-k} \omega^{(n-k)})$$

Тогда нетрудно заметить, что $V^{(k)}(x) = \omega(x)$. Также знаем, что (Откуда?)

$$V|_{x=x_0} = 0, \quad \dots, \quad V^{(k-1)}|_{x=x_0} = 0$$

Тогда

$$V(x) = A_0 x^{m+k} + \dots + A_m x^k = x^k u(x) \quad u(x) = A_1 x^m + \dots + A_m$$

Таким образом

$$L(x^k u(x) e^{\alpha x}) = e^{\alpha x} (\delta_0 \omega(x) + \delta_1 \omega'(x) + \dots + \delta_{n-k} \omega^{(n-k)}(x)) = e^{\alpha x} Q_m(x) \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

Значит $y = x^k u(x) e^{\alpha x}$ — частное решение $L(y) = Q_m e^{\alpha x}$

■

Пример 18.1. Дано:

$$y'' - 2y' + y = 12x e^x$$

Решение:

$$\begin{aligned} L(y) &= Q_1(x) e^x \\ Q_1(x) &= 12x, \quad \alpha = 1, \quad m = 1 \end{aligned}$$

1) Решаем однородное

$$\begin{aligned} P(\lambda) &= \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2 \\ \lambda_1 &= 1, \quad k_1 = 2 \\ \lambda &= \lambda_1 \Rightarrow k = 2 \\ y_{o.o} &= C_1 e^x + C_2 x e^x \end{aligned}$$

2) Из шага 1 знаем, что $k = 2$, также из условия $m = 1, \quad \alpha = 1$.
По теореме 2 получаем следующее решение

$$\begin{aligned} \psi(x) &= x^2 (Ax + B) e^x \\ V &= Ax^3 + Bx^2 \quad p = (\lambda - 1)^2 = 0 \\ V' &= 3Ax^2 + 2Bx \quad \frac{p'}{1!} = 2(\lambda - 1) = 0 \\ V'' &= 6Ax + 2B \quad \frac{p''}{2!} = 1 = 1 \end{aligned}$$

столбец при $\lambda = 1$

$$\begin{aligned} L(Ve^x) &= e^x (0 \cdot 0 + V' \cdot 0 + (6Ax + 2B) \cdot 1) = 12x e^x \\ 6Ax + 2B &= 12x \Rightarrow A = 2, B = 0 \end{aligned}$$

Значит частное неоднородное решение

$$\psi(x) = 2x^3 e^x = y_{ч.н}$$

3) Таким образом общее решение

$$y = (2x^3 + C_1 + C_2 x)e^x$$

Теорема 18.3. Пусть

$$L(y) = y^{(n)} + \alpha_1 y^{(n-1)} + \dots + \alpha_n y = Q_m(x) \cos(\beta x) + R_m(x) e^{\beta x}$$

где $Q_m(x), R_m(x)$ - многочлены степени $\leq m$,

$$\alpha + \beta i \in \mathbb{C}, \quad \beta \neq 0$$

Если

$$P(\lambda) = \lambda^n + \alpha_1 \lambda^{n-1} + \dots + \alpha_n$$

— характеристический многочлен то

- если $k = 0$, то

$$P(\alpha + \beta i) \neq 0$$

- k — кратность корня $\alpha + \beta i$, если $P(\alpha + \beta i) = 0$

То тогда

$$\exists \quad u(x) = A_0 x^m + \dots + A_m, \quad v(x) = B_0 x^m + \dots + B_m$$

— многочлены степени $\leq m$ для которых

$$\psi(x) = x^k e^{\alpha x} (u(x) \cos(\beta x) + V \sin(\beta x))$$

является решением ЛНДУ

$$L(y) = e^{\alpha x} (Q_m(x) \cos(\beta x) + R_m(x) \sin(\beta x))$$

Доказательство. Рассмотрим вспомогательное ДУ

$$L(y) = (Q_m - i R_m) e^{(\alpha + i\beta)x}$$

$$\operatorname{Re}(Q_m - i R_m) e^{(\alpha + i\beta)x} = e^{\alpha x} (Q_m \cos(\alpha x) + R_m \sin(\beta x))$$

По предыдущей теореме 2, следует что существуют мн-ны степени $\leq m$,

$$u(x) - \omega(x) = \underbrace{x^m + \dots + A_m}_u - i \underbrace{(B_0 x^m + \dots + B_m)}_v$$

такой что

$$y(x) = x^k (u - i v) e^{(\alpha + i\beta)x}$$

является решением вспомогательного уравнения

$$L(y) = (Q_m - i R_m) e^{(\alpha + i\beta)x}$$

Непонятно!

$$\psi(x) - \operatorname{Re}(y(x)) = x^k e^{\alpha x} (u(x) \cos \beta x + V(x) \sin \beta x)$$

является решением

$$L(y) = \operatorname{Re}(Q_m - i R_m) e^{(\alpha + i\beta)x} = e^{\alpha x} (Q_m \cos \alpha x + Q_m \sin \beta x)$$

■

Пример 18.2. Дано:

$$y'' - 2y' + y = 4x \cos(x)$$

Решение:

Разобрать!!!

1) Ищем общее однородное

$$P(\lambda) = \lambda^2 + 1$$

$$\lambda_{1,2} = \alpha \pm i\beta = \pm i \Rightarrow \alpha = 0, \quad \beta = 1 \quad k_{1,2} = 1$$

$$y_{o.o} = C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)$$

2) Ищем частное решение $y'' + y = 4x \cos(x)$

$$m = 1, \quad \alpha \pm \beta i = \pm i, \quad k = 1$$

$$\psi(x) = x(Ax + B)e^{ix} = ue^{ix}$$

$$L(ue^{ix}) = e^{ix}(uP(i) + u'p'(i) + \frac{u''}{2}P''(i))$$

$$u = Ax^2 + Bx \quad p = \lambda^2 + 1 \quad = 0$$

$$u' = 2Ax + B \quad p' = 2\lambda \quad = 2$$

$$V'' = 2A \quad \frac{p''}{2} = 1 \quad = 1$$

$$\lambda = 1$$

$$L(ue^{ix}) = e^{ix}((uAi + 2B)2A) = 4xe^{ix}$$

$$4Ai = 4, \quad A = -i, \quad B = 1$$

$$\Rightarrow y. = (-ix^2 + x)(\cos(\alpha) + i\sin(x))$$

$$\psi = \operatorname{Re} y. = x \cos(x) + x^2 \sin(x)$$

3) Таким образом общее решение

$$y = x \cos(x) + x^2 \sin(x) + C_1 \cos(x) + C_2 \sin(x)$$

19. Системы обыкновенных ДУ

Определение 19.1. Система уравнений вида

$$F_i(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{m_1}, \dots, y_n, y_n', \dots, y_n^{m_n}) \equiv 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

называют системой обыкновенных ДУ порядка $m = \max\{m_1, \dots, m_n\}$ относительно функций $y_1 = y_1(x), \dots, y_n = y_n(x)$. Набор функций $\{y_1, \dots, y_n\}$ называется решением ДУ если при подстановке

$$F_i(x, y_1, y_1', \dots, y_1^{m_1}, \dots, y_n, y_n', \dots, y_n^{m_n}) \stackrel{(x)}{=} 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

то есть получается система верных функциональных тождеств

Теорема 19.1. Всякая система ДУ из определения 1 эквивалентна некоторой системе обыкновенных ДУ 1-го порядка

Доказательство. Введём

$$\begin{array}{cccc} z_{1,1} = y_1 & z_{1,2} = y_1' & \dots & z_{1,m_1} = y_1^{(m_1-1)} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ z_{n,1} = y_n & z_{n,2} = y_n' & \dots & z_{n,m_n} = y_n^{(m_n-1)} \end{array}$$

Примечание. Всего получим $N = \sum_{i=1}^n m_i$ функций.

Таким образом, после замены на z получаем

$$F_i(x, z_{1,1}, z_{1,2}, \dots, z_{1,m_1}, z_{1,m_1}', \dots, z_{n,1}, z_{n,2}, \dots, z_{n,m_n}, z_{n,m_n}') \equiv 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

Мы знаем, что $z_{1,1}, z_{1,2}$ связаны между собой и другими $z_{1,i}$, тогда

$$\begin{cases} z_{i,j}' = z_{i,j+1} & 1 \leq i \leq n \quad 1 \leq j \leq m_i - 1 \\ F_i = 0 \end{cases}$$

Таким образом мы получили систему обыкновенных ДУ первого порядка относительно $z_{i,j}$ ■

Определение 19.2. Система ДУ вида

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ \dots \\ y_n' = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

Называют нормальной системой обыкновенных ДУ 1-го порядка

Замечание 19.1. Введём

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \vec{y}' = \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_n \end{pmatrix} \quad \vec{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix}$$

Тогда систему из определения выше можно описать так

$$\vec{y}' = \vec{f}(x, \vec{y})$$

Пример 19.1. Дано

$$y^{(n)} + p_1(x) y^{(n-1)} + p_2(x) y^{(n-2)} + \dots + p_{n-1}(x) y' + p_n(x) y = f(x)$$

Требуется перейти к нормальной системе обыкновенных ДУ 1-го порядка.

Решение.

Введём следующие функции

$$y_1 = y, \quad y_2 = y', \quad \dots, \quad y_n = y^{(n-1)}$$

Тогда ответ

$$\begin{cases} y'_n = -p_n y_1 - p_{n-1} y_2 - \dots - p_1 y_n + f(x) \\ y'_{n-1} = \frac{-p_n y_1 - p_{n-1} y_2 - \dots - p_2 y_{n-1} + f(x)}{p_1(x)} - y'_n \\ \dots \\ y'_1 = \frac{-y_1 p_n(x) + f(x)}{p_{n-1}} - y'_2 \end{cases}$$

Теорема 19.2. Пусть

$$\begin{cases} y'_1 = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y'_n = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

— нормальная система относительно n функций y_1, \dots, y_n первого порядка

Тогда если функции

$$f_1, \dots, f_n, \frac{\delta f_i}{\delta y_j} \quad 1 \leq i \leq n \quad 1 \leq j \leq n$$

непрерывны в области $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$, а $M_0(x_0, y_1^0, \dots, y_n^0)$ — внутренняя точка области D , то $\exists \delta > 0$ и существует единственное решение

$$(y_1(x), \dots, y_n(x)) \quad x \in U_\delta(x_0)$$

удовлетворяющее следующим условиям задачи Коши

$$\begin{cases} \vec{y}' = \vec{f}'(x, \vec{y}) \\ \vec{y}|_{x=x_0} = \vec{y}_0 = \begin{pmatrix} y_1^0 \\ \vdots \\ y_n^0 \end{pmatrix} \end{cases}$$

Доказательство. Без доказательств ■

Замечание 19.2 (Как построить интегральную кривую). Выведем систему ДУ «в дифференциалах». Для этого рассмотрим

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, y_1, \dots, y_n) \\ \vdots \\ y_n' = f_n(x, y_1, \dots, y_n) \end{cases}$$

в сокращенном виде

$$\begin{cases} y_1' = f_1(x, \vec{y}) \\ \vdots \\ y_n' = f_n(x, \vec{y}) \end{cases}$$

это равносильно

$$dx = \frac{dy_1}{f_1(x, \vec{y})}, \dots, \frac{dy_n}{f_n(x, \vec{y})}$$

Воспользуемся $dy_i = y_i'(x) dx$, получим

$$1 = \frac{y_1'}{f_1(x, \vec{y})}, \dots, \frac{y_n'}{f_n(x, \vec{y})}$$

Если интегральная кривая L проходит через точку $M_0(x_0, y_1^0, \dots, y_n^0)$ то касательные к ней удовлетворяют системе линейных алгебраических уравнений

$$X - x_0 = \frac{Y_1 - y_1^0}{f_1(M_0)} = \dots = \frac{Y_n - y_n^0}{f_n(M_0)}$$

Замечание 19.3. Систему ДУ можно свести к уравнению высокого порядка относительно одной функции с помощью метода исключения неизвестной.

Пример 19.2. Дано

$$\begin{cases} y' = x + z \\ z' = x + 2y + z \end{cases} \quad \text{Найти } (y(x), z(x))$$

Решение.

Продифференцируем первое уравнение по x , а также выразим из него z , получим

$$\begin{cases} y'' = 1 + z' = [z' = x + 2y + z] = 1 + x + 2y + z \\ z = y' - x \end{cases}$$

Заменяем (и исключаем) z получаем

$$\begin{aligned} y'' &= 1 + x + 2y + y' - x \\ y'' - y' - 2y &= 1 \\ P(\lambda) &= \lambda^2 - \lambda - 2 = (\lambda + 1)(\lambda - 2) \\ \alpha_1 &= -1 \quad \alpha_2 = 2 \quad k_{1,2} = 1 \end{aligned}$$

Получаем ФСР $\{e^{-x} \ e^{2x}\}$ и тогда,

$$\begin{aligned} y_{o.o.} &= C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x} \\ \alpha &= 0, \quad k = 0, \quad m = 0 \end{aligned}$$

20. Система линейных ДУ

Определение 20.1. Пусть для функций справедливо

$$P_{ij}(x) \in C_{(a;b)} \quad f_1(x), \dots, f_n(x) \in C_{(a;b)}$$

Тогда система ДУ вида

$$\begin{cases} y_1' = P_{11}(x)y_1 + \dots + P_{1n}(x)y_n + f_1(x) \\ \dots \\ y_n' = P_{n1}(x)y_1 + \dots + P_{nn}(x)y_n + f_n(x) \end{cases}$$

называется линейной системой относительно n неизвестных функций $(y_1(x), \dots, y_n(x))$

Замечание 20.1. Для краткости записи введём

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \quad \vec{y}' = \begin{pmatrix} y_1' \\ \vdots \\ y_n' \end{pmatrix} \quad \vec{f} = \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_n \end{pmatrix} \quad P(x) = \begin{pmatrix} P_{11}(x) & \dots & P_{1n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ P_{n1}(x) & \dots & P_{nn}(x) \end{pmatrix}$$

где $\vec{f}(x)$ — столбец правых частей, а $P(x)$ — матрица коэффициентов. Таким образом система ДУ из определения 1 имеет вид

$$\vec{y}' = P(x)\vec{y} + \vec{f}(x)$$

Теорема 20.1. В условиях определения 1

$$\forall x_0 \in (a; b) \quad \forall \vec{y}_0 = \begin{pmatrix} y_1^0 \\ \vdots \\ y_n^0 \end{pmatrix}$$

существует единственное решение

$$\vec{y} = \vec{y}(x) \quad x \in (a; b)$$

задачи Коши

$$\begin{cases} \vec{y}' = P(x)\vec{y} + \vec{f}(x) \\ \vec{y}|_{x=x_0} = \vec{y}_0 \end{cases}$$

Доказательство. Без доказательств ■

Определение 20.2. Пусть

$$\{\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_k(x)\}$$

система функций в R^n причём

$$\vec{y}_i(x) = \begin{pmatrix} y_{i1} \\ \vdots \\ y_{in} \end{pmatrix} \quad x \in (a; b)$$

Тогда

- система линейно зависима на интервале $(a; b)$
Другими словами

$$\exists \alpha_1, \dots, \alpha_n \quad \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \neq 0 \quad \forall x \in (a; b) \quad \alpha_1 \vec{y}_1 + \dots + \alpha_k \vec{y}_k = 0$$

- Во всех остальных случаях система линейно не зависима на интервале

Определение 20.3. Пусть

$$\vec{y}' = P(x) \vec{y}$$

— однородная система линейных ДУ, где $P(x)$ — матрица коэффициентов, каждый из которых $\in C(a; b)$.

Тогда

$$\{\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)\}$$

— ФСР для $\vec{y}' = P(x) \vec{y}$, если

$$1) \quad \forall i \in (1, \dots, n) \quad \vec{y}'_i = P(x) \vec{y}_i \quad (\forall x \in (a; b))$$

2) Количество векторов системы решений соответствует порядку матрицы $P(x)$

3) Система линейно независима на $(a; b)$

Теорема 20.2. Пусть

$$\vec{y}' = P(x) \vec{y} + \vec{f}(x)$$

— система линейных ДУ (как в определении 1)

Тогда существует ФСР $\{\vec{y}_1(x), \dots, \vec{y}_n(x)\}$ соответствующая линейному однородному ДУ $\vec{y}' = P(x)\vec{y}$ и решения $\vec{\psi}(x)$, такие что

$$\vec{y} = \vec{\psi}(x) + C_1 \vec{y}_1(x) + \dots + C_n \vec{y}_n(x)$$

описывает множество всех решений данной системы линейных ДУ, где C_1, \dots, C_n — произвольные постоянные

Доказательство. Без доказательств

■

21. Система лин.диф. ур-й с пост. коэф.

Определение 21.1.

$$\begin{cases} y_1' = a_{11}y_1 + \dots + a_{1n}y_n + f_1(x) \\ \dots \\ y_n' = a_{n1}y_1 + \dots + a_{nn}y_n + f_n(x) \end{cases}$$

- система n лин. ДУ с пост.коэф.

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ матрица коэф.}$$

Замечание 21.1. Система из опр.1 сводится для каждой ф-и $y_i(x)$ к лин. ДУ n -го порядка

$$e^{\alpha x} \bar{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ \dots \\ y_n \end{pmatrix} = e^{\alpha x} \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{pmatrix}, \bar{y}' = \alpha \bar{b} e^{\alpha x}; \alpha \bar{b} e^{\alpha x} = A \bar{b} e^{\alpha x} \Rightarrow A \bar{b} = \alpha \bar{b} \Rightarrow \bar{b}$$

собств. вектор

α собств. знач. matr. A , $\det(A - \alpha E) = 0$

$(-1)^n \det(A - \lambda E) = P_n(\lambda) = \lambda^n + p_1 \lambda^{n-1} + \dots + p_n$ - хар. мн-н

Замечание 21.2. Если $\alpha_1 \dots \alpha_n \in \mathbb{R}$ - ? различн. корни хар. мн-на(i собств. знач. matr. A)

$\bar{b}_1 \dots \bar{b}_n$ соотв. собств. векторы. Тогда $y = c_1 \bar{b}_1 e^{\alpha_1 x} + \dots + c_n \bar{b}_n e^{\alpha_n x}$ -

общее решение лин. диф. сист. $\bar{y}' = A \bar{y}$

Пример 21.1 (алгебраическая). $y_1 = y_1(t)$, $y_2 = y_2(t)$

$$\begin{cases} y_1' = y_1 - y_2 + 3t \\ y_2' = -4y_1 + y_2 + te^{-t} \end{cases}$$

$$P_2(\lambda) = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -1 \\ -4 & 1 - \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2 - 4 = (\lambda + 1)(\lambda - 3)$$

$$\alpha_1 = -1, \alpha_2 = 3, k_{1,2} = 1$$

$$\lambda = \alpha_1 = -1$$

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = \alpha, x_2 = 2\alpha \quad \bar{b}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \Phi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-t}$$

$$\begin{aligned}
& \lambda = \alpha_2 = 3 \\
& \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\
& x_1 = \beta, x_2 = -2\beta \quad \bar{b}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \bar{\Phi}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{3t} \\
& y_{00} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{-t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} e^{3t} \\
& y_1'' = y_1' - y_2' + 3 = y_1' + 4y_2 - y_2 - te^{-t} + 3 = y_1' + 4y_1 - y_1 + y_1' - 3t + 3 - te^{-t} \\
& y_2 = y_1 - y_1' + 3t \\
& L(y_1) = y_1'' - 2y_1' - 3y_1 = 3 - 3t - te^{-t} \\
& P_2(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda - 3(\lambda + 1)(\lambda - 3) \\
& L(y) = 3 - 3t = Q_m(t)e^{\alpha t}, m = 1, \alpha = 0, k = 0 \\
& \Psi_1 = At + B \\
& \Psi_1' = A \\
& \Psi_1 = t - \frac{5}{3} \\
& \left| \begin{array}{c} \lambda^2 - \lambda - 3 \\ 2\lambda - 2 \end{array} \right| = 3 \\
& L(\Psi_1) = -3At - 3B - 2A = 3 - 3t, A = 1, B = -\frac{5}{3} \\
& L(y) = -te^{-t}, m = 1, \alpha = -1, k = 1 \\
& \Psi_2 = (At^2 + Bt)e^{-t} = ue^{-t}, \text{ zode } u = At^2 + Bt \\
& u' = 2At + B \quad u'' = 2A \Rightarrow \lambda^2 - \lambda - 3(0); 2\lambda - 2(-4); (1) \\
& L(\Psi_2) = e^{-t}(-8At - 4B + 2A) = te^{-t} \Rightarrow \\
& -8A = 1 \Rightarrow A = -\frac{1}{8} \\
& 2A - 4B = 0 \Rightarrow B = \frac{1}{16} \\
& \Psi_2 = \frac{1}{16}(2t^2 + t)e^{-t} \\
& y_1 = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t} + t - \frac{5}{3} - \frac{1}{16}(2t^2 + t)e^{-t} \\
& y_1' = -c_1 e^{-t} + 3c_2 e^{3t} + 1 - \frac{1}{16}(-2t + t + 1)e^{-t} \\
& y_2 = y_1 - y_1' + 3t
\end{aligned}$$

$$\begin{cases} y_2 = 2c_1 e^{-t} - 2c_2 e^{3t} + 4t - \frac{8}{3} - \frac{1}{16}(4t^2 - 2t + 1)e^{-t} \\ y_1 = c_1 e^{-t} + c_2 e^{3t} + t - \frac{5}{3} - \frac{1}{16}(2t^2 + t)e^{-t} \end{cases}$$

Часть III

Числовые ряды

22. Основные определения

Замечание 22.1 (Некоторые случаи рядов). Вещественное число можно представить в следующем виде

$$x \in \mathbb{R}, \quad x = A, a_1 a_2 \dots a_n \dots$$

где

$$a_i \in \{0, 1, \dots, 9\}, \quad A \in \mathbb{Z}$$

Также запись выше эквивалентна следующему выражению

$$x = A + \frac{a_1}{10} + \frac{a_2}{10^2} + \dots + \frac{a_n}{10^n} + \dots$$

Из этого можно выделить рациональное число

$$x_n = A, a_1 a_2 \dots a_n \in \mathbb{Q}$$

Связь рационального и действительного числа

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$$

Рассмотрим следующий случай (вывод убывающей геом. прогрессии).

Пусть

$$b_n = b_1 q^{n-1} \quad |q| < 1$$

тогда

$$S_n = b_1 + \dots + b_n$$

$$S_n = b_1 + q(b_1 + b_1 q + \dots + b_1 q^{n-2})$$

$$S_n = b_1 + q(b_1 + b_1 q + \dots + b_1 q^{n-2} + b_1 q^{n-1}) - b_1 q^n$$

$$S_n = b_1 + q S_n - b_1 q^n$$

$$S_n(1 - q) = b_1(1 - q^n)$$

$$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

Зная что $|q| < 1$, получаем

$$b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q} \rightarrow \frac{b_1}{1 - q} \quad (n \rightarrow +\infty)$$

Значит

$$S_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_1 q^{n-1} = \frac{b_1}{1-q}$$

Определение 22.1 (Числовой ряд). Пусть $\{a_n\}$ — последовательность чисел, $a_n \in \mathbb{R}$. Тогда формальное выражение

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$$

называется числовым рядом, где

$$a_1, a_2, \dots, a_n$$

— члены ряда, а функция $n \mapsto a_n$ называется общим членом ряда.

Определение 22.2. Пусть a_n - числовой ряд. Тогда:

1) n -ная частичная сумма ряда имеет вид

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

2) Если

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = S$$

то ряд называется сходящимся и S — его сумма. Пишем

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

3) Если $\nexists \lim S_n$, в частности предел равен ∞ , то ряд расходящийся и такой ряд не имеет суммы.

Определение 22.3. Пусть $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ — числовой ряд. Тогда $\forall n \in \mathbb{N}$ ряд $\sum_{k=n+1}^{+\infty} a_k$ называется n -ым остатком ряда $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$

Замечание 22.2. .

- Если ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится и его сумма равна S , то $\forall n \in \mathbb{N}$ его n -ый остаток сходится и его сумма $S_k = S - S_n$.
- Если ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ расходится, то $\forall n \in \mathbb{N}$ его остаток тоже расходится.

Замечание 22.3. Свойства сходящихся рядов

1) Сумма сходящихся рядов равна сходящемуся ряду

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = S^{(A)} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} b_n = S^{(B)} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} (a_n + b_n) = S^{(A)} + S^{(B)}$$

2) При домножении сходящегося ряда на константу ряд остаётся сходящимся

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = S^{(A)} \Rightarrow \forall a \in \mathbb{R} \quad \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha a_n = \alpha S^{(A)}$$

Доказательство. (Пункт 1)

$$\begin{aligned} S_n^{(A+B)} &= S_n^{(A)} + S_n^{(B)} \rightarrow S^{(A)} + S^{(B)} \\ S_n^{(A+B)} &\rightarrow S^{(A+B)} \end{aligned}$$

■

Доказательство. (Пункт 2)

$$\begin{aligned} S_n^{(\alpha A)} &= \sum_{n=1}^{+\infty} \alpha a_n = \alpha S_n^{(A)} \rightarrow \alpha S^{(A)} \\ S_n^{(\alpha A)} &\rightarrow \alpha S^{(A)} \end{aligned}$$

■

Теорема 22.1 (Необходимое условие сходимости). Если ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = S$, то $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = 0$

Доказательство. Из определения частичной суммы ряда следует

$$a_n = S_n - S_{n-1} = (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1} + a_n) - (a_1 + a_2 + \dots + a_{n-1})$$

Тогда

$$\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n - \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n-1} = S - S = 0$$

■

Замечание 22.4. Если $a_n \not\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$, то ряд расходится.

Не очень понятен пример

Пример 22.1. Дано

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

С одной стороны (через формулы эквивалентности у пределов (1 сем.))

$$\begin{aligned} a_n &= \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n} \\ a_n &\rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

С другой

$$\begin{aligned} S_n &= \sum_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{1}{k}\right) = \ln\left(\frac{2}{1}\right) + \ln\left(\frac{3}{2}\right) + \dots + \ln\left(\frac{n+1}{n}\right) = \\ &= \ln\left(\frac{2}{1} \cdot \frac{3}{2} \cdot \dots \cdot \frac{n+1}{n}\right) = \ln(n+1) \end{aligned}$$

Таким образом

$$S_n = \ln(n+1) \rightarrow +\infty$$

значит ряд расходится и тогда

$$a_n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow +\infty)$$

Теорема 22.2 (Критерий Коши сходимости числового ряда). .

Если ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится, то

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| < \epsilon$$

Обратное утверждение также верно

Доказательство. $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится $\Leftrightarrow \exists \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S \in R \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall p \in \mathbb{N} |S_{n+p} - S_n| < \epsilon$
 $|S_{n+p} - S_n| = |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| < \epsilon$

■

Теорема 22.3 (Признак абсолютной сходимости). Если ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ сходится, то и ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится.

Доказательство. $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ сходится $\Rightarrow \forall \epsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n \geq N \forall p \geq 1 |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \epsilon \Rightarrow |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| \leq |a_{n+1}| + \dots + |a_{n+p}| < \epsilon$
 По критерию Коши ряд сходится.

■

Определение 22.4. Если ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ сходится, ряд $\sum a_n$ называется абсолютно сходящимся.

23. Признаки сходимости положительных рядов

Пусть, $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = S$ — сходящийся ряд, тогда

частная сумма ряда $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n \rightarrow S (n \rightarrow +\infty)$

И, если $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_n|$ — сходящийся ряд, то $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ — тоже сходится, причём абсолютно (абсолютная сходимость — более ёмкое понятие)

Определение 23.1. Числовой ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n \Leftrightarrow \forall n \in \mathbb{N} a_n \geq 0$

Теорема 23.1. Пусть $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ — положительный ряд, частичные суммы

S_n которого ограничены сверху. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = S$ сходится и его сумма равна $S = \sup_{n \geq 1} (S_n)$

Доказательство. $\forall n \geq 1 S_{n+1} = S_n + a_n \geq S_n$ (ряд положительный $\Rightarrow \Rightarrow a_{n+1} \geq 0$) \Rightarrow Последовательность $\{S_n\} \nearrow$.

Тогда $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n) \Leftrightarrow$ последовательность $\{S_n\}$ ограничена сверху и её предел равен $S = \sup_{n \geq 1} (S_n)$ ■

Короче, если из бесконечного множества частных сумм ряда ни одна не превышает какого-то числа, то ряд точно сходится. Причём сходится к большей из этого бесконечного числа сумм.

Теорема 23.2 (Признак сравнения сходимости рядов). Пусть $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$

и $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ — два ряда. При этом:

1) $\forall n \geq 1 a_n \geq 0$ (ряд положительный)

2) $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall b \geq n_0 |b_n| \leq a_n$

3) Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = S$ сходится

Тогда $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ сходится

Доказательство. Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится \Rightarrow [по критерию Коши] \Rightarrow
 $\Rightarrow \forall \varepsilon > 0 \exists N \geq n_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall n \geq N |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon \Rightarrow$
 $\Rightarrow |b_{n+1} + \dots + b_{n+p}| \leq |b_{n+1}| + \dots + |b_{n+p}| \leq a_{n+1} + \dots + a_{n+p} = [\text{т.к. } a_n \geq 0]$
 $= |a_{n+1} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon$
 Т.е. $|b_{n+1} + \dots + b_{n+p}| < \varepsilon \Rightarrow$ [по критерию Коши] $\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ сходится. ■

Следствие 23.1. $\forall n \geq n_0 \ 0 \leq b_n \leq a_n$ Если ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ расходится, то и $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ тоже расходится

Доказательство. От противного:

Если бы $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходился, то по теореме 2 $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ — сходился бы \Rightarrow противоречие ■

Теорема 23.3 (Признак сравнения рядов в предельной форме).
 Пусть $\forall n \geq 1 \ a_n \geq 0, b_n \geq 0$ и $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = c \neq 0$, т.е. $c > 0$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится \Leftrightarrow ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ сходится

Доказательство. $\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} = c \Rightarrow$

Пусть $\varepsilon = \frac{c}{2} (\varepsilon > 0) \Rightarrow \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2} \Rightarrow \frac{c}{2} < \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2} \Rightarrow$
 $\Rightarrow \forall n \geq n_0 \ 0 < b_n < \frac{2}{c} a_n$

Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится \Rightarrow [по теореме 2] $\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ сходится.

\Leftarrow

Ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} b_n$ сходится $\Rightarrow \forall n \geq n_0 \ a_n < \frac{3}{2} c b_n \Rightarrow$ [по теореме 2] \Rightarrow

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится ■

Аналогичная штука работает для расходящихся рядов:

Если предел отношения элементов ряда на бесконечности равен ненулевой константе и один из рядов расходящийся, то и второй тоже обязательно расходится

Пример 23.1.

1) ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \ln(1 + \frac{1}{n})$ расходится (1)

$$\ln(1+t) \sim t(t \rightarrow 0) \Rightarrow [t = \frac{1}{n}] \Rightarrow \ln(1 + \frac{1}{n}) \sim \frac{1}{n}(n \rightarrow +\infty) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1+\frac{1}{n})}{\frac{1}{n}} = 1 \neq 0$$

Теперь, учитывая, что у нас есть ненулевой предел отношения элементов двух рядов, один из которых расходящийся, можно говорить, что расходится и второй, т.е. ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ расходится

2) ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$ сходится. $(S_n = 1 - \frac{1}{n+1}) \Rightarrow$ ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ сходится,

$$\text{т.к. } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{n(n+1)}}{\frac{1}{n^2}} = 1$$

Теорема 23.4 (Признак Даламбера). Пусть $\forall n \geq 1 a_n > 0$ и:

1) $\exists q < 1 \forall n \geq n_0 \frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q \leq 1$. Тогда ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ сходится

2) $\forall n \geq n_0 \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 \Rightarrow$ ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ расходится

Доказательство.

1) $\frac{a_{n+1}}{a_n} \leq q < 1 (\forall n \geq n_0)$

$$a_n \leq a_{n-1}q \leq a_{n-2}q^2 \leq \dots \leq a_{n_0}q^{n-n_0}$$

$$\sum_{n=n_0}^{+\infty} a_{n_0}q^{n-n_0} = a_{n_0} \sum_{k=0}^{+\infty} q^k = \frac{a_{n_0}}{1-q} \text{ СХОДИТСЯ, т.к. } 0 < q < 1 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow [\text{по теореме 2}] \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ СХОДИТСЯ}$$

2) $\forall n \geq n_0 \frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1 \Rightarrow a_n \geq a_{n-1} \geq \dots \geq a_{n_0} > 0 \Rightarrow a_n \geq a_{n_0} > 0$

$n \rightarrow +\infty$, если бы $a_n \rightarrow 0$ (условие сходимости ряда), тогда по принципу сжатой переменной $a_{n_0} = 0$, но это не так \Rightarrow противоречие $\Rightarrow a_n \not\rightarrow 0 (n \rightarrow +\infty)$ и ряд расходится

■

Теорема 23.5 (Признак Даламбера в предельной форме). Пусть $\forall n \geq 1 a_n > 0$ и $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$, тогда:

- 1) $q < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *сходится*
- 2) $q > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *расходится*
- 3) $q = 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *может сходиться или расходиться*

Доказательство.

- 1) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q, q < 1$
 $q < 1 \Rightarrow \varepsilon = \frac{1-q}{2} > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - q \right| < \frac{1-q}{2} \Rightarrow$
 $\Rightarrow q - \frac{1-q}{2} < \frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \frac{1-q}{2} = \frac{q+1}{2} = q^* < \frac{2}{2} = 1 \Rightarrow$
 $\Rightarrow \forall n \geq n_0 \frac{a_{n+1}}{a_n} < q^* < 1 \Rightarrow [\text{по теореме 4}] \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *сходится*
- 2) $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q > 1 \Rightarrow \varepsilon = \frac{q-1}{2} > 0$
 $\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - q \right| < \frac{q-1}{2} \Rightarrow q - \frac{q-1}{2} < \frac{a_{n+1}}{a_n} < q + \frac{q-1}{2}$
 $1 = \frac{1+1}{2} < q^* = \frac{q+1}{2} < \frac{a_{n+1}}{a_n} > q^* > 1 \Rightarrow [\text{по теореме 4}] \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *расходится*
- 3) $q = 1 : \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$
Тут достаточно привести примеры сходящегося и расходящегося ряда для $q = 1$:
- $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n}$ *расходится*, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 (n \rightarrow +\infty)$
 - $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}$ *сходится*, $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n^2}{(n+1)^2} \rightarrow 1 (n \rightarrow +\infty)$

Итого точно сказать нельзя

■

Теорема 23.6 (Радикальный метод Коши). Пусть $\forall n \geq 1 a_n > 0$ и $\exists \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l, l \in \mathbb{R}$. Тогда, если:

- 1) $l < 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *сходится*

2) $l > 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *расходится*

3) $l = 1 \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ *не определено. Может сходиться или расходиться*

Доказательство.

1) $0 \leq l < 1$ (т.к. l это корень)

$$\varepsilon = \frac{1-l}{2} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \mid \sqrt[n]{a_n} - l \mid < \frac{1-l}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sqrt[n]{a_n} < \frac{l+1}{2} = l^* < 1 \Rightarrow a_n < (l^*)^n (n \geq n_0), l^* \in [0; 1]$$

$$\text{ряд } \sum_{n=n_0}^{+\infty} (l^*)^n =$$

$$= [\text{Как сумма геом. прогрессии со знаменателем меньшим единицы}] =$$

$$= \frac{(l^*)^{n_0}}{1-l^*} \text{ сходится} \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} (l^*)^n \text{ сходится} \Rightarrow [\text{по теореме 3}] \Rightarrow \text{тоже}$$

$$\text{сходится}$$

$$2) l > 1 \Rightarrow \varepsilon = \frac{l-1}{2} \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \mid \sqrt[n]{a_n} - l \mid < \frac{l-1}{2} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 1 < l^{ast} = \frac{l+1}{2} = l - \frac{l-1}{2} < \sqrt[n]{a_n} (n \geq n_0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \forall n \geq n_0 a_n > 1 \Rightarrow a_n \nrightarrow 0 (n \rightarrow +\infty) \Rightarrow \text{ряд } \sum_{n=1}^{+\infty} a_n \text{ расходится}$$

3) Тут тоже достаточно только привести примеры:

- $\sum_{n=1}^{+\infty} 1 \cdot a_n = 1, \sqrt[n]{a_n} = 1, \sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1 (n \rightarrow +\infty) \Rightarrow l = 1$, а ряд расходится

- $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2}, \sqrt[n]{a_n} = \left(\frac{1}{n^2}\right)^{\frac{1}{n}} = e^{-2\frac{\ln n}{n}} \rightarrow 1 (n \rightarrow +\infty)$

(т.к. логарифм возрастает медленнее 1й степени и степень e стремится к 0) $\Rightarrow l = 1$, а ряд расходится

■

Теорема 23.7 (Интегральный признак Коши). Пусть функция $f(x)$ удовлетворяет условиям:


1) $f(x) \in C_{[1;+\infty)}$

2) $f(x) \searrow$ на $[1;+\infty)$

3) $\forall x \in [1;+\infty) f(x) > 0$

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{+\infty} f(n)$ сходится \Leftrightarrow несобственный интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ сходится

Доказательство.



$$x \in [k; k+1], f(k+1) < f(x) < f(k) (k = 1, 2, \dots) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(x) dx \leq f(k) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{k=1}^n f(k+1) \leq \int_1^{n+1} f(x) dx \leq \sum_{k=1}^n f(k) = S_n, S_{n+1} - f(1) \leq \int_1^{n+1} f(x) dx \leq S_n$$

$$\Rightarrow: \sum_{n=1}^{+\infty} f(n) \text{ сходится} \Rightarrow [\text{по теореме 1}] \Rightarrow S_n \leq S$$

$$\forall t \in \mathbb{R} \ t > 1 \ \exists n \in \mathbb{N} \ t < n+1 \ (\text{аксиома Архимеда})$$

$$F(t) = \int_1^t f(x) dx = \int_1^{n+1} f(x) dx \leq S_n \leq S$$

$$F(t) \nearrow \text{т.к. } F' = f(x) \Rightarrow \exists \lim_{t \rightarrow +\infty} F = F \leq S \Rightarrow \int_1^{+\infty} f(x) dx \text{ сходится}$$

$$\Leftarrow: \int_1^{+\infty} f(x) dx = F \text{ сходится} \Rightarrow S_n \leq f(1) + \int_1^{n+1} f(x) dx \leq f(1) + F \Rightarrow$$

$$\Rightarrow [\text{по теореме 1}] \Rightarrow \sum_{n=1}^{+\infty} f(n) \text{ сходится}$$

■