

Математическая статистика.

Домашнее задание №7

Lev Khoroshansky

Задача №1.

а) Применим метод ортогонализации Грама-Шмидта:

$$\begin{aligned}e'_1 &= \xi \\e_1 &= \frac{1}{\sqrt{\mathbb{D}e'_1}} \cdot e'_1 = \frac{\xi}{3} \\e'_2 &= \eta - \text{cov}(\eta, e_1)e_1 = \eta - \frac{\text{cov}(\eta, \xi)}{3}e_1 = \eta - 2e_1 \\e_2 &= \frac{e'_2}{\sqrt{\mathbb{D}e'_2}} = \frac{e'_2}{\sqrt{\mathbb{D}\eta + \mathbb{D}(2e_1) + 2\text{cov}(\eta, -2e_1)}} = \frac{e'_2}{\sqrt{5 + 4 - 8}} = e'_2\end{aligned}$$

Тогда матрица перехода выглядит следующим образом:

$$C_{e \rightarrow \bar{\xi}} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

б) Всё то же самое:

$$\begin{aligned}e'_1 &= \xi \\e_1 &= \frac{1}{\sqrt{\mathbb{D}e'_1}} \cdot e'_1 = \frac{\xi}{2} \\e'_2 &= \eta - \text{cov}(\eta, e_1)e_1 = \eta - \frac{\text{cov}(\eta, \xi)}{2}e_1 = \eta - 3e_1 \\ \mathbb{D}e'_2 &= \mathbb{D}\eta + \mathbb{D}(3e_1) + 2\text{cov}(\eta, -3e_1) = 9 + 9 - 18 = 0\end{aligned}$$

Следовательно, $e'_2 = 0 = \eta - 3e_1 \Rightarrow \eta = 3e_1$. Тогда матрица перехода выглядит так:

$$C_{e \rightarrow \bar{\xi}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

в) Поехали:

$$\begin{aligned}e'_1 &= \xi \\e_1 &= \frac{1}{\sqrt{\mathbb{D}e'_1}} \cdot e'_1 = \xi \\e'_2 &= \eta - \text{cov}(\eta, e_1)e_1 = \eta - \text{cov}(\eta, \xi)e_1 = \eta - e_1 \\e_2 &= \frac{e'_2}{\sqrt{\mathbb{D}e'_2}} = \frac{e'_2}{\sqrt{\mathbb{D}\eta + \mathbb{D}e_1 + 2\text{cov}(\eta, -e_1)}} = \frac{e'_2}{\sqrt{2 + 1 - 2}} = e'_2 \\e'_3 &= \zeta - \text{cov}(\zeta, e_1)e_1 - \text{cov}(\zeta, e_2)e_2 = \zeta - e_1 + e_2 - 2e_2 = \zeta - e_1 - e_2 = \zeta - \eta \\e_3 &= \frac{e'_3}{\sqrt{\mathbb{D}e'_3}} = \frac{e'_3}{\sqrt{\mathbb{D}\zeta + \mathbb{D}\eta + 2\text{cov}(\zeta, -\eta)}} = \frac{e'_3}{\sqrt{3 + 2 - 4}} = e'_3\end{aligned}$$

Матрица перехода:

$$C_{e \rightarrow \bar{\xi}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \\ \zeta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{pmatrix}$$

Задача №2.

Ортогонализация:

$$\begin{aligned} e'_1 &= \xi \\ e_1 &= \frac{e'_1}{\sqrt{\mathbb{D}\xi}} = \xi \\ e'_2 &= \eta - \text{cov}(\eta, e_1)e_1 = \eta + 2e_1 \\ e_2 &= \frac{e'_2}{\sqrt{\mathbb{D}e'_2}} = \frac{e'_2}{\sqrt{\mathbb{D}\eta + 4\mathbb{D}\xi + 4\text{cov}(\eta, \xi)}} = \frac{e'_2}{\sqrt{5 + 4 - 8}} = e'_2 \end{aligned}$$

Матрица перехода:

$$C_{e \rightarrow \bar{\xi}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \end{pmatrix}$$

Найдём $\mathbb{E}(\xi^2\eta)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\xi^2\eta) &= \mathbb{E}(e_1^2 \cdot (-2e_1 + e_2)) = -2\mathbb{E}e_1^3 + \mathbb{E}(e_1^2 \cdot e_2) = -2\mathbb{E}_1^3 + 0 \cdot \mathbb{E}e_1^2 = -2\mathbb{E}e_1^3 \\ \mathbb{E}e_1^3 &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^3 \cdot \rho_{N(0,1)} dx = 0 \text{ в силу нечётности функции под интегралом.} \\ \mathbb{E}(\xi^2\eta) &= 0. \end{aligned}$$

Теперь найдём $\mathbb{P}(\xi \geq 0, \eta \geq 0)$:

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(e_1 \geq 0, e_2 - 2e_1 \geq 0) &= \int_0^{+\infty} \int_{2x}^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{1}{2} \left\langle \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right\rangle\right) dx dy \\ &= \begin{bmatrix} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ |J| = r \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{\arctan 2}^{\pi/2} d\varphi \int_0^{+\infty} \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right) r dr \\ &= \frac{\pi - 2 \arctan 2}{4\pi} \int_{-\infty}^0 e^u du \\ &= \frac{\pi - 2 \arctan 2}{4\pi}. \end{aligned}$$

Задача №13 из листка №3.

Посчитаем с помощью перехода к полярным координатам:

$$\begin{aligned}
 F_{\xi/\eta}(t) &= \mathbb{P}\left(\frac{\xi}{\eta} \leq t\right) = \mathbb{P}(\xi \leq t\eta, \eta \geq 0) + \mathbb{P}(\xi \geq t\eta, \eta < 0) \\
 &= \int_{-\pi/2}^{\arctan t} d\varphi \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right) r dr + \int_{\pi/2}^{\pi+\arctan t} d\varphi \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right) r dr \\
 &= \frac{2 \arctan t + \pi}{2\pi} + \frac{2 \arctan t + \pi}{2\pi} \\
 &= \frac{2 \arctan t + \pi}{2\pi} \quad (\text{используя результаты предыдущей задачи.}) \\
 F_{\xi/|\eta|}(t) &= \mathbb{P}\left(\frac{\xi}{|\eta|} \leq t\right) = \mathbb{P}(\xi \leq t|\eta|) \\
 &= \int_{-\pi-\arctan t}^{\arctan t} d\varphi \int_0^{+\infty} \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{r^2}{2}\right) r dr \\
 &= \frac{2 \arctan t + \pi}{2\pi}.
 \end{aligned}$$

Задача №14 из листка №3.

Найдём матрицу ковариации и обратную к ней:

$$\begin{aligned}
 R &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \implies R^{-1} = \begin{pmatrix} 4^{-1} & 0 \\ 0 & 4^{-1} \end{pmatrix} \\
 \det R &= 16 \implies \det R^{-1} = \frac{1}{16}.
 \end{aligned}$$

1. Перейдём к полярным координатам:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P}(4 \leq \xi^2 + \eta^2 \leq 9) &= 4 \int_0^{\pi/2} d\varphi \int_2^3 \frac{1}{2\pi\sqrt{16}} \exp\left(-\frac{r^2}{2 \cdot 4}\right) r dr \\
 &= \frac{1}{4} \int_2^3 \exp\left(-\frac{r^2}{8}\right) r dr \\
 &= \exp\left(-\frac{r^2}{8}\right) \Big|_2^3 \\
 &= e^{-1/2} - e^{-9/8}.
 \end{aligned}$$

2. Повернём координатную плоскость на угол $\varphi = \frac{\pi}{4}$, используя ортогональное преобразование со следующей матрицей:

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} X \\ Y \end{pmatrix} = U \cdot \begin{pmatrix} \xi \\ \eta \end{pmatrix}, \quad U^T \cdot R \cdot U = R, \quad \text{так как матрица } R \text{ диагональна.}$$

Изначально, стороны маленького и большого квадратов были равны $2\sqrt{2}$ и $3\sqrt{2}$, они останутся точно такими же при повороте. Также, поворот не влияет на независимость.

Теперь осталось понять, что же считать. К счастью, это несложно — достаточно из большого квадрата вычесть маленький:

$$\begin{aligned}
\mathbb{P}(2 \leq |\xi| + |\eta| \leq 3) &= \mathbb{P}\left(|X| \leq \frac{3\sqrt{2}}{2}, |Y| \leq \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) - \mathbb{P}\left(|X| \leq \sqrt{2}, |Y| \leq \sqrt{2}\right) \\
&= \mathbb{P}\left(\frac{|X|}{2} \leq \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \cdot \mathbb{P}\left(\frac{|Y|}{2} \leq \frac{3\sqrt{2}}{4}\right) - \mathbb{P}\left(\frac{|X|}{2} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \cdot \mathbb{P}\left(\frac{|Y|}{2} \leq \frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\
&\simeq (\Phi(1,06) - (1 - \Phi(1,06)))^2 - (\Phi(0,71) - (1 - \Phi(0,71)))^2 \\
&\simeq (0,8554 - (1 - 0,8554))^2 - (0,7611 - (1 - 0,7611))^2 \\
&\simeq 0,2325
\end{aligned}$$