

第 1 問

【解】 $P(X, Y, 0), O'(0, 0, 1)$ とする。CP と O' の間が最短になるようにしたい。

$$CP: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} x-a \\ y \\ -3 \end{pmatrix} \quad (t \in \mathbb{R})$$

よって、CP 上の点 Q をして、

$$\begin{aligned} |OQ|^2 &= \{a+t(x-a)\}^2 + \{tY\}^2 + \{3-3t-1\}^2 \\ &= \{(x-a)^2 + Y^2 + 9\}t^2 + 2(a(x-a)-6)t + a^2 + 4 \end{aligned}$$

よって、 $t = -\frac{a(x-a)-6}{(x-a)^2 + Y^2 + 9}$ のとき min となる。よって条件は

$$\min |OQ|^2 \leq 1$$

$$\Leftrightarrow a^2 + 4 - \frac{(a(x-a)-6)^2}{(x-a)^2 + Y^2 + 9} \leq 1$$


$$\Leftrightarrow \frac{(x-a)^2}{a^2+3} + \frac{Y^2}{3} \leq 1$$

第 2 問

[解] $A(m, \frac{1}{m}), B(s, -\frac{1}{s})$ ($m < 0 < s$)

とて良い. A, B での接線 l_A, l_B は

$$\begin{cases} l_A: y = \frac{1}{m^2}x - \frac{2}{m} \\ l_B: y = \frac{1}{s^2}x - \frac{2}{s} \end{cases}$$



この交点が P であり, $t+s$ から,

$$\begin{cases} p = \frac{2}{\frac{1}{m} + \frac{1}{s}} = \frac{2ms}{m+s} \\ q = -\frac{2}{m+s} \end{cases}$$

である.

$$\vec{PA} = \begin{pmatrix} m-p \\ -\frac{1}{m}-q \end{pmatrix}, \quad \vec{PB} = \begin{pmatrix} s-p \\ -\frac{1}{s}-q \end{pmatrix}$$

ヘリサラスの公式から $\triangle PAB$ の面積 f とし

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{2} \left| (m-p) \left(-\frac{1}{s} - q \right) - (s-p) \left(-\frac{1}{m} - q \right) \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \frac{m(m-s)}{m+s} \cdot \frac{s-m}{s(m+s)} - \frac{s(s-m)}{m+s} \cdot \frac{m-s}{m(m+s)} \right| \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{(m+s)^2} \left| (m+s)(s-m) \left\{ \frac{m}{s} - \frac{s}{m} \right\} \right| \\ &= \frac{1}{2} \frac{1}{(m+s)^2} \left| \frac{(s-m)^2(m+s)}{sm} \right| \\ &= \frac{1}{2} \left| \frac{(s-m)^2}{sm(m+s)} \right| \quad \dots ① \end{aligned}$$

$$\therefore t = pq = -4 \frac{ms}{(m+s)^2}, \quad \alpha = m+s, \quad \beta = s-m \text{ とおくと, } \dots ②$$

$$sm = \frac{1}{4} [(m+s)^2 - (s-m)^2] = \frac{1}{4} (\alpha^2 - \beta^2)$$

たから, ①に代入して

$$f = \frac{1}{2} \left| \frac{\beta^2}{\frac{1}{4}(\alpha^2 - \beta^2)\alpha} \right| = 2 \left| \frac{\beta^2}{\alpha(\alpha^2 - \beta^2)} \right| \quad \dots ③$$

より,

$$t = -4 \frac{\frac{1}{4}(\alpha^2 - \beta^2)}{\alpha^2} = -\frac{\alpha^2 - \beta^2}{\alpha^2} = -1 + \left(\frac{\beta}{\alpha} \right)^2 \quad \dots ④$$

$\alpha = \frac{\alpha}{\beta}$ とおくと, ③, ④より ($\beta \neq 0$)

$$f = 2 \left| \frac{1}{\alpha(\alpha^2 - 1)} \right|, \quad t = -1 + \frac{1}{\alpha^2}$$

第2式から $|\alpha| = \sqrt{\frac{1}{t+1}}$ たから

$$f = 2 \left| \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{t+1}} \left(\frac{1}{t+1} - 1 \right)} \right| = 2\sqrt{t+1} \frac{t+1}{t} \quad (\because t > 0)$$

よって, $t > 0$ 及び $m < 0 < s$ から

$$ms < 0, \quad m+s < 0,$$

よってこの時, $m < 0 < s$ であるから, S が存在し, t の値は $t > 0$... ⑤ である

$$f = 2 \sqrt{\frac{(t+1)^3}{t^2}}$$

$q = t^{1/3}$ とおくと, ⑤から $q > 0$ で,

$$f = 2 \sqrt{\left(q + \frac{1}{q^2} \right)^3}$$

$$q^3 = 2$$

$$= 2 \left(\frac{1}{2} q + \frac{1}{2} q + \frac{1}{q^2} \right)^{\frac{3}{2}}$$

$$\geq 2 \left(3 \sqrt[3]{\frac{1}{2}} \right)^{\frac{3}{2}} \quad (\because q > 0 \text{ から AM-GM, } q^3 = 2 \text{ で等号成立})$$

$$= 3\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$$

$$\vec{A} = \left(\frac{p}{2} - \frac{q}{2m}, \frac{-2m}{mp-q} - q \right)$$

$$\frac{-2m - 2mpq + q^2}{mp-q}$$

$$\frac{1}{t+1} = \alpha^2$$

$$\frac{t}{t+1}$$

$$1-t-1$$