

第 1 問

[解] $F(x) = \int_0^x f(t) dt \dots ①$

$$F(x) = \begin{cases} (a+1)x^2 + (c-ab)x & (x \geq b) \equiv g(x) \\ (1-a)x^2 + (c+ab)x & (x \leq b) \equiv t(x) \end{cases} \dots ②$$

②から $F(x)$ は $x \neq b$ で微分可能である。①から

$$F'(x) = f(x) \quad (x \neq b) \dots ③$$

②とあわせて

$$f(x) = \begin{cases} 2(a+1)x + (c-ab) & (x > b) \\ 2(1-a)x + (c+ab) & (x < b) \end{cases}$$

④が (i) 連続である。表から $x \neq b$ では連続である。

$$f(x) \rightarrow ab + 2b + c \quad (x \rightarrow b+0)$$

$$f(x) \rightarrow -ab + 2b + c \quad (x \rightarrow b-0)$$

左右極限がひとしくしたが、 $ab=0 \dots ④$ である。この時

$$f(b) = 2b + c$$

となる。④から $a=0$ または $b=0$ 。

1° $a=0$ の時

②から $F(x) = x^2 + cx$ となる。(ii) から $C = -1$ の時

②から $f(x) = 2x - 1 \geq f(x)$ 。(iii) に反して矛盾。

2° $b=0$ の時

②③から

$$F(x) = \begin{cases} (a+1)x^2 + cx & (0 \leq x) \\ (1-a)x^2 + cx & (x \leq 0) \end{cases}$$

$$f(x) = \begin{cases} 2(a+1)x + c & (0 \leq x) \\ 2(1-a)x + c & (x \leq 0) \end{cases}$$

(ii)(iii) から

$$\begin{cases} a+1+c=0 \\ c=1 \end{cases} \therefore \begin{cases} a=-2 \\ c=1 \end{cases}$$

以上から、求めるのは $f(x) = \begin{cases} -2x+1 & (0 \leq x) \\ 6x+1 & (x \leq 0) \end{cases}$

第 2 問

[解] $a_n = (2-\sqrt{3})^n$ とおく。二項係数が自然数であることから、

A_n, B_n を自然数と見て

$$\begin{aligned} a_n &= (2^n + nC_2 \cdot 2^{n-2} \cdot 3 + \dots) - \sqrt{3} (nC_1 \cdot 2^{n-1} + nC_3 \cdot 2^{n-3} \cdot 3 + \dots) \\ &= A_n - \sqrt{3} B_n \end{aligned}$$

と表せる。 a_{n+1} は2項式で表して

$$\begin{aligned} A_{n+1} - \sqrt{3} B_{n+1} &= (2-\sqrt{3})(A_n - \sqrt{3} B_n) \\ &= 2A_n + 3B_n - \sqrt{3}(A_n + 2B_n) \end{aligned}$$

$$\therefore \begin{cases} A_{n+1} = 2A_n + 3B_n \\ B_{n+1} = A_n + 2B_n \end{cases} \quad \cdots \textcircled{1}$$

以下、 $A_n^2 = 3B_n^2 + 1$ ②が任意の $n \in \mathbb{N}$ で成り立つこと③を M.I. で示す。 $n=1$ の時の成立は明らかだから、 $n=k \in \mathbb{N}$ での②の成立を仮定し、 $n=k+1$ での②の成立を示す。①から

$$\begin{aligned} A_{k+1}^2 &= 4A_k^2 + 9B_k^2 + 12A_k B_k \\ &= 3A_k^2 + 12B_k^2 + 1 + 12A_k B_k \quad (\because \textcircled{2}) \\ 3B_{k+1}^2 + 1 &= 3(A_k^2 + 4B_k^2 + 4A_k B_k) + 1 \\ &= 3A_k^2 + 12B_k^2 + 1 + 12A_k B_k \end{aligned}$$

から $n=k+1$ での②は成り立つ。以上から③は示された。したがって $m = A_n^2 \in \mathbb{N}$, $m-1 = 3B_n^2$ とできて、 $a_n = \sqrt{m} - \sqrt{m-1}$ と表せる。

[別]

$$b_n = (2+\sqrt{3})^n = A_n + \sqrt{3} B_n \text{ と } a_n \text{ とを足かして}$$

$$1 = A_n^2 - 3B_n^2$$

5).

$$a_n = \sqrt{A_n^2} - \sqrt{3B_n^2} = \sqrt{m} - \sqrt{m-1} \quad \square$$