

筑波大学 集中講義 2025

原子核理論特講 II 「ハズオンで学ぶ核力の基礎」

— 第一回「核力の概観」 —

福井 徳朗 ^{*†}

24 February 2025

概要

「核力の到達距離」、「引力の強さ」、「斥力芯」などを学ぶ。ここでは精密な議論ではなく、実験事実や井戸型ポテンシャルを使った定性的な側面に焦点を合わせる。

目次

1	原子核の典型的スケール	1
2	核力の到達距離	1
2.1	結合エネルギーの飽和性と核力の短距離性	1
2.2	中間子論に基づく考察	3
3	引力の強さ	3
3.1	重陽子の弱束縛性	3
3.2	井戸型ポテンシャル中での重陽子	4
4	斥力芯	5
4.1	斥力芯と飽和性	5
4.2	散乱位相差と斥力芯	5
付録 A	3次元井戸型ポテンシャル: ミニマム	7

^{*} 九州大学基幹教育院

[†] tokuro.fukui@artsci.kyushu-u.ac.jp

1 原子核の典型的スケール

原子核物理が扱うのはフェムトスケールの物理である。すなわち、フェムトメートル ($\text{fm} = 10^{-15} \text{ m}$) が典型的な長さスケールである。量子力学における de Broglie 波長 λ として数 fm のオーダーを考えれば、波数は $2\pi/\lambda$ より数 fm^{-1} となる。また、量子力学が要請する位置と運動量の不確定性原理から、運動量の典型的なスケールとして MeV/c が導かれる。ここで、 c は真空中の光速、 $\text{MeV} = 10^6 \text{ eV}$ は原子核の典型的なエネルギースケールであるⁱ。

また、単位換算などでは以下の関係を知っておくと便利である:

$$\text{換算プランク定数と光速の積: } \hbar c = 197.3269804 \text{ MeV fm}, \quad (1)$$

$$1 \text{ 原子質量単位: } m_0 c^2 = 931.49410372 \text{ MeV}, \quad (2)$$

$$\text{陽子質量: } m_p c^2 = 938.27208943 \text{ MeV}, \quad (3)$$

$$\text{中性子質量: } m_n c^2 = 939.56542194 \text{ MeV}, \quad (4)$$

$$\text{微細構造定数: } \alpha = \frac{1}{137.035999177}. \quad (5)$$

これらの値は全て Physical Measurement Laboratory, National Institute of Standards and Technology の [NIST Standard Reference Database \[1\]](#) から入手した。なお、換算プランク定数 $\hbar$ はプランク定数 h を使って $\hbar = h/(2\pi)$ で定義され、微細構造定数は Coulomb 相互作用に現れる素電荷の 2 乗を計算する際によく使われる: $e^2 = \alpha \hbar c$ 。大雑把な計算では $\hbar c \sim 200 \text{ MeV fm}$, $m_0 c^2 \sim m_p c^2 \sim m_n c^2 \sim 1000 \text{ MeV}$, $e^2 \sim 1.4 \text{ MeV fm}$ などが用いられる。

2 核力の到達距離

2.1 結合エネルギーの飽和性と核力の短距離性

核力は短距離力である。つまり、核力の到達距離は短い。まずはこのことを実験事実から示そう。話を単純化するため、核子数 A の原子核の結合エネルギー E は系を構成する 2 核子間の相互作用 (2 体核力) のみで決定されると仮定する。また、原子核中で核子は一様に分布しているものとし、 A は十分大きいと近似しよう。このような条件の下、2 体核力が短距離力あるいは長距離力の場合をそれぞれ仮定したときの E を考えてみて、実験事実と整合するのは短距離力の場合であることを示そう。

2 体核力が短距離力であれば、1 つの核子は近くの α 個の核子としか相互作用しない。このとき、 $E \propto \alpha A/2$ であることが予想される (α 個の核子と 2 体核力で相互作用する核子が A 個存在することを表し、重複を避けるために因子 $1/2$ をかけている)。したがって、 $E/A \propto \text{const.}$, すなわち 1 核子あたりの結合エネルギーは核子数に依存しないことが期待される。

ⁱ メガエレクトロンボルトよりもメブあるいはエムイーヴィーと発音することが多い。




図1 質量数 A の関数として表した核子あたりの結合エネルギー E/A の実験値 [2]. ここでは Z や N は指定していないため、同位体や同重体は区別していない。

一方、もし 2 体核力が長距離力であれば、原子核を構成するそれぞれの核子は他の全ての核子と相互作用する。このとき A 個の核子から 2 個を取り出す組合せの数 $\binom{A}{2} = A(A-1)/2 \approx A^2$ から、 $E/A \propto A$ 、すなわち 1 核子あたりの結合エネルギーは核子数 A に比例することが期待される。

結合エネルギー E は質量欠損 Δm を用いて以下で計算できる:

$$\Delta m = Zm_p + Nm_n - m(Z, N), \quad (6)$$

$$E(Z, N) = \Delta mc^2. \quad (7)$$

ここで Z と N はそれぞれ陽子数と中性子数であり、 m_p と m_n は陽子と中性子の質量をそれぞれ表す。 Z と N を定めた 1 つの原子核の質量が $m(Z, N)$ である。したがって、原子核の質量の実験値を用いることで結合エネルギーを計算できる。

図 1 に E/A の実験値を示す。上記の議論から、 E/A の振る舞いは核力の短距離性を示唆する。

Exercise 2.1 — 実験値を可視化しよう —

様々な核種に対する実験により、原子核の質量は精密に測定されている。例えば Brookhaven National Laboratory の National Nuclear Data Center (NNDC) の [ウェブサイト](#) [3] では、原子核の質量はもちろん、核構造に関するデータ (スピン・パリティ・エネルギーなどの分光学的情報、遷移強度、半減期など) および核反応に関するデータ (断面積、ス

ピン偏極量など) も入手可能である。

上記のように質量から結合エネルギーを求めることは可能だが、結合エネルギーの A 依存性を見るには多くの核のデータを処理する必要がある、これは面倒である。実は NNDC のウェブサイトには、[NuDat 3.0 の Advanced Cross-Variable Plot \[2\]](#) という便利な機能がある。これを使えば、ブラウザ上で E/A を A の関数としてプロットでき、データもダウンロード可能である。[チュートリアル \[4\]](#) を参考に、 E/A を A の関数としてプロットしてみよう。

2.2 中間子論に基づく考察

核力が短距離力であることがわかったが、もう少し詳細に核力の到達距離を見積もってみよう。これには中間子の交換で核力を表現する中間子論の考え方が便利であるⁱⁱ。

中間子論では、核子が 1 個あるいは複数個の中間子を別の核子と交換するという描像に基づいて相互作用を記述する。2 つの核子が 1 つの中間子を交換する場合を考え、その中間子が移動する距離から相互作用の到達距離を見積もることにしよう。1 つの核子が質量 m_M の中間子を放出あるいは吸収するとき、 $\Delta E \sim m_M c^2$ 程度のエネルギー変化が生じる。エネルギーと時間の不確定性関係から、このエネルギー変化に要する時間は $\Delta t \sim \hbar / (m_M c^2)$ であり、中間子が移動する距離は長くても $\Delta t c \sim \hbar / (m_M c)$ 程度である。

最も軽い中間子はパイ中間子であり、その質量はおよそ 140 MeV である。上記の計算で $m_M c^2 \sim 140$ MeV を代入すると、 $\Delta t c$ は 1 fm 程度であることがわかる。これが核力の到達距離のオーダーである。

なお、歴史的には論理が逆で、1935 年に発表された湯川の中間子論 [5] では、原子核の大きさから中間子の質量を予言している。原子核の大きさは当時既に知られていたため、その事実から質量が 100 MeV 程度の粒子が核子間で交換されていることを湯川は提案した。その質量が電子と陽子の質量の中間であったことが中間子という名前の由来である。

3 引力の強さ

3.1 重陽子の弱束縛性

核力は引力と斥力の両方の性質を持っている。しかし、正の電荷を持つ陽子が複数存在する原子核では、陽子間の Coulomb 斥力に打ち勝つだけの引力が核力によってもたらされているはずであり、原子核全体には核力は引力として働いていると考えられる。ここではまずこの核力の引力について、

ⁱⁱ 中間子論の詳細は第 4 回および第 5 回の講義で扱う。

重陽子を使って理解してみよう。そのために、重陽子の弱束縛性について簡単に触れておく。

重陽子は1つの陽子と1つの中性子が束縛した原子核であり、2核子系唯一の束縛状態である。最もエネルギーの低い基底状態は、素朴には2核子間の相対軌道角運動量が0である状態 (S 波状態) だと思われる。この場合、次元解析から束縛エネルギーは

$$E = \frac{\hbar^2}{2\mu a^2}, \quad (8)$$

で与えられる (導出は例えば文献 [6] を参照)。ここで μ は陽子-中性子系の換算質量、 a は系を特徴付ける典型的な長さパラメータである。もし a が核力の到達距離程度として、 $a \sim 1$ fm を式 (8) に代入すると、束縛エネルギーは 40 MeV 程度と見積もることができる。しかし、現実の重陽子の束縛エネルギーは約 2 MeV であり、典型的なエネルギースケールよりも1桁小さい。その意味で重陽子は弱束縛系である。

なお、より現実的な a の値には、核力の到達距離ではなく、スピン三重項アイソスピン一重項の S 波散乱長 $a = 5.4112$ fm [7] を用いるのが適切である。このとき、式 (8) で計算した束縛エネルギーは実験値とオーダーで一致する。

3.2 井戸型ポテンシャル中での重陽子

3次元の球対称な井戸型ポテンシャルを仮定して重陽子が満たす Schrödinger 方程式を解くことで、核力の引力の強さを見積もってみよう。これには数値計算を駆使する。2核子間の相対距離を r としたとき、ポテンシャル V は

$$v(r) = \begin{cases} -v_0 & (r \leq r_0), \\ 0 & (r > r_0), \end{cases} \quad (9)$$

で与えられる。ここで $v_0 > 0$ はポテンシャルの深さ、 r_0 はポテンシャルの半径である。

Exercise 3.1 — 【ハンズオン】重陽子を井戸型ポテンシャルで解こう—

1. 陽子-中性子系の質量およびポテンシャルのパラメータ (v_0 および r_0) を与えたときの束縛問題を解こう (付録 A 参照)。エネルギー固有値および波動関数を求め、波動関数を r の関数として可視化しよう。また、 r_0 としてどのような値が妥当か考察しよう。配布するサンプルプログラムを実行してみよう。
2. 重陽子の束縛エネルギーの実験値を調べ、それを再現するポテンシャルのパラメータを探そう。これには前述の NNDC の ENSDF [8] というサービスが便利である。なお、重陽子の性質を調べるには、ENSDF の検索ウィンドウに 2H と入力するとよい。

Exercise 3.1 で得られた v_0 は重陽子の束縛エネルギーよりも1桁大きいはずである。このことを玉垣良三は、文献 [9] で『核力は強いがその結合力は弱い』のが核力の特徴であると表現している。

4 斥力芯

4.1 斥力芯と飽和性

原子核には飽和性という基本的性質がある。すなわち、1 核子あたりの結合エネルギーを原子核の密度の関数で表したとき、ある密度で結合エネルギーが極小となることである。飽和性は端的には、高密度で原子核が潰れないという、原子核の液滴としての性質を反映している。そこから素朴には、核力は、2 核子が極近距離で相互作用する領域で斥力となることが予想される。なぜなら、短距離力である核力が引力成分のみを持つとしたら、原子核が潰れてしまうからである。このような極近距離での斥力を核力の斥力芯と呼ぶ。

しかし、ここで強調しておかなければならないのは、飽和性に斥力芯が寄与していることは事実であるものの、飽和性の全てが斥力芯で説明できるわけではなく、むしろその寄与は限定的であるという事実である。Bethe が示した様に [10]、飽和性にはまず核力のうちテンソル力が、次に核力の交換性が、そして斥力芯がその次の効果として寄与していることが知られている。

4.2 散乱位相差と斥力芯

核力が斥力成分を持つことは散乱位相差のエネルギー依存性に現れている。陽子-陽子の S 波の散乱位相差に注目すると、これは低エネルギーでは正の値である一方、高エネルギーでは負の値となる (図 2 参照)。負の位相差は斥力ポテンシャルに対応するので、この事実は核力が斥力芯を持つことを示唆している。より正確には、位相差が負であることは斥力芯の存在の必要十分条件ではない。この帰結は S 波のみならず、 D 波の散乱位相差との比較に依拠している。図 2 が示すように、陽子-陽子の S 波位相差が負になる領域において、 D 波位相差は正である。 D 波は 2 核子間の相対軌道各運動が 2 の散乱状態であり、遠心力障壁を感じるために、素朴には、2 核子は比較的近距离に到達しづらいと考えられる。一方、 S 波の 2 核子は遠心力障壁を感じないため、比較的近距离でポテンシャルの斥力を感じると期待される。以上より、斥力芯の存在が示唆される。

では、文献 [12] で議論されているように、現実的な散乱位相差のデータを使って斥力芯の半径を大雑把に見積もってみよう。重心系の波数 k は実験室系のエネルギー T_{lab} と $T_{\text{lab}} = 2(\hbar k)^2/m_N$ という関係にある。ただし m_N は核子の質量である。したがって、 1S_0 チャネルの位相差が負になるエネルギーを $T_{\text{lab}} \sim 250$ MeV と見積もると、これに対応する波数として $k \sim 1.7 \text{ fm}^{-1}$ を得る。さて、波数 k を持つ核子がポテンシャルの到達距離 r_0 の範囲内で持ちうる最大の軌道角運動量は、古典極限では $L_{\text{max}} \approx kr_0$ 程度である。今は S 波における散乱に注目しているので、 $L_{\text{max}} \lesssim 1$ とすると、 $r_0 \sim 0.6 \text{ fm}$ を得る。これが大雑把に見積もった斥力芯の半径である。




図2 [NN-OnLine](#) から入手した陽子-陽子散乱の S 波位相差 (実線) と D 波散乱位相差 (破線) を実験室系の入射エネルギー T_{lab} の関数として描画した。部分波解析 (partial-wave analysis; PWA) に基づいて導出されている [11].

Exercise 4.1 — 散乱位相差のデータを手しよう—

現実的な位相差のデータを手しよう。位相差のデータは、例えば Radboud University Nijmegen の [NN-OnLine](#) というサービスで入手できる [13]。
 NN interaction > Phase shifts > Phase shifts versus energy: numbers とたどると、位相差の具体的な情報を入力するページへ進む。そこで、以下を選択するとよい:

- Models:
- Interaction:
- T_{min} : MeV
- T_{max} : MeV (350 MeV までが上限のようである)
- Intervals: MeV
- Give the phase:

なお、現実の 2 核子系の散乱位相差は 2 核子系のスピン・アイソスピンおよび軌道角運動量の状態に強く依存する。今は簡単のため、陽子-中性子のスピンシングレット S 波散乱 (1S_0) のみを考えることにしよう。もちろん、他のチャネルの位相差 (これも NN-OnLine で

入手可能) も分析してもらって構わない。

また、NN-OnLine では位相差を可視化することも可能である。

NN interaction > Phase shifts > Phase shifts versus energy: figure

と進むとよい。この機能により、エネルギーが大きいときに位相差がエネルギーの関数として線形で近似できることが確認できるはずである。

ちょっと踏み込んだ話 4.1 — 斥力芯の起源 —

斥力芯の起源は核子を構成するクォーク間に働く Pauli 原理である。しかし、この起源は長らく大きな謎であった。

斥力芯は 1951 に Jastrow によって提唱された [14]。その起源をめぐっては、南部による ω 中間子による説明や [15]、核子の内部自由度の寄与が議論された (大槻-玉垣-安野 [16], 町田-並木 [17], あるいは Neudatchin-玉垣-Smirnov [18])。

その後、岡-矢崎によるクォーククラスター模型に基づく計算によって、斥力芯がクォーク交換に起因することが示された [19]。そして 21 世紀に入り、石井-初田-青木によって斥力芯の起源がクォーク間の Pauli 原理であると解明された [20]: 格子量子色力学計算による、核力の第一原理的記述である。

付録 A 3次元井戸型ポテンシャル: ミニマム

3次元井戸型ポテンシャル中での束縛問題について簡潔にまとめる。導出など詳細は量子力学の一般的な教科書 (例えば文献 [21, 22]) を参照されたい。

Schrödinger 方程式およびポテンシャル V は以下で与えられる:

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\mu} \frac{d^2}{dr^2} + v(r) - E \right] \phi_0(r) = 0, \quad (\text{A.1})$$

$$v(r) = \begin{cases} -v_0 & (r \leq r_0), \\ 0 & (r > r_0). \end{cases} \quad (\text{A.2})$$

ただし、相対軌道角運動量はゼロとし、2 体系の換算質量を μ , エネルギー固有値を $E < 0$ とする。

● 束縛状態の数 N

$$\frac{\pi^2 \hbar^2}{8\mu} (2N-1)^2 < v_0 r_0^2 \leq \frac{\pi^2 \hbar^2}{8\mu} (2N+1)^2. \quad (\text{A.3})$$

- 波動関数

$$\phi_0(r) = \begin{cases} A_0 \frac{\sin(kr)}{kr} & (r \leq r_0), \\ -B_0 \frac{e^{-\kappa r}}{\kappa r} & (r > r_0), \end{cases} \quad (\text{A.4})$$

$$k = \frac{\sqrt{2\mu(v_0 + E)}}{\hbar}, \quad \kappa = \frac{\sqrt{2\mu|E|}}{\hbar}, \quad (\text{A.5})$$

$$A_0 = \sqrt{\frac{2k^2\kappa}{1 + \kappa r_0}}, \quad B_0 = -\frac{\kappa}{k} e^{\kappa r_0} \sin(kr_0) A_0. \quad (\text{A.6})$$

- k と κ が満たす関係式

$$(kr_0)^2 + (\kappa r_0)^2 = \frac{2\mu v_0 r_0^2}{\hbar^2}. \quad (\text{A.7})$$

- 接続条件

$$\kappa = -k \cot(kr_0). \quad (\text{A.8})$$

- 固有状態

式 (A.7) と式 (A.8) を同時に満たす k を求める。すなわち、式 (A.8) と等価な $\kappa r_0 = -kr_0 \cot(kr_0)$ を kr_0 の関数としてプロットしたとき、これと円の方程式 (A.7) との交点から k を求める。

k が求まると、式 (A.5) より、 $E = (\hbar k)^2/(2\mu) - v_0$ から固有エネルギーが求まる。

参考文献

- [1] Physical Measurement Laboratory, National Institute of Standards and Technology, NIST Standard Reference Database, <https://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html>.
- [2] National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory, Advanced Cross-Variable Plot, <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/advancedplot/>.
- [3] National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory, <https://www.nndc.bnl.gov/>.
- [4] National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory, Tutorial of Advanced Cross-Variable Plot, <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/guide/#cvPlot0overview>.
- [5] H. Yukawa, Proc. Phys. Math. Soc. Jpn. **17**, 48 (1935).
- [6] 遠藤晋平, 原子核研究 **64**, 90 (2019).
- [7] R. W. Hackenburg, Phys. Rev. C **73**, 044002 (2006).
- [8] National Nuclear Data Center, Brookhaven National Laboratory, ENSDF, <https://www.nndc.bnl.gov/ensdf/>.
- [9] 玉垣良三, 大学院原子核物理 (講談社サイエンティフィク, 1996), pp. 117–181, 4.9 核物質の凝縮相と核力.
- [10] H. A. Bethe, Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. **21**, 93 (1971).
- [11] V. G. J. Stoks, R. A. M. Klomp, M. C. M. Rentmeester, and J. J. de Swart, Phys. Rev. C **48**, 792 (1993).
- [12] R. Machleidt, *The Meson Theory of Nuclear Forces and Nuclear Structure* (Springer US, Boston, MA, 1989), pp. 189–376.
- [13] Theoretical High Energy Physics Group, Radboud University Nijmegen, NN-OnLine, <https://nn-online.org/>.
- [14] R. Jastrow, Phys. Rev. **81**, 165 (1951).
- [15] Y. Nambu, Phys. Rev. **106**, 1366 (1957).
- [16] S. Otsuki, R. Tamagaki, and M. Yasuno, Prog. Theor. Phys. Suppl. **E65**, 578 (1965).
- [17] S. Machida and M. Namiki, Prog. Theor. Phys. **33**, 125 (1965).
- [18] V. G. Neudatchin, Y. F. Smirnov, and R. Tamagaki, Progress of Theoretical Physics **58**, 1072 (1977).
- [19] M. Oka and K. Yazaki, Phys. Lett. B **90**, 41 (1980).
- [20] N. Ishii, S. Aoki, and T. Hatsuda, Phys. Rev. Lett. **99**, 022001 (2007).
- [21] 猪木慶治, 川合光, 量子力学 I (講談社, 1994).

[22] 猪木慶治, 川合光, 基礎量子力学 (講談社, 2007).