



L1 - Lista 1 - matrizes, vetores, determinantes

Geometria Analítica e Vetores (Universidade Estadual de Campinas)

1ª Lista de Exercícios - MA-141

MATRIZES

1. Sejam $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ e $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$.

- a) Verifique que: $xA_1 + yA_2 + zA_3 = AX$, sendo A_j a j -ésima coluna de A para $j = 1, 2, 3$.
b) Usando a) verifique que: a segunda coluna de $C = A^2$ é $C_2 = -2A_1 - A_3$.
c) Tente generalizar o que foi feito em a) e b) para a seguinte situação: Sejam A uma matriz $m \times n$, B uma matriz $n \times k$ e $C = AB$. Se C_j é a j -ésima coluna de C , encontre C_j em termos das n colunas de A e da j -ésima coluna de B .

2. a) Sejam A e B duas matrizes quadradas $n \times n$. Mostre que $(A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2$.

b) Suponha agora que: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ e verifique que $AB \neq BA$ e conclua que neste caso $(A + B)^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$.

c) Voltando ao caso a). Mostre que: Se A e B são duas matrizes quadradas $n \times n$, então $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ se e somente se $AB = BA$.

3. Seja $M = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$

- a) Mostre que: Se A é uma matriz 2×2 então $AM = MA$ se e somente se $A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$
b) Mostre que se A e B são matrizes 2×2 que comutam com M então A e B comutam entre si, i.e., $AB = BA$.

4. a) Determine todas as matrizes D , 2×2 e diagonais, que satisfazem: $DB = BD$ para toda matriz, 2×2 , B .

b) Determine todas as matrizes A , 2×2 , que satisfazem: $AB = BA$ para toda matriz B , 2×2 .

c) Tente generalizar a) e b) para matrizes $n \times n$.

5. Responda falso ou verdadeiro a cada uma das afirmações abaixo (justifique suas respostas).

- a) Se A é matriz $n \times n$ e $A^2 = \mathbf{0}$ então $A = \mathbf{0}$, aqui $\mathbf{0}$ é a matriz nula.
b) A única matriz $n \times n$ simétrica e anti-simétrica ao mesmo tempo é a matriz nula.
c) Se A é uma matriz $n \times n$ e $A^2 = I_n$ então $A = I_n$ ou $A = -I_n$ (I_n é a matriz identidade $n \times n$).
d) Se A e B são duas matrizes $n \times n$ e $AB = BA$, então $(AB)^p = A^p B^p$ para todo número natural p .
e) Se A e B são matrizes $n \times n$ tais que $AB = \mathbf{0}$ então $BA = \mathbf{0}$.
f) Se A é uma matriz $n \times n$ e $A^4 - 3A^2 + 7A - I_n = \mathbf{0}$ então A é invertível (i.e. $AB = BA = I_n$ para alguma matriz B , $n \times n$).

SISTEMAS LINEARES e DETERMINANTES

6. Decida quais das matrizes abaixo estão na forma escada (ou escalonada reduzida). Para as que não estão encontre as suas respectivas matrizes na forma escada

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

7. Em cada um dos sistemas abaixo encontre, usando o método de Gauss, sua solução geral:

$$\begin{cases} 4x + 3y - z + t = 4 \\ x - y + 2z - t = 0 \\ 5x + 2y + z = 4 \end{cases}; \begin{cases} x + 5y + 4z - 13t = 3 \\ 3x - y + 2z + 5t = 2 \\ 2x + 2y + 3z - 4t = 1 \end{cases}; \begin{cases} x - y + 2z - t = 0 \\ 3x + y + 3z + t = 0 \\ x - y - z - 5t = 0 \end{cases}.$$

14. Considere a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

- a) Calcule o $\det(A^n)$, para todo número natural n .
b) Usando escalonamento encontre a matriz inversa A^{-1} .

15. Dada uma matriz $A = CD$ onde $C^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ e $D^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & -2 \end{bmatrix}$, resolva o sistema $AX = B$, sabendo-se que $B = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

16. Determine todos os valores de λ para os quais $\det(A - \lambda I_3) = 0$.

$$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 \\ 3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

17. Sabendo-se que para toda matriz, $n \times n$, A com $\det(A) \neq 0$ existe uma matriz, $n \times n$, \bar{A} tal que $\bar{A}A = I_n$, mostre que:

- a) se B e C são matrizes $n \times n$ e $BC = I_n$ então $CB = I_n$.
b) se $\det(B) \neq 0$ (B matriz $n \times n$) então existe uma única B^{-1} tal que $BB^{-1} = B^{-1}B = I_n$.

18. Encontre a inversa da matriz abaixo (se existe):

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos x & \sin x \\ -\sin x & \cos x \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 3 & -7 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

19. Calcule os determinantes das matrizes:

a) $\begin{pmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha \\ \sin \beta & \cos \beta \end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix} a+b & a+c \\ d+b & d+c \end{pmatrix}$; c) $\begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}$; d) $\begin{pmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 \end{pmatrix}$; e) $\begin{pmatrix} 1 & a \\ 1 & b \end{pmatrix}$;
f) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$; g) $\begin{pmatrix} 0 & a & 0 \\ b & c & d \\ 0 & e & 0 \end{pmatrix}$; h) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{pmatrix}$; i) $\begin{pmatrix} a & b & c \\ b & c & a \\ c & a & b \end{pmatrix}$; j) $\begin{pmatrix} \sin \alpha & \cos \alpha & 1 \\ \sin \beta & \cos \beta & 1 \\ \sin \gamma & \cos \gamma & 1 \end{pmatrix}$;
k) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -6 & -2 \\ 4 & 7 & 4 & 4 \\ -2 & -2 & 1 & -2 \\ -4 & -7 & 0 & -1 \end{pmatrix}$; l) $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 0 & 0 \\ 11 & 12 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; m) $\begin{pmatrix} a & b & c & d \\ -b & a & d & -c \\ -c & -d & a & b \\ -d & c & -b & a \end{pmatrix}$; n) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

20. Resolva a equação $f(x) = 0$ onde $f(x) = \det(A - xI)$ e a matriz A é a seguinte:

a) $\begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$; b) $\begin{pmatrix} \cos a & \sin a \\ -\sin a & \cos a \end{pmatrix}$; c) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$; d) $\begin{pmatrix} 5 & 6 & -3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$; e) $\begin{pmatrix} 5 & 2 & -3 \\ 4 & 5 & -4 \\ 6 & 4 & -4 \end{pmatrix}$;
f) $\begin{pmatrix} 4 & -2 & 2 \\ -5 & 7 & -5 \\ -6 & 6 & -4 \end{pmatrix}$; g) $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$; h) $\begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -4 \\ -2 & -4 & 1 \end{pmatrix}$; i) $\begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}$.

VETORES NO PLANO E NO ESPAÇO

21. Determine a extremidade ou a origem do segmento orientado nos seguintes casos:

- a) Representa o vetor $v = (1, -2, 1)$ e sua origem é o ponto $P = (1, 0, 1)$.
b) Representa o vetor $v = (-1, 0, 1)$ e sua origem é o ponto médio entre os pontos $P_1 = (1, 1, 3)$ e $P_2 = (-1, 1, 1)$.

c) Representa o vetor $v = (1, 1, 1)$ e sua extremidade é o ponto $P = (1, 1, 1)$.

22. Verifique se os pontos dados abaixo são colineares:

a) $A = (1, 0, 1)$, $B = (2, 2, 0)$ e $C = (0, -2, 2)$;

b) $A = (0, 1, -1)$, $B = (1, 2, 0)$ e $C = (0, 2, 1)$;

c) $A = (3, 1, 4)$, $B = (2, 7, 1)$ e $C = (0, 1, 5)$.

23. Dados os pontos $A = (1, 0, 1)$, $B = (-1, 1, 1)$ e $C = (0, 1, 2)$.

a) Determine o ponto D tal que A , B , C e D sejam os vértices consecutivos de um paralelogramo

b) Determine o ponto médio entre A e C e o ponto médio entre B e D .

24. Demonstre que as diagonais de um paralelogramo se cortam ao meio (Sugestão: Sejam M e N os pontos médios das duas diagonais. Mostre $\overrightarrow{MN} = \vec{0}$.)

25. Demonstre que o segmento que une os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é paralelo às bases e seu comprimento é a média aritmética dos comprimentos das bases.

26. Sejam \vec{OA} e \vec{OB} dois vetores não colineares no espaço. Qual o conjunto dos pontos P tais que $\vec{OP} = \lambda\vec{OA} + (1 - \lambda)\vec{OB}$?

27. a) Mostre que as medianas de um triângulo interceptam-se num ponto. Encontre a razão em que esse ponto divide cada mediana.

b) Tente generalizar o item (a) para tetraedros.

28. A área do triângulo ABC é $\sqrt{6}$. Sabendo-se que $A = (2, 1, 0)$, $B = (-1, 2, 1)$ e que o vértice C está no eixo Y , encontre as coordenadas de C .

29. a) Decompor o vetor $w = (1, 3, 2)$ como soma de dois vetores $w = u + v$, onde u é paralelo ao vetor $(0, 1, 3)$ e v é ortogonal a $(0, 1, 3)$.

b) Encontre um vetor u que seja ortogonal aos vetores $(2, 3, -1)$ e $(2, -4, 6)$ tal que $\|u\| = 3\sqrt{3}$.

30. a) Demonstre que não existe x tal que os vetores $v = (x, 2, 3)$ e $u = (x, -2, 3)$ sejam perpendiculares.

b) Encontre o ângulo entre os vetores $u = (2, 1, 0)$ e $v = (0, 1, -1)$ e entre os vetores $w = (1, 1, 1)$ e $z = (0, -2, -2)$.

31. a) Dado um triângulo isósceles, mostre que a mediana relativa à base é a mediatriz (i.é., é perpendicular à base).

b) Mostre que: Se um triângulo tem duas medianas iguais então ele é isósceles.

32. Sejam u e v dois vetores de comprimentos iguais, mostre que para quaisquer números a e b , os vetores $au + bv$ e $av + bu$ têm o mesmo comprimento. O que significa isso?