

THOMAS SAUREL

Study of the Cox-Ross-Rubinstein model for option valuation

Started in January 2026

Last update : September 19, 2026

Table of contents

1	Introduction	2
1.1	Motivation	2
1.2	History of option valuation	2
1.3	Goals	3
1.4	Vocabulary	3
2	Mathematical theory and no-arbitrage principle	6
2.1	Filtered probability space	6
2.2	Portfolio theory	7
2.3	Replication strategy	8
2.4	Risk-neutral measure	9
3	Analyse du modèle de Cox-Ross-Rubinstein	11
3.1	Objectifs et Structure du modèle	11
3.2	Parcours Descendant	12
3.3	Raisonnement Rétrograde	14
3.4	Options Américaines	16
4	Conception et implémentation algorithmique	17
4.1	Implémentation à l'aide d'arbres recombinaux	17
4.2	Implémentation optimisée	21
4.3	Performances et Tests	21
5	Convergence vers le modèle de Black-Scholes	23
5.1	Mouvement Brownien / Processus de Wiener	23
5.2	Intégration d'Itô	25
5.3	Equation de Black-Scholes	28
5.4	Convergence	28
6	Evaluations des indicateurs de risque	29
6.1	Delta (Δ)	29
6.2	Gamma (Γ)	29
6.3	Vega (ν)	29
6.4	Thêta (Θ)	29
7	Analyse comparative avec d'autres modèles	30
7.1	Monte-Carlo	30
7.2	Arbres trinomiaux	30
8	Conclusion	31

1 Introduction

*"A good portfolio is more than a long list of
good stocks and bonds. It is a balanced whole [...]."*
– **H. Markowitz [1]** –

1.1 Motivation

This document was made to be an introduction to quantitative finance through development of market risk analysis algorithms. It focuses on the study of the binomial model, known as the Cox-Ross-Rubinstein model.

Firstly, we will talk about the theoretical foundations of this prediction model before analyzing how it differs from the Black-Scholes and Monte Carlo models. Finally, we will implement and analyze the market variation estimators, known as the "Greeks".

I am working on this paper in my spare time for personal learning and curiosity. Consequently, it may contain errors or inaccuracies. The provided sources are in French or English, you may use a translator if you do not understand either of these languages.

1.2 History of option valuation

Modern portfolio theory in finance originated in 1952 with the work published by Harry Markowitz [2]. This theory explains how investors can optimize their portfolios and analyze asset pricing based on market conditions (volatility, risk and so on). Therefore it lays the foundations of quantitative finance by defining the portfolio as a collection of financial assets.

Based on Markowitz's work, three economists *Fischer Black*, *Myron Scholes* and *Robert Merton* published an article in 1973 presenting a formula allowing to calculate the theoretical price of a European option. Their contribution was to find a partial differential equation (PDE) to find the fair price for a European call option. [3]

With the development of computers and the exponential growth of computing power, a new method emerged in 1977 : the Monte Carlo approach. This model involves randomly simulating thousands of possible price paths. The option price is the the average of the payoffs obtained from these paths. [4] It is the primary method for exotic options such as Asian options, where the payoff depends on the average price over a certain period of time.[5]

Two years later, a new trio of economists : *John Cox*, *Stephen Ross* and *Mark Rubinstein* proposed an innovative alternative : the binomial model, also known as the Cox-Ross-Rubinstein model. In this model, time is discretized, allowing the path of an asset price to be represented as a binary tree. This simplifies estimation, providing a numerical approximation to the Black-Scholes model which relies on an analytical solution. The approach shifts the problem from a complex partial differential equation to a simple approximation that can be programmed on a computer. Furthermore, the model enables the valuation of American options, which can be exercised at any time with only a minor change in the algorithm. [6]

Subsequently, other more exotic models appeared (e.g. trinomial trees) [7]. In one of the following part, we will focus on the binomial model and compare it with the Black-Scholes and Monte Carlo models, representing respectively an approximation model, an analytical model

and a simulation-based one. The Cox-Ross-Rubinstein model is more intuitive and simpler to implement algorithmically than the Black-Scholes model.

1.3 Goals

The main goal of this paper is to present the theoretical foundations of the binomial model, implement it and then compare it to other option pricing models.

We will begin by establishing the basic terminology and presenting key theoretical results from financial mathematics. Once the model's algorithmic implementation is complete, we will explore its capabilities by pricing complex options. We will analyze how the model's discrete structure allows for the valuation of products that cannot be handled analytically by the Black-Scholes model, such as American options which can be exercised early. The study will be complemented by the calculation of sensitivity indicators known as *Greeks*, which are essential risk management tools for measuring a portfolio's sensitivity to market volatility.

Finally, we will compare our results with those obtained from the Black-Scholes and Monte Carlo models. This comparative analysis will enable us to highlight the binomial model's convergence rate and identify its limitations when applied to real-world data, thereby preparing for potential extensions involving more sophisticated tree structures.

1.4 Vocabulary

Before proceeding with the study of quantitative finance and the algorithms behind the Cox-Ross-Rubinstein model, it is essential to establish a basic vocabulary necessary for a proper understanding of the remainder of the document. If you have a financial background, you can skip this part as it will only present the basic key ideas in market finance.

Derivative : A derivative is a type of financial contract whose value depends on an asset known as **underlying asset** and whose price fluctuates in line with changes in the rate or price of that underlying asset. There are three main categories of derivatives : **firm commitment products**, **swaps** and **contingent products or options** [8] [9] [10]

Forward product : This group of derivative products generally includes **forward** and **futures**. A **forward** contract is a financial agreement between two entities, agreeing on a defined sale and purchase price at a fixed deadline. Both entities must honor their parts of the contract even if the situation at maturity is unfavorable to them. There are some differences between **forwards** and **futures** : forward contracts are negotiated over the counter, non-standardized and not very negotiable, whereas futures contracts are negotiated on a stock exchange, are standardized and negotiable. [8] [9] [11] [12]

Swap : Exchange of financial flows between two entities (e.g. floating-rate interest for fixed-rate interest). [12]

Option : Establishes a right between a buyer and a seller to buy (**Call**) or sell (**Put**) an underlying asset at a predetermined price (**Strike**) by a set expiration date. This derivative represents a right and is not an obligation. The **Call/Put** symmetry allows one to anticipate either a favorable movement in the underlying asset's price (Call) or an unfavorable one (Put). There are numerous types of options, notably **European** options that are exercisable only at expiration, and American options that are exercisable at any time prior to expiration. These represent the simplest forms, known as Vanilla options. [13] [3] The **Payoff** refers to the outcome at expiration.

An option is :

- **In the money / ITM** when its strike price is lower than the price of its underlying asset for a call, or higher than the price of its underlying asset for a put.
- **Out of the money / OTM** when its strike price is higher than the price of its underlying asset for a call, or lower than the price of its underlying asset for a put.
- **At the money / ATM** when its strike is equal to the current price of the underlying asset.

We will use the following notations :

- K : Strike
- S : Price of the underlying asset
- p : Option Premium
- R : Profit at maturity
- P : Payoff

Payoff Formulas


$$P_{Call} = \max(S - K, 0)$$

$$P_{Put} = \max(K - S, 0)$$


We can represent profits at maturity :

$$R = \begin{cases} R_{\text{Call} - \text{Buyer}} = \max(S - K, 0) - p \\ R_{\text{Call} - \text{Seller}} = -\max(S - K, 0) + p \end{cases}$$

$$R = \begin{cases} R_{\text{Put} - \text{Buyer}} = \max(K - S, 0) - p \\ R_{\text{Put} - \text{Seller}} = -\max(K - S, 0) + p \end{cases}$$



(a) Option - Call



(b) Option - Put

Figure 1: Profit of Call and Put options

Options are a key concept to understand quantitative finance. It is useful to work through a numerical example to see how it works :

Consider an industrial buyer of wheat, **B**, who knows on **January 1st** that they will need to purchase $n = 1\,000$ tonnes of wheat on **June 30th**. On January 1st, the price of wheat is 200\$ per tonne. B anticipates that the price of wheat will rise. Since B would begin to lose money if the price exceeds 250\$, they decide to purchase 1 000 call options with a strike price of 250\$, a premium of $p = 10$ \$ per tonne and an expiration date of June 30th.

Several scenarios are possible for June 30th :

- **Case 1:** Wheat trades at 150\$ per tonne. The call option is **OTM**. B's prediction did not materialize. The call option is now worthless, leading B to let it expire. B thus loses $n \cdot p = 1000 \cdot 10 = 10\,000$ \$. B therefore purchases the wheat on the market at 150\$ per tonne, resulting in a total cost of $150 + p = 160$ \$ per tonne.
- **Case 2:** Wheat trades at 225\$ per tonne. The call option is **OTM**. B's prediction has partly come true but not enough to make the call options worth using. The call option is still worthless, leading B to let it expire. B thus loses $n \cdot p = 1000 \cdot 10 = 10\,000$ \$. B therefore purchases the wheat on the market at 225\$ per tonne, resulting in a total cost of $225 + p = 235$ \$ per tonne.
- **Case 3:** Wheat trades at 250\$ per tonne. The call option is **ATM**. B's prediction has partly come true but not enough to make the call options worth using because the price is equal to the strike. Using the call option does not change anything. B thus loses $n \cdot p = 1000 \cdot 10 = 10\,000$ \$. B therefore purchases the wheat on the market at 250\$ per tonne, resulting in a total cost of $250 + p = 260$ \$ per tonne.
- **Case 4:** Wheat trades at 300\$ per tonne. The call option is **ITM**. B's prediction came true. B uses its call options and spend 250\$ per wheat tonne. Thus, B will have spent $250 + p = 260$ \$ per tonne instead of 300\$. B saved $(300 - (250 + p)) \cdot n = 40 \cdot 1000 = 40\,000$ \$.

Therefore, the goal of market finance is to optimize strategies in order to generate the highest possible profit while taking risk into account. Thus, it is useful to develop mathematical tools that allow for the modeling of market dynamics.

Positions : There are two positions when buying or selling options :

- **Long Position**

Action Buying the asset in anticipation of a price increase

Profit Making money by reselling at a higher price than the purchase price

Risk Risk limited to the amount invested

- **Short Position**

Action Borrowing an asset from someone, selling it immediately, waiting for the price to drop and buying back the asset at the lower price to return it

Profit Gaining the difference

Risk Theoretically infinite risk if the share price rises without limit

2 Mathematical theory and no-arbitrage principle

In this section, we will focus on the theoretical notions and concepts necessary to understand finance.

2.1 Filtered probability space

Consider the triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ forming a probability space, with :

- the sample space Ω representing the possible states of a financial market
- a σ -algebra $\mathcal{F}$ on the sample space Ω
- a probability measure $\mathbb{P}$ on the σ -algebra $\mathcal{F}$

Let $I = \{0, 1, \dots, T\}$, with $T < \infty$ be the discrete set representing time points, where T is the option's maturity date. We introduce a **filtration** $(\mathcal{F}_t)_{t \in I}$ on the probability space $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. The filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \in I}$ is an increasing set of sub- σ -algebra of $\mathcal{F}$ with the property :

$$\forall (t_0, t_1) \in I \times I, \quad t_0 \leq t_1 \implies \mathcal{F}_{t_0} \subseteq \mathcal{F}_{t_1} \subseteq \mathcal{F}$$

[14] We then define the **filtered probability space** $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in I}, \mathbb{P})$

Remark. Working within this space allows us to model the evolution of a financial market. Thus, each σ -algebra in the filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \in I}$ represents the information known at time t . Therefore, an agent at time t_1 has access to all information from an earlier time t_0 , provided $t_0 \leq t_1$. The studied stochastic process $X := (X_t)_{t \in I}$ must be adapted to the filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \in I}$ ($\forall t \in I$, X_t is $\mathcal{F}_t$ -measurable). We can now define the random variables used to model the financial processes of the model.

Consider the following random variables :

$$\begin{aligned} \text{Asset quantity :} \quad & \alpha_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R} \\ \text{Risky asset :} \quad & S_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+ \\ \text{Risk-free asset :} \quad & B_t : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^+, t \mapsto (1 + r)^t \end{aligned}$$

with $r > -1$ the risk-free rate. We assume that the random variables α_t , S_t and B_t are $\mathcal{F}_t$ -measurable for all $t \in I$.

Remark. For each $t \in I$, the random variable B_t is constant on Ω ($\forall \omega \in \Omega, B_t(\omega) = (1 + r)^t$). Therefore, it is a deterministic random variable. S_t represents financial market uncertainty, α_t is a strategy adapted to the filtration (and thus adapted to the information known at time t), and B_t represents the deterministic evolution of a risk-free investment.

2.2 Portfolio theory

We then introduce the concept of an **investment strategy** as a stochastic process $\Theta = (\Theta_t)_{t \in I} := (\alpha_t, \beta_t)_{t \in I}$ where α_t and β_t represent respectively the number of units at time t in the risky asset and in the risk-free asset. This stochastic process is adapted to the filtration $(\mathcal{F}_t)_{t \in I}$.

Let $B_t = (1 + r)^t$ be the value of one unit invested in the risk-free asset. Thus, the value of the risk-free account is given by $\beta_t B_t$.

A **discrete portfolio** Π_t at time t is defined by the value :

$$\Pi_t = \alpha_t S_t + \beta_t B_t$$

Therefore, the stochastic process Π_t is composed of two parts : $\alpha_t S_t$ representing the risky component of the portfolio, and $\beta_t B_t$ representing the risk-free component of the account. [15]

Although the model evolves in discrete time, each transition from t to $t + 1$ contains two phases :

- Price Update : Asset prices change from (S_t, B_t) to (S_{t+1}, B_{t+1}) . The value of the portfolio held from period t , prior to any updates, becomes $\alpha_t S_{t+1} + \beta_t B_{t+1}$.
- Portfolio update : The investor updates their holdings from (α_t, β_t) to $(\alpha_{t+1}, \beta_{t+1})$ at the newly observed prices (S_{t+1}, B_{t+1}) . The value of the new portfolio is $\alpha_{t+1} S_{t+1} + \beta_{t+1} B_{t+1}$.

Self-financing property

A discrete portfolio is said to be **self-financing** if

$$\forall t \in I, \quad \Pi_{t+1} = \alpha_t S_{t+1} + \beta_t B_{t+1} = \alpha_{t+1} S_{t+1} + \beta_{t+1} B_{t+1}$$

[16]

Thus, the self-financing property ensures that the evolution of Π_t is entirely determined by the strategy Θ and the dynamics of both S_t and B_t , without external adjustments. In the following, we will assume that all portfolios are self-financing.

No-Arbitrage Principle

The No-Arbitrage principle means that there is no strategy Θ ensuring a self-financing portfolio with zero initial value and positive final value almost surely.

$$\nexists \Theta, \Pi_0 = 0, \mathbb{P}(\Pi_T \geq 0) = 1, \mathbb{P}(\Pi_T > 0) > 0$$

Remark. The No-arbitrage principle forbid the theoretical existence of a risk-free asset requiring no initial investment. Consequently, any potential gain requires an initial outlay or entails risk. Without this condition, every investors would exploit arbitrage opportunities, causing markets to collapse. This property is a necessary condition to ensure market consistency. In practice, very minor arbitrage opportunities appear during market fluctuations and are exploited by arbitrageurs. [17]

2.3 Replication strategy

Replication

A payoff H is said to be **replicable** if : $\exists \Pi, \Pi_T = H \quad \mathbb{P}\text{-a.s.}$
 Π is called the **replicating portfolio for H** .

Market Completeness

A market is said to be **complete** if every payoff is replicable with a portfolio.

Remark. It follows naturally that market completeness implies the existence of a replicating portfolio for every payoff. However, one can go further and demonstrate the uniqueness of the portfolio for each payoff.

Consider a complete market, for any payoff H , there exists a **unique** replicating portfolio for H .

Proof. Let $\Pi = \Pi^1 - \Pi^2$ be the difference between two self-financing portfolios that both replicate the payoff H . Since the difference of two self-financing portfolios is self-financing, Π is self-financing. Furthermore,

$$\Pi_T = \Pi_T^1 - \Pi_T^2 = H - H = 0$$

We will now prove that $\Pi_t = 0$ for every $t \in [0, T]$.

Suppose by contradiction that there exists $t \in [0, T]$ such that $\Pi_t \neq 0$.

If $\Pi_t > 0$, take the opposite position $-\Pi$ at time t . This creates an initial cash amount $\Pi_t > 0$. Invest this amount in the risk-free asset until time T .

Since $\Pi_T = 0$, the position $-\Pi$ has zero final value, while the amount invested in the risk-free asset has strictly positive value

$$\Pi_t \frac{B_T}{B_t} > 0$$

Thus, starting from zero initial wealth at time t , we obtain a strictly positive final payoff, yielding an arbitrage opportunity.

If $\Pi_t < 0$, take the position Π at time t and borrow $-\Pi_t > 0$ from the risk-free asset. The initial value of the combined position is $\Pi_t + (-\Pi_t) = 0$.

At time T , the portfolio Π has value $\Pi_T = 0$, while the loan has to be repaid in the amount

$$(-\Pi_t) \frac{B_T}{B_t} > 0$$

Therefore this position produces a strictly negative final payoff. Taking the opposite position produces an arbitrage opportunity. In both cases, $\Pi_t \neq 0$ leads to an arbitrage opportunity, contradicting the no-arbitrage assumption.

Therefore, $\Pi_t = 0$ for all $t \in [0, T]$

Consequently, $\Pi_t^1 = \Pi_t^2$ for all $t \in [0, T]$

Thus the self-financing replicating portfolio for H is unique. $\square$

2.4 Risk-neutral measure

Fundamental Theorems of Asset Pricing

First Theorem : A discret financial market on the filtered probability space $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \in I}, \mathbb{P})$ is arbitrage-free if and only if there exists at least one risk neutral probability measure that is equivalent to the original probability measure $\mathbb{P}$.

Second Theorem : An arbitrage-free market is complete if and only if there exists a unique risk-neutral measure, equivalent to $\mathbb{P}$ for which the **numeraire** (reference asset used to express prices) is the risk-free asset.

[18] [19] [20]

Remark. We previously required markets to satisfy the no-arbitrage principle. Thus, we assume the existence of a risk-neutral measure. Furthermore, if the market is complete, the risk-neutral measure is **unique**, allowing for the consistent pricing of all assets. This theorem forms the basis of models for valuing options and derivatives.

The second theorem states that a market is complete if and only if there exists a unique risk-neutral probability measure. In the binomial model, this property corresponds to the fact that the number of future states (up/down) equals the number of assets (risky/risk-free). Thus, the model considered so far involves two types of assets (risky/risk-free), and only two possible scenarios (rise/fall) can be considered at each step. This justifies the use of binomial models, which is the easiest complete model, as opposed to a trinomial model, which would be incomplete.

Martingale

$M := (M_t)_{t \in I}$ is an $\mathcal{F}$ -martingale if :

- $\forall t \in I, M_t$ is $\mathcal{F}_t$ -measurable
- $\forall t \in I, M_t$ is integrable
- $\forall s \leq t, M_s = \mathbb{E}(M_t | \mathcal{F}_s)$ a.s.

Thus, the concept of martingale is useful to represent a financial market. Intuitively, the future expectation of a martingale, taking the past into account, is equal to the current value ($\mathbb{E}(M_{t+1} | \mathcal{F}_t) = M_t$).

Consider a discret market with a risk asset S_t and a risk-free asset B_t . The **discounted yield** of the risky asset is defined as :

$$\tilde{S}_t := \frac{S_t}{B_t}$$

[21]

We obviously see that the price is expressed in terms of B_t , which thus becomes the numeraire. According to the first fundamental theorem of asset pricing, if the market is **arbitrage-free**, there exists at least one measure $\mathbb{Q}$ equivalent to $\mathbb{P}$ such that :

$$\tilde{S}_t = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\tilde{S}_{t+1} \mid \mathcal{F}_t]$$

In other words, under $\mathbb{Q}$, the discounted price becomes an $\mathcal{F}$ -martingale.

To better understand this concept, let's look at an example : Consider a market with :

$$S_0 = 100, \quad S_1 = \begin{cases} 120 & \text{with probability } p \\ 90 & \text{with probability } 1 - p \end{cases} \quad \text{avec } r_f = 5\%$$

We search the risk-neutral probability q such that the discounted yield is a martingale under $\mathbb{Q}$:

$$\tilde{S}_0 = \frac{1}{1+r} \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[S_1 \mid \mathcal{F}_0] = \frac{120q + 90(1-p)}{1+r_f}$$

The solution q corresponds to the **risk-neutral probability** of an asset price increase. Under this probability, the discounted yield $\tilde{S}_t$ is a martingale and is used to value all derivative products.

Let Π_T be the **payoff** of an asset at maturity T . If the market is **arbitrage-free**, the first fundamental theorem guarantees the existence of a risk-neutral measure $\mathbb{Q}$.

The initial price Π_0 of the asset is defined as the discounted expectation of its payoff under the measure $\mathbb{Q}$:

$$\Pi_0 = \mathbb{E}_{\mathbb{Q}}\left[\frac{\Pi_T}{B_T}\right] = \frac{\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\Pi_T]}{B_T} = \frac{\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\Pi_T]}{(1+r)^T}$$

This equality holds because B is deterministic.

Example: Consider a European call option with strike $K = 100$, maturity $T = 1$ period, and underlying asset S_T such that:

$$S_T = \begin{cases} 120 & \text{with probability } p \\ 50 & \text{with probability } 1 - p \end{cases} \quad \text{avec } r_f = 5\%.$$

The option being being a call, its payoff is $\Pi_T = \max(S_T - K, 0)$.

The initial price is :

$$\Pi_0 = \frac{\mathbb{E}_{\mathbb{Q}}[\Pi_T]}{1+r_f} = \frac{1}{1+r_f} (20q + (1-q) \cdot 0) = \frac{20q}{1+r_f}$$

q is the risk-neutral probability of an increase in the asset's price. Under this probability, the discounted option price is consistent with an arbitrage-free market.

3 Analyse du modèle de Cox-Ross-Rubinstein

Dans cette partie, nous nous intéresserons à la théorie du modèle de Cox-Ross-Rubinstein afin de l'implémenter dans la prochaine partie.

3.1 Objectifs et Structure du modèle

L'objectif du modèle **binomial** ou de **Cox-Ross-Rubinstein** est de trouver le prix sans arbitrage d'un produit dérivé. Le **prix sans arbitrage** est le prix auquel il n'existe aucune opportunité d'arbitrage. Ce modèle repose sur la réplcation de portefeuille, l'absence d'arbitrage et la complétude de marché afin de reproduire exactement les flux futurs de l'option et de garantir l'existence et l'unicité d'une probabilité risque-neutre.

Le modèle **Cox-Ross-Rubinstein** est un modèle de valorisation discret contrairement au modèle de **Black-Scholes** qui est continu. Les principaux intérêts de travailler en temps discret sont la facilité de modélisation ainsi que l'implémentation algorithmique. En effet, le modèle binomial est facilement compréhensible intuitivement en représentant l'évolution des actifs sur les branches d'un arbre pondérées par les probabilités de montée et descente des prix. Nous nous intéresserons à cette représentation dans la suite de cette section.

Pour discrétiser la période de temps du call, on considère une subdivision de la période de validité de l'option en N périodes de même longueur, ainsi on obtient chaque division :

$$t_n = \frac{nT}{N}, \forall n \in 0, \dots, N$$

Remark. Faire tendre N vers des valeurs très grandes revient à se rapprocher d'un modèle continu.

Sur chaque subdivision, on définit deux facteurs :

- u** : le facteur de hausse de l'actif (up)
- d** : le facteur de baisse de l'actif (down)

Ces deux facteurs correspondent respectivement à la hausse et à la baisse du prix de l'actif. Sur un schéma d'arbre, on adoptera la convention où le facteur de hausse est sur la branche la plus haute et vice-versa.


Remark. Nous ne nous attarderons pas, dans un premier temps, sur la manière dont sont calculés ces deux facteurs.

L'algorithme se décompose donc en deux phases distinctes :

- **La phase de propagation (Descente)** : On part de S_0 pour construire l'arbre des prix du sous-jacent jusqu'à l'échéance T .
- **La phase d'évaluation (Remontée)** : Une fois les prix à l'échéance fixés, on calcule les **payoffs** sur les feuilles de l'arbre, puis on remonte pour déterminer la prime S_0

3.2 Parcours Descendant

Représentons l'évolution du prix d'un sous-jacent ayant pour cours initial S_0 , qui a une probabilité p d'augmenter de u et qui a une probabilité $1 - p$ de baisser de d à chaque période :



Remark. L'arbre est recombinant, les évolutions sont invariantes par permutations de facteurs de hausse et baisse.

Plus formellement, soit un mot $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)$ de longueur n sur l'alphabet $\{u, d\}$. Si l'on note $|w|_u = k$ le nombre de hausses et $|w|_d = n - k$ le nombre de baisses, alors pour toute permutation $\sigma \in \mathcal{S}_n$, le prix final est identique :

$$S_n = S_0 \cdot \prod_{i=1}^n w_i = S_0 \cdot \prod_{i=1}^n w_{\sigma(i)} = S_0 u^k d^{n-k}$$


L'intérêt de la discrétisation apparaît ainsi. En effet, pour un arbre binaire non recombinant, l'étape $N = 10$ sera représenté par $2^{10} = 1024$ feuilles (nœuds terminaux) alors que pour un arbre recombinant, le nombre de feuilles de l'arbre sera de $N + 1$. Pour résumer, la recombinaison de l'arbre permet de transformer l'évolution exponentielle du nombre de feuilles en évolution linéaire.

L'idée du modèle de Cox-Ross-Rubinstein (et de celui de Black-Scholes) est d'utiliser la réplcation de portefeuilles pour reproduire l'évolution d'un produit dérivé. En effet, on a supposé l'A.O.A donc le marché est complet et ainsi tout payoff est réplicable comme vu précédemment. Représentons l'évolution d'un portefeuille afin de trouver des relations entre les différents coefficients du modèle.

Soit $\Pi = \Delta S + \beta B$ avec B au taux sans risque r .

On définit le facteur sans risque $R := 1 + r$.

Soient u, d les facteurs d'évolution du modèle et p la probabilité de hausse. On considère un call C qui peut voir son prix augmenter (C_u) ou baisser (C_d) et on construit alors notre modèle afin de répliquer ce call.



Ainsi, comme le portefeuille réplique C , on obtient :

$$\begin{cases} \Delta uS + \beta BR = C_u \\ \Delta dS + \beta BR = C_d \end{cases}$$

De plus,

$$\begin{aligned} \begin{cases} \Delta uS + \beta BR = C_u \\ \Delta dS + \beta BR = C_d \end{cases} &\iff \begin{cases} -\Delta u dS - d\beta BR = -dC_u \\ \Delta u dS + u\beta BR = uC_d \end{cases} \\ &\implies \beta RB(u - d) = uC_d - dC_u \implies \beta B = \frac{uC_d - dC_u}{R(u - d)} \end{aligned}$$

En remplaçant,

$$\begin{aligned} C = \Delta S + \beta B &= \frac{C_u - C_d}{S(u - d)} S + \frac{uC_d - dC_u}{R(u - d)} \\ &= \frac{R(C_u - C_d) + uC_d - dC_u}{R(u - d)} \\ &= \frac{1}{R} \left(\frac{R - d}{u - d} C_u + \frac{u - R}{u - d} C_d \right) \\ &= \frac{1}{R} (pC_u + (1 - p)C_d), \text{ avec } p = \frac{R - d}{u - d} \text{ et } 1 - p = \frac{u - R}{u - d} \end{aligned}$$

[21]

Remark. On a bien $1 = p + (1 - p) = \frac{R - d + u - R}{u - d} = 1$.

On a aussi nécessairement $d < R < u$. En effet,

Si $R \leq d < u$: On emprunte au taux sans risque

- En cas de baisse : $dS_0 - RS_0 = S_0(d - R) \geq 0$
- En cas de hausse : $uS_0 - RS_0 = S_0(u - R) \geq 0$

Si $d < u \leq R$: On vend à découvert

- En cas de hausse : $RS_0 - uS_0 = S_0(R - u) \geq 0$
- En cas de baisse : $RS_0 - dS_0 = S_0(R - d) \geq 0$

Dans les quatre cas, on obtient un arbitrage ce qui contredit l'A.O.A. Ainsi, le rendement sans risque est strictement compris entre les meilleurs et pires rendements risqués. On peut réécrire la formule en utilisant la probabilité risque-neutre.

Formule d'évaluation risque-neutre

Soient u et d les facteurs d'évolution avec $d < R < u$ où R est le facteur sans risque, et C_u, C_d les flux futurs de l'option :


$$\begin{aligned} C_0 &= \frac{1}{R}(pC_u + (1-p)C_d), \text{ avec } p = \frac{R-d}{u-d} \text{ et } 1-p = \frac{u-R}{u-d} \\ &= \frac{\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}(C_1)}{R}, \text{ avec } \mathbb{Q} \text{ la mesure de probabilité risque-neutre} \end{aligned}$$

3.3 Raisonnement Rétrograde

On peut maintenant appliquer le principe dit de **Raisonnement Rétrograde** ou de **Backward Induction**. Ce principe consiste à partir de la fin de l'arbre puis remonter sur le noeud précédent pour calculer sa valeur égale à l'espérance des noeuds suivants et répétant itérativement jusqu'à l'origine. Du fait de la nature non linéaire des formules d'évaluations des calls et puts (max), on ne peut savoir la valeur des noeuds terminaux qu'à la fin de la construction de l'arbre. On a alors besoin de construire l'arbre une première fois avant de le remonter. Ce principe est également très utile pour gérer les **options américaines** ainsi que pour le **delta hedging**.

Notons $C_{i,t}$ les noeuds dans un arbre binomial, où i est l'indice du noeud représentant le nombre de montées et t la couche de l'arbre représentant le temps.

Considérons alors le morceau d'arbre suivant :



En utilisant le raisonnement rétrograde, on peut exprimer la valeur du noeud $C_{0,1}$ à partir de celles de $C_{0,2}$ et $C_{1,2}$. On obtient alors :

$$C_{0,1} = \frac{1}{R}(pC_{1,2} + (1-p)C_{0,2})$$

Ainsi, on peut remonter l'arbre en partant des feuilles pour évaluer l'ensemble des noeuds précédents:

$$C_{i,t} = \frac{1}{R}(pC_{i+1,t+1} + (1-p)C_{i,t+1})$$

avec i la position du noeud parmi les noeuds de profondeur t . Les valeurs des feuilles sont données par la formule du call (resp. put) si on modélise un call (resp. put). Ici, on aura : $C_{i,N} = \max(S_{i,N} - K, 0)$ avec S le prix du sous-jacent et K le strike.

Appliquons le modèle binomial sur une option dans l'exemple suivant:

Données :

- Prix actuel : $S_0 = 100$
- Prix d'exercice : $K = 100\$$
- Facteur de hausse : $u = 1,1$
- Facteur de baisse : $d = 0,9$
- Taux sans risque : $r = 0.05$ donc $R = 1.05$
- Nombre de périodes : $N = 2$

Phase de descente :

On calcule les trajectoires possibles

Temps t=1:

- $S_u = 100 \times 1,1 = 110$
- $S_d = 100 \times 0,9 = 90$

Temps t=2:

- $S_{uu} = 110 \times 1,1 = 121$
- $S_{ud} = 110 \times 0,9 = 99$
- $S_{dd} = 90 \times 0,9 = 81$

Calcul des probabilités risque-neutres :

$$p = \frac{R - d}{u - d} = \frac{1,05 - 0,9}{1,1 - 0,9} = \frac{0,15}{0,20} = 0,75$$

Calcul des valeurs des feuilles :

On calcule le payoff du Call :

- $C_{uu} = \max(121 - 100, 0) = 21$
- $C_{ud} = \max(99 - 100, 0) = 0$
- $C_{dd} = \max(81 - 100, 0) = 0$

Phase de remontée :

Temps t = 1:

$$C_u = \frac{1}{1,05}(0,75 \cdot 21 + 0,25 \cdot 0) = \frac{15,75}{1,05} = 15$$
$$C_d = \frac{1}{1,05}(0,75 \cdot 0 + 0,25 \cdot 0) = 0$$

Temps t = 0:

$$C_0 = \frac{1}{1,05}(0,75 \cdot 15 + 0,25 \cdot 0) = \frac{11,25}{1,05} \approx 10,71$$

Pour cette option, le prix juste à exiger est de 10.71\$

3.4 Options Américaines

Pour l'instant nous nous sommes contentés de modéliser le prix d'options dites européennes, c'est-à-dire qu'elles ne sont exerçables qu'à la date d'échéance. La force du modèle binomial réside dans le fait qu'il est facile de l'adapter aux options dites américaines. Une option américaine, contrairement à une option européenne, peut être exercée à tout moment et pas obligatoire à échéance. On pourrait aussi étudier les options bermudéennes qui sont exerçables seulement à certaines dates définies avant échéance, mais par simplicité, nous étudierons seulement les options américaines dans cette partie. Du fait de sa flexibilité, une option américaine a au moins la même valeur qu'une option européenne. En effet, une option américaine fait tout ce que fait une option européenne mais peut être exercée plus tôt, ce qui permet d'éviter une baisse très importante, par exemple pour un call américain.

En supposant qu'un investisseur est un être rationnel, c'est-à-dire qu'il va toujours choisir de prendre la décision pour maximiser sa rentabilité, il devient facile d'adapter notre modèle. Il suffit de faire le maximum entre la valeur donnée par le modèle et la valeur d'exercice lors de la remontée de l'arbre. Par conséquent, un call américain et européen auront la même valeur alors qu'un put américain sera plus cher qu'un put européen car le possesseur d'un put américain peut exercer son option pour éviter que le prix ne continue de chuter en dessous d'un certain niveau.

Formule Européenne : On actualise juste l'espérance de la période suivante.

$$C = \frac{1}{R}[pC_u + (1 - p)C_d]$$

Formule Américaine : À chaque nœud, on compare cette valeur actualisée avec le gain d'un exercice immédiat et on prend le maximum des deux.

$$C = \max(\text{Valeur Intrinsèque}, \frac{1}{R}[pC_u + (1 - p)C_d])$$

4 Conception et implémentation algorithmique

Dans cette partie, nous nous intéresserons à l'implémentation numérique du modèle binomial. Nous commencerons par voir une implémentation peu optimisée et peu efficace mais permettant de comprendre facilement la logique derrière le modèle, puis nous verrons une approche optimisée et efficace utilisable dans le milieu de la finance quantitative. Les parties principales du code sont présentes en annexes. Le code est présent dans sa totalité sur le lien github suivant : <https://github.com/TomSaw31/Cox-Ross-Rubinstein>.

Les deux implémentations seront faites en C++ afin de privilégier l'efficacité, notamment sur la seconde implémentation.

4.1 Implémentation à l'aide d'arbres recombinaux

Dans cette première implémentation, nous nous intéresserons davantage de la logique du modèle et non de son optimisation. Cette première approche sera assez peu efficace en temps et mémoire mais sera plus simple à comprendre intuitivement. Elle n'aura pas vocation à être utilisée en situation réelle. Cette implémentation construira deux arbres : un pour accueillir l'évolution des prix et un autre contenant les valeurs de primes en fonction des prix calculé dans l'autre arbre.

Cette première implémentation utilise une structure d'arbre recombinaux.

Commençons par définir un nœud de l'arbre :

Node :

- int id → identifiant du nœud
- int level → niveau du nœud dans l'arbre
- double value → valeur du nœud
- Node * down → pointeur vers le nœud suivant inférieur
- Node * up → pointeur vers le nœud suivant supérieur
- Node * prevDown → pointeur vers le nœud précédent inférieur
- Node * prevUp → pointeur vers le nœud précédent supérieur

Nous aurons besoin de chaîner les nœuds dans les deux sens afin de remonter facilement dans l'arbre lors de la remontée.

Nous pouvons alors créer un arbre vide. Afin de pouvoir relier les nœuds entre eux lors de la construction, il faut créer une **file** q . Au niveau n , on crée les n nœuds et on les ajoute à la file q , puis on défile chacun des $n - 1$ nœuds du niveau précédent $n - 1$ et on les relie à leur enfants du niveau n (voir code complet en annexe).




Figure 2: Création des premiers niveaux de l'arbre

Une fois l'arbre créé, on parcourt récursivement chaque nœud en appliquant les facteurs de hausse u et de baisse d à partir du nœud parent en effectuant un parcours préfixe. Cette fonction est récursive non terminale ce qui entraîne une forte utilisation de la pile de mémoire, pouvant rapidement entraîner un Stack Overflow.

Propagation des prix de l'actif

```

1  void CRR::fillPrices(Node * node, double currentPrice, double u,
2      double d) {
3      if (!node) {
4          return;
5      }
6      node->setValue(currentPrice);
7      fillPrices(node->up(), currentPrice * u, u, d);
8      fillPrices(node->down(), currentPrice * d, u, d);
9  }
```

On obtient l'arbre suivant après évaluation:




Figure 3: Propagation des prix de l'actif

Les flèches vertes représentent des hausses de prix alors que celles en rouges représentent des baisses de prix du sous-jacent.

Un fois l'arbre des prix créé, nous pouvons créer un second arbre contenant les valeurs des primes. Nous allons ainsi remonter les deux arbres parallèlement. Cet algorithme nécessite de créer deux arbres ce qui n'est pas optimal en terme d'utilisation de mémoire. Nous verrons avec la deuxième implémentation des optimisations permettant d'éviter ce problème.

On peut commencer par reporter les valeurs des calls (resp. puts) dans le nouveau arbre en utilisant la formule $C = \max(S - K, 0)$ (resp. $P = \max(K - S, 0)$).

La remontée de l'arbre se fait en parcourant parallèlement les deux arbres qui ont la même structure. Nous progressons sur les noeuds les plus bas de l'arbre en parcourant un par un les fils pointés par *down* jusqu'à s'arrêter sur l'avant-dernière couche, c'est-à-dire lorsque le noeud n'a plus de fils *down* (chemin représenté en vert sur le schéma). Une fois arriver sur le noeud le plus bas de l'avant-dernière couche, nous pouvons évaluer la valeur des primes en utilisant la **formule d'évaluation risque-neutre** en effectuant un parcours niveau par niveau en se déplaçant sur le fils *up* puis sur le noeud père *prevUp* de sorte à parcourir chaque noeud adjacent sur toute la couche. Il suffit alors d'évaluer chaque couche pour trouver la valeur de la prime finale.




Figure 4: Evaluation des Payoffs

4.2 Implémentation optimisée

4.3 Performances et Tests

La première version utilise une structure d'arbre recombinaut ce qui permet de réduire le nombre de nœuds nécessaires pour un arbre de profondeur n à $\frac{n(n+1)}{2}$ au lieu de 2^n , ce qui permet de réduire en nombre polynomial de nœuds mais n'est toujours pas optimal. Cela justifie une seconde implémentation qui sera plus optimisée.




Figure 5: Evolution du nombre de nœuds en fonction de la profondeur de l'arbre

Les différents parcours au sein de l'algorithme nécessitent de traverser chaque nœud ce qui entraîne une complexité minimale en $O(n^2)$, ce que l'on peut observer sur le second graphique représentant l'évolution du temps d'exécution.




Figure 6: Evolution du temps d'exécution en fonction de la profondeur de l'arbre

TODO

5 Convergence vers le modèle de Black-Scholes

Avant de continuer à étudier le modèle binomial, il est nécessaire de comprendre que le modèle de Cox-Ross-Rubinstein est une discrétisation d'un autre modèle que nous allons voir dans cette section : le modèle de **Black-Scholes**.

5.1 Mouvement Brownien / Processus de Wiener

Commençons par introduire un phénomène mathématique fort utile : le **mouvement brownien**, introduit en 1827 par le botaniste **Robert Brown**. Le mouvement brownien décrit le mouvement aléatoire d'une particule dans un fluide, subissant des chocs avec les autres particules du milieu. Entre deux chocs, la particule se déplace avec un mouvement rectiligne uniforme. La nature de ce procédé chaotique peut être modélisé à l'aide d'un processus stochastique appelé **Processus de Wiener**, utilisable pour la représentation d'une évolution de marché incertain. En 1933, le mathématicien Paul Lévy a démontré que le mouvement brownien est une martingale continue ce qui nous permettra d'utiliser les résultats évoqués dans les sections précédentes. On notera $W_t : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^d$ le processus de Wiener associé à un mouvement brownien à l'instant $t \in I$ dans un espace de dimension d . [22]

Processus de Wiener

On dit qu'une famille de variables aléatoires réelles $(W_t)_{t \in \mathbb{R}^+}$ est un processus de Wiener si :

- $W_0 = 0$
- $\forall \omega \in \Omega, t \mapsto W_t(\omega)$ est continue
- $\forall t_0 < t_1 < \dots < t_n, \forall i \in \{1, \dots, n\}, W_0, W_{t_1} - W_{t_0}, \dots, W_{t_n} - W_{t_{n-1}}$ sont indépendantes
- $\forall A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), \forall s, t \in \mathbb{R}^+, \mathbb{P}(W_{s+t} - W_s \in A) = \int_A \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} e^{-\frac{x^2}{2t}} dx$




Figure 7: Simulation du mouvement brownien 2D

Remark. Le processus de Wiener est continu partout mais dérivable nulle part. Il s'apparente en ce sens à une fonction de Weierstrass.

Si on considère le déplacement d'une particule dans un espace de dimension d , on peut alors associer l'évolution de sa position au processus de Wiener $W_t : \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}^d$. On obtient, de par la nature du mouvement brownien, que la position moyenne par la particule jusqu'à t_α vaut $\mathbb{E}[W_t] = 0$ car le mouvement brownien n'a pas de direction privilégiée.

Ainsi, on remarque directement que $Var(W_t) = \mathbb{E}[W_t^2] - \mathbb{E}[W_t]^2 = \mathbb{E}[W_t^2]$.

On considèrera uniquement les mouvements browniens unidimensionnels par la suite.

On peut également montrer que W_t est un cas particulier de processus stochastique gaussien, c'est-à-dire :

$$\forall A \subset I, \forall (a_t)_{t \in A} \subset \mathbb{R}, \sum_{s \in A} a_s W_s \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

[23] Considérons une option sur un marché. A chaque instant t son prix augmente ou baisse.

On peut ainsi modéliser l'évolution du prix d'une option par une marche aléatoire. D'après le **théorème de Donsker**, cette marche aléatoire converge en loi vers un mouvement brownien standard $W = (W_t, t \geq 0)$. Ainsi, étudier le caractère aléatoire et chaotique de l'évolution du prix d'une option revient à étudier un mouvement brownien.




Figure 8: Simulation du mouvement brownien 1D

5.2 Intégration d'Itô

Comme vu précédemment, Il n'existe donc pas de dérivée au sens classique du terme. Le mathématicien Kiyoshi Itô a ainsi développé une nouvelle théorie de l'intégration reposant sur le caractère aléatoire des fonctions à étudier. On va maintenant s'intéresser au calcul des intégrales d'Itô. Ces intégrales permettent d'intégrer des variables aléatoires. L'intégrale est également une variable aléatoire et, en particulier, est une martingale.

On considère un processus de Wiener W_t sur un intervalle $I = [0; T]$ avec $T \in \mathbb{R}^+$ et une subdivision régulière de cet intervalle $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$, avec $n \in \mathbb{N}$. De manière analogue à l'intégration de Riemann, on peut approcher la valeur de l'intégrale à l'aide de sommes partielles de rectangles de longueur $t_{i+1} - t_i$ et de hauteur W_{t_i} . Le côté gauche du rectangle doit coïncider avec la valeur à gauche de l'intégrande car le mouvement brownien est une martingale et ne doit pas tenir compte du futur (si l'on prenait le milieu de chaque segment de subdivision, on obtiendrait une intégrale de Stratonovich).

Ainsi l'intégrale d'Itô est définie comme la limite en moyenne quadratique de la somme de Riemann évaluée en borne gauche :

$$\begin{aligned}
I(T) &= \int_0^T W_t dW_t = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} W_{t_i} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) \\
&\text{en utilisant l'identité } a(b-a) = \frac{1}{2}(b^2 - a^2 - (b-a)^2) \text{ avec } a = W_{t_i} \text{ et } b = W_{t_{i+1}} \\
&\Rightarrow W_{t_i} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = \frac{1}{2}(W_{t_{i+1}}^2 - W_{t_i}^2) - \frac{1}{2}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \\
&\Rightarrow \sum_{i=0}^{n-1} W_{t_i} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (W_{t_{i+1}}^2 - W_{t_i}^2) - \frac{1}{2} \sum_{i=0}^{n-1} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \\
&\text{or } \sum_{i=0}^{n-1} (W_{t_{i+1}}^2 - W_{t_i}^2) = W_{t_n}^2 - W_{t_0}^2 = W_T^2 \text{ par somme télescopique} \\
&\text{et } \sum_{i=0}^{n-1} (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \xrightarrow{L^2} T \text{ car } \mathbb{E}[(W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2] = \text{Var}(W_{t_{i+1}} - W_{t_i}) = t_{i+1} - t_i \\
&\Rightarrow I(T) = \int_0^T W_t dW_t = \frac{1}{2} W_T^2 - \frac{1}{2} T
\end{aligned}$$

Ainsi, $I(t)$ dépend de deux membres, le premier représentant la position finale quadratique et le second correspond à un ajustement de la volatilité. Sans le dernier terme, l'intégrale ne serait pas une martingale.

Terminons notre introduction de ce type d'intégration avec un lemme appelé : **Lemme d'Itô**. Il faut ainsi définir le **processus d'Itô** :

$$I_t = \int_0^t \mu_s ds + \int_0^t \sigma_s dW_s \quad \text{qui est équivalent à} \quad dI_t = \mu_t dt + \sigma_t dW_t$$

[24] avec W_t un processus de Wiener, $\mu \in L^1$ et $\sigma \in L^2$ des processus déterministes.

Remark. Le processus de Wiener a une espérance nulle donc $\mathbb{E}[I_t] = \int_0^t \mu_s ds$ et a une variance non nulle donc $\text{Var}[X_t] = \int_0^t \sigma_s^2 ds$

Lemme d'Itô

Soit $\mu \in L^1, \sigma \in L^2, I_t$ un processus d'Itô et $f(I_t, t)$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+, \mathbb{R})$ alors :

$$d(f(I_t, t)) = \frac{\partial f}{\partial t}(I_t, t) dt + \frac{\partial f}{\partial x}(I_t, t) dI_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(I_t, t) \sigma_t^2 dt$$

Nous avons précédemment comparé l'évolution d'une option sur un marché à un mouvement brownien. Cependant, le prix d'une option ne peut pas être négatif. Pour pallier ce problème, on peut définir le **processus log-normal** ou **mouvement brownien géométrique** :

$$X_t = X_0 e^{(a - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t} \quad \text{avec } a, \sigma \in \mathbb{R}$$

Ainsi, le mouvement brownien géométrique est solution de l'équation différentielle stochastique : $dX_t = aX_t dt + \sigma X_t dW_t$

Proof

Soit $X_t = X_0 e^{(a - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t}$ avec $a, \sigma \in \mathbb{R}$. On pose alors le processus d'Itô $I_t = (a - \frac{1}{2}\sigma^2)t + \sigma W_t$.

$$\text{On a alors } dI_t = \underbrace{(a - \frac{1}{2}\sigma^2)}_{\mu_t} dt + \underbrace{\sigma}_{\sigma_t} dW_t$$

On définit la fonction $f(x, t) = X_0 e^x$ telle que $f(I_t, t) = X_t$

- $\frac{\partial f}{\partial t}(I_t, t) = 0$
- $\frac{\partial f}{\partial x}(I_t, t) = X_0 e^{I_t} = X_t$
- $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(I_t, t) = X_0 e^{I_t} = X_t$

On peut alors appliquer le lemme d'Itô:

$$dX_t = 0 \cdot dt + X_t dI_t + \frac{1}{2} X_t \sigma^2 dt$$

Substituons dI_t par $(a - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t$:

$$\begin{aligned} dX_t &= X_t[(a - \frac{1}{2}\sigma^2)dt + \sigma dW_t] + \frac{1}{2} X_t \sigma^2 dt \\ &= aX_t dt - \frac{1}{2}\sigma^2 X_t dt + \sigma X_t dW_t + \frac{1}{2} X_t \sigma^2 dt \\ &= aX_t dt + \sigma X_t dW_t \end{aligned}$$

Finalement, on a bien :

$$dX_t = aX_t dt + \sigma X_t dW_t$$

Après avoir défini tous ces processus, nous allons pouvoir les appliquer au modèle de Black-Scholes dans la sous-partie suivante.

5.3 Equation de Black-Scholes

Introduisons maintenant l'équation aux dérivées partielles la plus importante des mathématiques financières : l'équation de Black-Scholes dont le nom fait référence à Fischer Black et Myron Scholes qui l'ont évoqué dans un texte de recherche académique. Nous allons étudier le modèle de Black-Scholes dans un premier temps avant de montrer qu'en diminuant les pas de temps, le modèle de Cox-Ross-Rubinstein converge vers le modèle de Black-Scholes.

Equation aux Dérivées Partielles de Black-Scholes-Merton

Soit $V(S, t)$ le prix d'une option avec S le prix du sous-jacent et t représentant le temps :

$$\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} + rS \frac{\partial V}{\partial S} - rV = 0$$

[25]

Le modèle repose sur un grand nombre d'hypothèses assez contraignantes, nécessaires pour la démonstration de la formule. Le but étant d'étudier le modèle de Cox-Ross-Rubinstein. Je vais donner les hypothèses simplifiées nécessaires à la compréhension de la résolution. Elles sont néanmoins trouvables sur la page Wikipédia du modèle de Black-Scholes.

Les hypothèses de ce modèle sont donc :

- Le taux sans risque est constant
- Le prix suit un mouvement brownien géométrique et la variance du mouvement est constante
- L'option ne donne pas de dividende
- Le marché respecte l'AOA
- Le marché permet de vendre un actif en n'importe quelle quantité
- Les transactions n'occasionnent aucun frais

La formule de Black-Scholes permet de calculer le prix d'un **call ou put européen** mais ne permet pas de calculer des calls/puts américains contrairement au modèle de Cox-Ross-Rubinstein.

TODO [26]

5.4 Convergence

TODO [27]

6 Evaluations des indicateurs de risque

Dans cette partie, nous nous intéresserons dans un premier temps à la théorie entourant les indicateurs de risque, appelés **Grecques**, puis nous utiliserons le modèle binomial pour essayer de les approximer. Nous nous limiterons ici aux grecques principales : $\Delta, \Gamma, \nu, \Theta$. Il en existe de nombreuses autres, notamment ρ, λ, ϵ , mais qui sont moins pertinentes en raison des hypothèses présumées du modèle binomial (taux sans risque constant, pas de dividende, etc.).

TODO

6.1 Delta (Δ)

6.2 Gamma (Γ)

6.3 Vega (ν)

6.4 Thêta (Θ)

7 Analyse comparative avec d'autres modèles

7.1 Monte-Carlo

7.2 Arbres trinomiaux

8 Conclusion

TODO

ANNEXES

Code du Modèle CRR (C++)

Construction de l'arbre binomial

```
1      Node * Node::createTree(int tree_depth) {
2          if (tree_depth <= 0) {
3              return nullptr;
4          }
5          std::queue<Node *> previous_level_queue;
6
7          Node * root = new Node(0,0);
8          previous_level_queue.push(root);
9
10         for(int i = 1; i < tree_depth; i++) {
11             std::queue<Node *> current_level_queue;
12
13             for (int j = 0; j <= i; j++) {
14                 Node * node = new Node(i * (i + 1) / 2 + j, i);
15                 node->setValue(0);
16                 current_level_queue.push(node);
17             }
18
19             std::queue<Node *> temp_children = current_level_queue;
20
21             while (!previous_level_queue.empty()) {
22                 Node * parent = previous_level_queue.front();
23                 previous_level_queue.pop();
24
25                 Node * downChild = temp_children.front();
26                 parent->setDown(downChild);
27                 downChild->setPrevUp(parent);
28
29                 temp_children.pop();
30
31                 Node * upChild = temp_children.front();
32                 parent->setUp(upChild);
33                 upChild->setPrevDown(parent);
34             }
35             previous_level_queue = current_level_queue;
36         }
37         return root;
38     }
```

Évaluation des payoffs

```

1      void CRR::evaluateLeafNodes(Node * t_price, Node * t_premium, int
2      type, double strike) {
3          Node * iter = t_price;
4          Node * iter2 = t_premium;
5
6          while(iter->down() != nullptr) {
7              iter = iter->down();
8              iter2 = iter2->down();
9          }
10
11         while(iter != nullptr) {
12             if (type == 0)
13                 iter2->updateCallPrice(iter, strike);
14             else
15                 iter2->updatePutPrice(iter, strike);
16
17             if (iter->prevUp() != nullptr) {
18                 iter = iter->prevUp()->up();
19                 iter2 = iter2->prevUp()->up();
20             } else {
21                 break;
22             }
23         }
24     }

```

Backward induction

```
1 void CRR::backwardInduction(Node * node, double u, double d, double r
2 , double time_value, int depth) {
3     double dt = time_value / depth;
4     double R = exp(r * dt);
5     double p = (R - d)/(u - d);
6     double q = 1. - p;
7     Node * iter = node;
8
9     while(iter->down()) {
10         iter = iter->down();
11     }
12
13     if(!iter->prevUp()) return;
14     iter = iter->prevUp();
15
16     while(iter->prevUp()) {
17         Node * parent = iter->prevUp();
18         while(iter->up() && iter->up()->prevUp()) {
19             iter->setValue(CRR::getNodeMeanValue(iter, R, p, q));
20             iter = iter->up()->prevUp();
21         }
22         iter->setValue(CRR::getNodeMeanValue(iter, R, p, q));
23         iter = parent;
24     }
25     iter->setValue(CRR::getNodeMeanValue(iter, R, p, q));
26 }
```

Simulations (R)

Simulation d'un mouvement brownien 2D

```
1 library(ggplot2)
2
3 n <- 2500
4 dt <- 0.01
5
6 df <- data.frame(
7     x = cumsum(c(0, rnorm(n, 0, sqrt(dt)))),
8     y = cumsum(c(0, rnorm(n, 0, sqrt(dt)))),
9     t = 0:n
10 )
11
12 ggplot(df, aes(x, y, color = t)) + geom_path() +
13     scale_color_gradientn(colors = c("orange", "red", "purple", "navy
14     ")) + coord_fixed() + labs(title = "Mouvement Brownien 2D",
15     subtitle = paste(n, "pas"))
```

Simulation d'un mouvement brownien 1D

```
1   library(ggplot2)
2
3   n <- 1000
4   dt <- 0.0001
5
6   df <- data.frame(
7     x = cumsum(c(100, rnorm(n, 0, 0.5))),
8     t = 0:n
9   )
10
11  ggplot(df, aes(t, x, color = x)) + geom_line(linewidth = 1) +
12  scale_color_gradientn(colors = c("orange", "red", "purple", "navy
    ")) + coord_cartesian(xlim = c(0, n)) + theme_minimal() +
    theme(panel.grid.major.y = element_blank(), panel.grid.minor.
      y = element_blank()) + labs(title = "Mouvement_Brownien_1D",
        subtitle = paste(n, "pas"))
```

References

- [1] *Quote Harry M. Markowitz*. Harry M. Markowitz. URL: https://www.bogleheads.org/wiki/Harry_M._Markowitz (visited on 09/06/2026).
- [2] *Harry M. Markowitz*. Harry M. Markowitz. URL: <https://arkefact.com/harry-markowitz/> (visited on 09/06/2026).
- [3] *Option*. Wikipedia. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Option_\(finance\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Option_(finance)) (visited on 03/07/2026).
- [4] *Monte Carlo methods for option pricing*. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Monte_Carlo_methods_for_option_pricing (visited on 09/06/2026).
- [5] *Asian Options Explained: Payoffs, Benefits, and Comparisons*. Investopedia. URL: <https://www.investopedia.com/terms/a/asianooption.asp> (visited on 09/12/2026).
- [6] John C. Cox, Stephen A. Ross, and Mark Rubinstein. "Option Pricing: A Simplified Approach". In: *Journal of Financial Economics* (1979). URL: <https://github.com/emintham/Papers/blob/master/Cox%2CRoss%2CRubinstein-%20Option%20Pricing:%20A%20Simplified%20Approach.pdf> (visited on 02/13/2026).
- [7] *Trinomial Tree*. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Trinomial_tree (visited on 09/06/2026).
- [8] *What are Derivatives and Why Do They Exist?* BME Bolsas y Mercados Españoles. URL: <https://www.bolsasymercados.es/en/blog/what-are-derivatives.html> (visited on 09/13/2026).
- [9] *Produits dérivés*. Société Générale Wholesale Banking. URL: <https://wholesale.banking.societegenerale.com/fr/lexique-financier/produits-derives-derivatives/> (visited on 03/07/2026).
- [10] *Derivative (finance)*. Wikipedia. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_\(finance\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Derivative_(finance)) (visited on 03/07/2026).
- [11] *Forward*. Wikipedia. URL: [https://fr.wikipedia.org/wiki/Forward_\(finance\)](https://fr.wikipedia.org/wiki/Forward_(finance)) (visited on 03/08/2026).
- [12] *Swap (Finance)*. Wikipedia. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Swap_\(finance\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Swap_(finance)) (visited on 03/08/2026).
- [13] *Understanding Vanilla Options: Types, Features, and Real-world Examples*. Investopedia. URL: <https://www.investopedia.com/terms/v/vanillaoption.asp> (visited on 09/13/2026).
- [14] *Filtration (probability theory)*. Wikipedia. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Filtration_\(probability_theory\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Filtration_(probability_theory)) (visited on 09/17/2026).
- [15] *Portfolio (finance)*. Wikipedia. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Portfolio_\(finance\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Portfolio_(finance)) (visited on 09/18/2026).
- [16] *Self-financing portfolio*. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Self-financing_portfolio (visited on 02/13/2026).
- [17] *Who are Arbitrageurs?* Quora. URL: <https://financeconcepts.quora.com/Who-are-Arbitrageurs-In-the-financial-markets-arbitrageurs-trade-when-they-are-able-to-spot-chances-to-purchase-and-se> (visited on 09/19/2026).
- [18] *Fundamental Theorem of asset pricing*. Wikipedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_theorem_of_asset_pricing (visited on 09/19/2026).
- [19] Walter Schachermayer Freddy Delbaen. *A General Version of the Fundamental Theorem of Asset Pricing (1994)*. ResearchGate. URL: https://www.researchgate.net/publication/225903732_A_General_Version_of_the_Fundamental_Theorem_of_Asset_Pricing_1994 (visited on 09/19/2026).

- [20] Stanley R. Pliska J. Michael Harrison. *Martingales and stochastic integrals in the theory of continuous trading*. ScienceDirect. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0304414981900260?via%3Dihub> (visited on 09/19/2026).
- [21] Jacques Printems. *Probabilités III - Introduction à l'évaluation d'options*. URL: https://perso.math.u-pem.fr/printems.jacques/master_gp/proba_III.pdf (visited on 02/13/2026).
- [22] *Mouvement Brownien*. Wikipedia. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_brownien (visited on 03/21/2026).
- [23] *Processus gaussien*. Wikipedia. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Processus_gaussien (visited on 03/21/2026).
- [24] Quant Catalysts. *Unlocking Stochastic Calculus: Episode 5 of 6 – Mastering Ito's Integral!* YouTube. URL: https://www.youtube.com/watch?v=Nfo3_wIWpd4 (visited on 03/22/2026).
- [25] *Modèle de Black-Scholes*. Wikipedia. URL: https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_Black-Scholes (visited on 03/21/2026).
- [26] *Du mouvement brownien à la modélisation financière TD n°4*. LPTMC. URL: [https://www.lptmc.jussieu.fr/files/TD4_Brown\(5\).pdf](https://www.lptmc.jussieu.fr/files/TD4_Brown(5).pdf) (visited on 06/22/2026).
- [27] *Black-Scholes comme limite de CRR*. Université Côte d'Azur. URL: <https://math.univ-cotedazur.fr/u/diener/L3MASS08/chap8.pdf> (visited on 06/22/2026).