

Nociones básicas. Parte 1

Tomas Santana
September, 2026

Índice

1. Escalares, vectores, matrices y conjuntos	1
2. Operaciones de vectores y matrices	2
2.1. Suma, resta	2
2.2. Producto punto	2
2.3. Normas y distancias	2
2.4. Multiplicación matricial	3
2.4.1. Propiedades de la multiplicación de matrices	3
2.5. Transpuesta	3
3. Transformaciones lineales	3
4. Transformaciones afines	4
5. Interpretación geométrica de $\mathbf{w}^T \mathbf{x} + \mathbf{b} = 0$	4
6. Sistemas lineales	4
7. Autovalores y autovectores	5
8. Nociones básicas de probabilidad	5
8.1. Variable aleatoria y espacio muestral	5
8.2. Distribución de probabilidad	5
8.3. Esperanza matemática, varianza y covarianza	5
8.4. Probabilidad conjunta, marginal y condicional	5
8.5. Independencia estocástica	6
8.6. Teorema de Bayes	6

1. Escalares, vectores, matrices y conjuntos

Un **escalar** es un único valor:

$$a \in \mathbb{R}$$

Un **vector** es una colección ordenada de valores, los denotamos con letra negrita (ejemplo: $\mathbf{x}$, $\mathbf{z}$):

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_d \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^d$$

Para diferenciar a los vectores de los puntos, se escriben como columna. Para facilitar la escritura, se suelen escribir transpuestos. Por ejemplo: $\mathbf{x}^T = [x_1, \dots, x_d]^T$.

Los vectores representan conjuntos de características. Para una casa, por ejemplo:

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 120 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{área} \\ \text{habitaciones} \\ \text{antigüedad} \end{pmatrix}$$

Una **matriz** es un conjunto de valores ordenados en dos dimensiones, por ejemplo:

$$X \in \mathbb{R}^{n \times d}$$

Por ejemplo:

$$X = \begin{pmatrix} 120 & 3 & 10 \\ 80 & 2 & 20 \\ 150 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

Un **conjunto** es una agrupación de elementos. Por ejemplo, el conjunto de entrenamiento de un modelo puede ser $S = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^n$ o $S = \{(\mathbf{x}_i, y_i) \mid i = 1, 2, \dots, n\}$, donde $\mathbf{x}_i$ son las características de una observación y y_i es la etiqueta.

2. Operaciones de vectores y matrices

2.1. Suma, resta

Para vectores y matrices con las mismas dimensiones, la suma y la resta se realizan **por componente**.

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + y_1 \\ x_2 + y_2 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 - y_1 \\ x_2 - y_2 \end{pmatrix}$$

2.2. Producto punto

Para dos vectores $\mathbf{x}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^d$ su producto punto es:

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = \sum_{j=1}^d w_j x_j$$

Por ejemplo: $\mathbf{w}^T = [2, -1]^T$, $\mathbf{x} = [3, 4]^T$ entonces:

$$\mathbf{w} \cdot \mathbf{x} = 2(3) - 1(4) = 2$$

El producto punto produce un **escalar**. Geométricamente:

$$w^T x = \|w\| \|x\| \cos(\theta)$$

Por lo tanto, también está relacionado con el grado de alineación entre dos vectores. El producto punto de dos vectores perpendiculares es 0, es máximo cuando apuntan en la misma dirección y mínimo cuando apuntan en sentidos opuestos.

2.3. Normas y distancias

La norma euclidiana (L_2): de un vector es:

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_i x_i^2}$$

La distancia euclidiana entre dos puntos es:

$$d(x, z) = \|x - z\|_2$$

La norma L_1 :

$$\|x\|_1 = \sum_i |x_i|$$

2.4. Multiplicación matricial

Si $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$ y $\mathbf{B} \in \mathbb{R}^{n \times p}$, entonces:

$$\mathbf{AB} \in \mathbb{R}^{m \times p}$$

Las dimensiones internas deben coincidir.

Por ejemplo, si $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{100 \times 5}$ y $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^5$, entonces:

$$\mathbf{Xw} \in \mathbb{R}^{100}$$

2.4.1. Propiedades de la multiplicación de matrices

1. Asociativa: $\mathbf{A}(\mathbf{BC}) = (\mathbf{AB})\mathbf{C}$
2. Distributiva respecto a la suma: $\mathbf{A}(\mathbf{B} + \mathbf{C}) = \mathbf{AB} + \mathbf{AC}$
3. Elemento neutro: $\mathbf{AI} = \mathbf{A}$ donde $\mathbf{I}$ es la matriz identidad

2.5. Transpuesta

La transpuesta intercambia filas y columnas:

$$\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n} \rightarrow \mathbf{A}^T \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

Es distributiva: $(\mathbf{AB})^T = \mathbf{A}^T \mathbf{B}^T$

Como se mencionó anteriormente, para un vector columna $\mathbf{x}$, podemos escribir $\mathbf{x}^T$ como vector fila. Por eso:

$$\mathbf{w}^T \mathbf{x} = \mathbf{w} \cdot \mathbf{x}$$

3. Transformaciones lineales

Una transformación es un nombre que se le da a una función entre espacios vectoriales:

$$T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$$

Por ejemplo de $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$.

$$T(x) = \begin{pmatrix} 2x \\ 3x \end{pmatrix}$$

Otro ejemplo, de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$.

$$T(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 2x_1 + x_2 \\ x_1 - 3x_2 \end{pmatrix}$$

Una transformación es lineal si satisface dos condiciones:

$$T(x + y) = T(x) + T(y)$$

$$T(\alpha x) = \alpha T(x)$$

Visualmente, una transformación lineal mantiene el origen fijo, y todas las líneas rectas se mantienen rectas.

Toda transformación lineal puede representarse mediante una matriz:

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax}$$

El ejemplo anterior de $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ puede expresarse de forma matricial como:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}$$

Geométicamente, una transformación lineal puede realizar operaciones como escalamiento, rotación, reflexión o proyección. En este enlace se pueden ver [más ejemplos de transformaciones lineales](#)

4. Transformaciones afines

Una transformación afín es una transformación lineal seguida de una traslación, la forma general es:

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

El origen no se mantiene fijo, por lo que no es estrictamente lineal. Esta forma es muy común en aprendizaje automático, donde $\mathbf{A}$ representa la combinación lineal de características y $\mathbf{b}$ es un sesgo.

5. Interpretación geométrica de $\mathbf{w}^T \mathbf{x} + \mathbf{b} = 0$

Consideremos:

$$\mathbf{w}^T \mathbf{x} + \mathbf{b} = 0$$

En dos dimensiones:


$$w_1 x_1 + w_2 x_2 + b = 0$$

describe una recta.

En tres dimensiones describe un plano ($w_1 x_1 + w_2 x_2 + w_3 x_3 + b = 0$).

En d dimensiones describe un **hiperplano**, donde el vector $\mathbf{w}$ es perpendicular a dicho hiperplano.

Por ejemplo, la recta $-2x_1 + 3x_2 = 0$ tiene $\mathbf{w}^T = [-2, 3]^T$:



6. Sistemas lineales

Un sistema de ecuaciones lineales puede escribirse como:

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

Si $\mathbf{A}$ es cuadrada e invertible:

$$\mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b}$$

Sin embargo, en aplicaciones numéricas normalmente no calculamos explícitamente la inversa de una matriz grande. Se utilizan algoritmos específicos para resolver el sistema.

7. Autovalores y autovectores

Un vector no nulo $\mathbf{v}$ es un autovector de $\mathbf{A}$ si:

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$$

donde λ es el autovalor correspondiente. La transformación cambia la magnitud del vector, pero mantiene su dirección:

8. Nociones básicas de probabilidad

8.1. Variable aleatoria y espacio muestral

Una **variable aleatoria** X es una función que asigna un valor numérico a cada resultado de un fenómeno aleatorio. Pueden ser discretas o continuas:

- **Discretas:** Toman valores finitos o contables (ej. la etiqueta de clase $Y \in \{0, 1\}$).
- **Continuas:** Toman valores en un intervalo continuo (ej. el valor objetivo $Y \in \mathbb{R}$).

8.2. Distribución de probabilidad

Describe cómo se distribuyen las probabilidades sobre los posibles valores de X :

- **Función de masa de probabilidad (PMF)** para variables discretas:

$$P(X = x) = p(x), \quad \text{con } \sum_x p(x) = 1$$

- **Función de densidad de probabilidad (PDF)** para variables continuas:

$$f(x) \geq 0, \quad \text{con } \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

8.3. Esperanza matemática, varianza y covarianza

- **Esperanza (Valor esperado)** $E[X]$: Representa la media ponderada de los valores que toma X :

$$E[X] = \sum_x xP(X = x) \quad \text{o} \quad E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx$$

- **Varianza** $\text{Var}(X)$: Mide la dispersión de la variable aleatoria respecto a su esperanza:

$$\text{Var}(X) = E[(X - E[X])^2] = E[X^2] - (E[X])^2$$

- **Covarianza** $\text{Cov}(X, Y)$: Cuantifica el grado de variación conjunta entre dos variables:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

8.4. Probabilidad conjunta, marginal y condicional

Dadas dos variables aleatorias X e Y :

- **Probabilidad conjunta** $P(X = x, Y = y)$: Probabilidad de que X e Y ocurran simultáneamente.
- **Probabilidad marginal** $P(X = x)$: Se obtiene al sumar o integrar sobre la otra variable:

$$P(X = x) = \sum_y P(X = x, Y = y)$$

- **Probabilidad condicional** $P(Y = y \mid X = x)$: Probabilidad de que ocurra Y dado que se ha observado X :

$$P(Y = y \mid X = x) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(X = x)}$$

8.5. Independencia estocástica

Dos variables X e Y son **independientes** si el conocimiento sobre una no altera la probabilidad de la otra:

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) \cdot P(Y = y) \rightarrow P(Y = y \mid X = x) = P(Y = y)$$

Es decir, si X e Y son independientes, la probabilidad condicional de Y dado X es simplemente la probabilidad marginal de Y . Y la probabilidad conjunta se puede factorizar como el producto de las probabilidades marginales.

8.6. Teorema de Bayes

Permite actualizar la probabilidad de una hipótesis H dada la evidencia observada E :

$$P(H \mid E) = \frac{P(E \mid H) \cdot P(H)}{P(E)}$$

Donde:

- $P(H \mid E)$ es la **probabilidad a posteriori**.
- $P(E \mid H)$ es la **verosimilitud**.
- $P(H)$ es la **probabilidad a priori**.
- $P(E) = \sum_l P(E \mid H = l)P(H = l)$ es la **evidencia** (término de normalización).

En el siguiente enlace se encuentra una [explicación más detallada del Teorema de Bayes](#).