

# Álgebra Clase 10

Tomás Ricardo Basile Álvarez  
316617194

12 de octubre de 2020

## ■ Ejercicio 10.12

a) **Encuentra un grupo infinito  $G$  y  $H \leq G$  tales que  $[G : H] < \infty$**

Sea  $G = (\mathbb{Z}, +)$  y sea  $H = \{\dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$  el subconjunto formado por los múltiplos de 2. Vemos que  $H$  es un subgrupo de  $G$  porque es cerrado bajo sumas y cerrado bajo inversos.

Ahora bien, las clases laterales (derechas) de  $H$  son  $H = \{\dots - 4, -2, 0, 2, 4, \dots\}$  y  $H + 1 = \{\dots, -3, -1, 1, 3, \dots\}$

Vemos que estas dos clases derechas forman juntas a todo  $G$ . Por lo que ya no podemos tener más clases laterales (porque deben de ser disjuntas entre sí) y concluimos que  $[G : H] = 2$ .

b) **Encuentra un grupo  $G$  y  $H \leq G$  tales que  $[G : H] = \infty$**

Sea  $G = GL_2(\mathbb{R})$  el grupo de matrices de  $2 \times 2$  invertibles con entradas reales. Y sea  $H$  el conjunto de matrices con determinante igual a 1. Hemos probado ya en otros ejercicios que  $H \leq G$ .

Ahora bien, las clases laterales de  $H$  son los conjuntos de la forma  $Ha = \{ha | h \in H\}$  que se consiguen a partir de una matriz  $a \in GL_2(\mathbb{R})$

Vemos que si  $a$  es una matriz de determinante  $\det(a) \in \mathbb{R}$ , entonces el grupo  $Ha$  se compone de puras matrices de determinante  $\det(a)$  (porque  $\det(ha) = \det(h)\det(a) = 1\det(a)$ ).

Entonces, para cada número real  $d \in \mathbb{R} - \{0\}$ , podemos tomar una matriz  $a_d$  con determinante  $d$  y construir la clase lateral  $Ha_d$ . Esta clase se compondrá de puras matrices de determinante  $d$  y nada más. Por lo que luego podemos construir otra clase lateral usando una matriz con determinante  $d' \neq d$  y será distinta a la clase  $Ha_d$  y así sucesivamente. Entonces hay por lo menos tantas clases laterales de  $H$  como números reales.

---

a) **Todo subgrupo de  $Q_8$  es isomorfo a  $\mathbb{Z}_2$ ,  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  o a  $\mathbb{Z}_4$**

En algún ejercicio habíamos calculado todos los subgrupos de  $Q_8$  y se podría ir uno a uno probando que son isomorfos a alguno de los grupos mencionados.

Sin embargo, esto no es necesario. Sabemos que los subgrupos de  $Q_8$  deben de tener una cardinalidad que divida a 8, es decir, cardinalidad 2 o 4.

Si un subgrupo tiene cardinalidad 2, entonces por la tabla vista en clase, es isomorfo a  $\mathbb{Z}_2$ . Si tiene cardinalidad 4, entonces es isomorfo a  $\mathbb{Z}_4$  o a  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ . Y ya se probó entonces el resultado.

c) El grupo  $GL_2(\mathbb{Z}_2)$  es isomorfo a  $D_{2(3)}$

Como vimos en la clase 6, este grupo está formado por las 6 matrices:

$$\begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{0} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{1} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{1} \\ \bar{0} & \bar{1} \end{pmatrix}$$

Entonces por la tabla que construimos en clase, sabemos que tiene que ser isomorfo a  $\mathbb{Z}_6$  o a  $D_{2(3)}$ .

Sin embargo,  $\mathbb{Z}_6$  es claramente abeliano, pero vemos ahora que  $GL_2(\mathbb{Z}_2)$  no lo es, pues:

$$\begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{0} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{0} \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \bar{1} & \bar{0} \\ \bar{1} & \bar{1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \bar{0} & \bar{1} \\ \bar{1} & \bar{0} \end{pmatrix}$$

Sin embargo, en el ejercicio 7.15 se pedía demostrar que si dos grupos son isomorfos y uno es abeliano, entonces también lo es el otro. Como  $GL_2(\mathbb{Z}_2)$  no es abeliano, no puede ser isomorfo a  $\mathbb{Z}_6$  que sí lo es. Y por eliminación, concluimos que  $GL_2(\mathbb{Z}_2)$  es isomorfo a  $D_{2(3)}$ .

e) **El grupo  $S_3$  es isomorfo a  $D_{2(3)}$**

Vimos ya que el grupo  $S_3$  tiene  $3! = 6$  elementos. Por lo que la tabla que tenemos de isomorfismos nos dice que debe de ser isomorfo a  $D_{2(3)}$  o a  $\mathbb{Z}_6$ .

Podemos ver ahora que  $S_3$  no es abeliano, pues:

$$(2\ 1)(3\ 2) = (1\ 2\ 3) \neq (1\ 3\ 2) = (3\ 2)(2\ 1)$$

Por el mismo argumento del inciso anterior,  $S_3$  tendría que ser abeliano para ser isomorfo a  $\mathbb{Z}_6$  que es abeliano. Por eliminación, concluimos que  $S_3$  es isomorfo a  $D_{2(3)}$

f) Todo grupo no abeliano de orden  $\leq 7$  es un grupo diédrico

$ G $	1	2	3	4	5	6	7	$2p$
$G \cong$	$\{e\}$	$\mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_3$	$\mathbb{Z}_4, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$	$\mathbb{Z}_5$	$D_{2(3)}, \mathbb{Z}_6$	$\mathbb{Z}_7$	$\mathbb{Z}_{2p}, D_{2(p)}$

En la tabla vemos todos los grupos de orden  $\leq 7$ . De estos grupos, los  $\mathbb{Z}_n$  son abelianos. También  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  es abeliano (porque  $(\overline{a_1}, \overline{a_2}) + (\overline{b_1}, \overline{b_2}) = (\overline{a_1} + \overline{b_1}, \overline{a_2} + \overline{b_2}) = (\overline{a_1 + b_1}, \overline{a_2 + b_2}) = (\overline{b_1 + a_1}, \overline{b_2 + a_2}) = (\overline{b_1} + \overline{a_1}, \overline{b_2} + \overline{a_2}) = (\overline{b_1}, \overline{b_2}) + (\overline{a_1}, \overline{a_2})$ )

Y entonces, las únicas opciones que quedan son  $D_{2(p)}$  y  $D_{2(3)}$  que son dihédricos

g) Enlista todos los grupos de orden 8 que conozcas ¿Son no-isomorfos entre sí?

Se me ocurren:

- El grupo dihédrico  $D_{2(4)}$
- El grupo de los cuaterniones  $Q_8$
- El grupo  $\mathbb{Z}_8$
- El grupo de las raíces octavas complejas de 1 (que denotaré por  $V_8$ )
- El grupo  $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$
- $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ .

De estos grupos, se puede ver que  $V_8$  es isomorfo a  $\mathbb{Z}_8$ . Esto porque en  $V_8$  podemos considerar al elemento  $e^{\pi/4}$  y todas las demás raíces octavas de 1 son de la forma  $e^{2\pi k/8} = e^{\pi k/4} = (e^{\pi/4})^k$  con  $k = 0, 1, \dots, 7$ . Por lo que todos los elementos de  $V_8$  son potencias de  $e^{1/4}\pi$ . Y entonces el grupo es cíclico y por lo tanto isomorfo a  $\mathbb{Z}_8$ .

Por otro lado, podemos ver que  $D_{2(4)}$  no es isomorfo a ningún otro grupo ya que: No es isomorfo a  $Q_8$  porque  $D_{2(4)}$  tiene dos elementos de orden 2 ( $r^2, s$ ) mientras que  $Q_8$  tiene solamente uno ( $-E$ ) por lo que no tienen la misma estructura. No es isomorfo a  $\mathbb{Z}_8, \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  porque cada uno de estos es abeliano pero  $D_{2(4)}$  no lo es.

Lo mismo sucede con  $Q_8$ , que al ser no abeliano y no ser isomorfo con  $D_{2(4)}$ , no es isomorfo con ningún elemento de la lista.

Vemos ahora que  $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$  no es isomorfo a  $\mathbb{Z}_8$ . Esto se puede ver porque  $(\overline{0}, \overline{1})$  y  $(\overline{2}, \overline{0}) \in \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$  son ambos elementos de orden 2.

Sin embargo,  $\mathbb{Z}_8$  solamente tiene a  $\overline{4}$  como elemento de orden 2.

Si fueran isomorfos, tendrían la misma cantidad de elementos de orden 2.

---

También  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  tiene por lo menos 2 elementos de orden 2, en particular  $(\bar{1}, \bar{0}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}, \bar{0})$  por lo que no es isomorfo a  $\mathbb{Z}_8$ .

Por último,  $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2$  tiene al elemento  $(\bar{1}, \bar{0})$  que es de orden 4. Mientras que  $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$  claramente no tiene elementos de orden 4. Por lo que no son isomorfos.

**h) Enlista los grupos de orden 9 que conozcas**

Solamente se me ocurren los siguientes:

- $\mathbb{Z}_9$
- $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$
- $V_9$  el conjunto de raíces novenas de 1.

Por las mismas razones del inciso anterior,  $V_9$  es isomorfo a  $\mathbb{Z}_9$ .

Ahora, vemos que  $(\bar{1}, \bar{0}), (\bar{0}, \bar{1}), (\bar{1}, \bar{1}) \in \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$  son tres elementos de orden 3 en  $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$ .

Sin embargo, los únicos elementos de orden 3 en  $\mathbb{Z}_9$  son los dos elementos  $\bar{3}, \bar{6}$ .

Si fueran isomorfos tendrían la misma cantidad de elementos de orden 3, por lo que no lo son.