

Introducción y organización

Estudiamos el fondo de ondas gravitacionales (GWs) que produce el *preheating* después de la inflación, simulado en la red con *CosmoLattice*, para modelos de inflación cuyo potencial se comporta como $|\phi|^n$ cerca del mínimo: monomiales generalizados $A|\phi|^n$, T-models $A \tanh^n(\phi/M)$ y E-models $A(1 - e^{-\phi/M})^n$. El caso de referencia es $n = 4$ con los parámetros que favorecen las observaciones del CMB según Ellis, Garcia, Olive & Verner (2026) (Sec. 2). Para $n = 4$ el espectro de hoy no depende de la historia de reheating (Sec. 4.4). Como comparación corremos también los casos cuadráticos ($n = 2$, Sec. 3), cuyo espectro de hoy sí depende de la temperatura de reheating (Sec. 6).

El repositorio está organizado en ramas:

- **main** tiene lo general. Son estas notas: el marco común (Sec. 1), los parámetros del paper, el análisis y el reescalo a hoy, los requisitos de cómputo y la guía de uso. También tiene el código de análisis y *CosmoLattice*.
- **monomial**, **t-model** y **e-model** agregan, cada una, el modelo de *CosmoLattice* (.h), sus .in y su sección de estas notas, que aparece al final al compilar en esa rama.

Las referencias a secciones de un modelo que no está en la rama actual aparecen como “la rama ...”.

1. Marco común: potenciales con mínimo $|\phi|^n$

Los tres tipos de modelo se comportan cerca del mínimo como $V \simeq A_{\text{eff}}|\phi|^n$, con $A_{\text{eff}} = A$ (monomial) o $A_{\text{eff}} = A/M^n$ (T y E). Todo lo que depende sólo de ese comportamiento está en esta sección; lo propio de cada potencial (derivadas, ϕ_0 explícito) está en la sección de cada modelo, en su rama.

1.1. Variables de programa

Cerca del mínimo, la ecuación de movimiento del modo homogéneo del campo es

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + \Omega^2(\phi)\phi = 0, \quad \Omega^2(\phi) \equiv \frac{V'(\phi)}{\phi} \simeq nA_{\text{eff}}|\phi|^{n-2}, \quad (1.1)$$

es decir, un oscilador de frecuencia $\Omega(\phi)$ que depende de la amplitud (excepto para $n = 2$). Para que el exponente α de la Sec. 1.2 cumpla su propósito (período de oscilación aproximadamente constante en tiempo de programa), ω_* debe ser precisamente esta frecuencia física evaluada en la amplitud inicial ϕ_0 . Usamos la amplitud efectiva local y no la altura global del potencial, porque durante el reheating el campo oscila en $|\phi| \lesssim M$ (prescripción de *CosmoLattice*, arXiv:2006.15122, Sec. 8):

$$f_* = \phi_0, \quad \omega_* \equiv \Omega(\phi_0) = \sqrt{nA_{\text{eff}}}\phi_0^{n/2-1}. \quad (1.2)$$

Con el acople $\frac{1}{2}g^2\phi^2\chi^2$ y $\tilde{V} = V/(f_*^2\omega_*^2)$, cerca del mínimo

$$\tilde{V}(\tilde{\phi}, \tilde{\chi}) \simeq \frac{1}{n}|\tilde{\phi}|^n + \frac{1}{2}q\tilde{\phi}^2\tilde{\chi}^2, \quad q \equiv \frac{g^2\phi_0^2}{\omega_*^2} = \frac{g^2\phi_0^{4-n}}{nA_{\text{eff}}}. \quad (1.3)$$

El factor $1/n$ es el de la normalización estándar de *CosmoLattice* (**lphi4** escribe $V = \frac{\lambda}{4}\phi^4$, es decir $A = \lambda/4$); con $n = 4$ y $A = \lambda/4$ se recupera $\omega_* = \sqrt{\lambda}\phi_0$, como en **lphi4.h**. Para $n = 4$, $\omega_*/f_* = \sqrt{4A_{\text{eff}}} \equiv \sqrt{\lambda_{\text{eff}}}$ no depende de ϕ_0 .

1.2. Reescalo temporal

Además de f_* y ω_* , *CosmoLattice* permite elegir un exponente de reescalo temporal α , definido a través de $d\tilde{t} = \omega_*a^{-\alpha}dt$. Con $\omega_* = \Omega(\phi_0)$ fijado como arriba, α debe elegirse de forma que $\Omega(\phi)$ siga siendo aproximadamente constante en tiempo de programa a lo largo de *toda* la fase de oscilaciones post-inflacionarias, no sólo en $\phi = \phi_0$.

Para un potencial monomial $V \sim |\phi|^n$, la solución autosimilar de las oscilaciones post-inflacionarias del campo homogéneo (ver p.ej. Turner 1983, y la discusión en la Sec. 8 de Figueroa, Florio, Torrenti & Valkenburg, arXiv:2006.15122) da una frecuencia de oscilación que decae con la expansión como $\Omega \sim a^{-3(n-2)/(n+2)}$. Pidiendo que esa frecuencia sea constante en tiempo de programa se obtiene

$$\alpha = 3 \frac{n-2}{n+2} \quad (1.4)$$

Esta fórmula es consistente con los modelos ya implementados en `CosmoLattice`: `lphi4` ($n = 4$) usa $\alpha = 1$, y `tanh2` ($n = 2$) usa $\alpha = 0$, ambos reproducidos por la expresión anterior. La misma elección vale para los T-models y E-models, que se reducen a un monomial de índice n cerca de $\phi = 0$, la región que domina la dinámica durante el reheating.

1.3. Condiciones iniciales: $\epsilon_V = 1$

Tomamos como condición inicial el punto en que termina el slow-roll según el parámetro del potencial,

$$\epsilon_V(\phi_0) = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi_0)}{V(\phi_0)} \right]^2 = 1, \quad (1.5)$$

que es lo que usa `tanh2.in`. La solución explícita para ϕ_0 depende del potencial y está en la sección de cada modelo: $\phi_0 = nm_p/\sqrt{2}$ (monomial), $\phi_0 = \frac{M}{2} \operatorname{arcsinh}(\sqrt{2}nm_p/M)$ (T) y $\phi_0 = M \ln(1 + nm_p/(\sqrt{2}M))$ (E).

1.4. Momento inicial

En $\epsilon = 1$ el campo ya está rodando, así que el momento inicial no puede ser nulo (`tanh2.in` usa, por ejemplo, $\dot{\phi}_0 = -3,07 \times 10^{31} \text{ GeV}^2$). Tomamos la velocidad de slow-roll, pero con el H autoconsistente, que incluye la energía cinética:

$$\dot{\phi} = -\frac{V'}{3H}, \quad H^2 = \frac{1}{3m_p^2} \left(V + \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 \right). \quad (1.6)$$

Elevando al cuadrado la primera y reemplazando la segunda queda una cuadrática en $\dot{\phi}^2$:

$$\begin{aligned} 9H^2\dot{\phi}^2 &= V'^2 \\ \frac{3}{m_p^2} \left(V + \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 \right) \dot{\phi}^2 &= V'^2 \\ \frac{3}{2}\dot{\phi}^4 + 3V\dot{\phi}^2 - m_p^2V'^2 &= 0 \\ \dot{\phi}^2 &= -V + \sqrt{V^2 + \frac{2}{3}m_p^2V'^2}. \end{aligned}$$

En ϕ_0 , la condición $\epsilon = 1$ es justamente $m_p^2V'^2 = 2V^2$, de modo que

$$\dot{\phi}_0 = -\sqrt{\left(\sqrt{\frac{7}{3}} - 1 \right) V(\phi_0)} \simeq -0,726 \sqrt{V(\phi_0)}, \quad (1.7)$$

con el signo negativo porque $\phi_0 > 0$ y el campo rueda hacia el mínimo. El resultado sólo usa $\epsilon = 1$, así que vale igual para los T-models y los E-models, cambiando únicamente $V(\phi_0)$. Con los parámetros de `tanh2.in` esta fórmula da $-3,02 \times 10^{31} \text{ GeV}^2$, un 2 % por debajo del valor de `CosmoLattice`.

Nótese que $\epsilon = 1$ es la condición de slow-roll (ϵ_V), no el final exacto de la inflación ($\epsilon_H \equiv -\dot{H}/H^2 = \frac{3}{2}\dot{\phi}^2/\rho = 1$): con el momento de arriba, $\epsilon_H(\phi_0) \simeq 0,63$. Cuánto se aparta $\epsilon_V = 1$ del final exacto, integrando el fondo homogéneo, está en la sección de cada modelo. Usamos $\epsilon_V = 1$ por consistencia con `tanh2.in`. Los números los recalcula `code/verificar_genmodels.py`.

1.5. Estabilidad numérica para $n > 4$

En variables de programa, la ecuación de movimiento de *CosmoLattice* para cada campo es (arXiv:2006.15122)

$$\ddot{\tilde{\phi}} + (3 - \alpha) \frac{a'}{a} \dot{\tilde{\phi}} - a^{-2(1-\alpha)} \tilde{\nabla}^2 \tilde{\phi} + a^{2\alpha} \frac{\partial \tilde{V}}{\partial \tilde{\phi}} = 0, \quad (1.8)$$

de modo que un modo de número de onda $\tilde{k}$ oscila con frecuencia

$$\tilde{\omega}_{\tilde{k}}^2 = a^{2\alpha-2} \tilde{k}^2 + a^{2\alpha} \frac{\partial^2 \tilde{V}}{\partial \tilde{\phi}^2}. \quad (1.9)$$

El integrador (VV2, tipo leapfrog) es estable sólo si $\tilde{\omega}_{\text{máx}} \delta \tilde{t} < 2$. Con la amplitud de las oscilaciones autosimilares, $\tilde{\Phi} \propto a^{-6/(n+2)}$, y $\alpha = 3(n-2)/(n+2)$, cada término escala así:

- **Inflatón:** $a^{2\alpha}(n-1)\tilde{\Phi}^{n-2} \propto a^0$. Es constante, porque α se eligió precisamente para eso.
- **Gradiente:** $a^{\alpha-1} \tilde{k}_{\text{máx}} \propto a^{2(n-4)/(n+2)}$, con $\tilde{k}_{\text{máx}} = 2\sqrt{3}/\delta \tilde{x}$ y $\delta \tilde{x} = 2\pi/(N\tilde{k}_{\text{IR}})$ para el laplaciano de segundo orden.
- **Campo hijo:** $a^\alpha \sqrt{q} \tilde{\Phi} \propto \sqrt{q} a^{3(n-4)/(n+2)}$.

Para $n \leq 4$ ningún término crece (en $n = 4$, `lphi4`, son constantes). Para $n > 4$ los dos últimos crecen sin cota, de modo que con $\delta \tilde{t}$ fijo la simulación se vuelve inestable a partir de

$$a_{\text{máx}}^{\text{grad}} = \left(\frac{2}{\tilde{k}_{\text{máx}} \delta \tilde{t}} \right)^{\frac{n+2}{2(n-4)}}, \quad a_{\text{máx}}^{\text{hijo}} \sim \left(\frac{2}{\sqrt{q} \delta \tilde{t}} \right)^{\frac{n+2}{3(n-4)}}. \quad (1.10)$$

La segunda es sólo una estimación, porque toma la envolvente de $\tilde{\phi}$ normalizada a 1 en $a = 1$ y no tiene en cuenta el crecimiento resonante de χ . Esto no se arregla con otra elección de α : físicamente, para $n > 4$ la frecuencia del inflatón decae más rápido que k/a y que la masa efectiva $g\Phi$ del campo hijo, así que la separación entre escalas crece con cualquier reescalo temporal. Lo mismo vale para los T-models y E-models con $n > 4$, que cerca de $\phi = 0$ son monomiales. Un ejemplo con $n = 6$, comparado con una corrida, está en la rama `monomial`.

2. Parámetros cosmológicos para modelos cuárticos ($n = 4$)

2.1. Traducción desde Ellis, Garcia, Olive & Verner

Ellis, Garcia, Olive & Verner, *Phys. Rev. D* **113**, 063571 (2026) [doi:10.1103/d35r-7bn8], contrastan los α -attractors generalizados con Planck 2018, BICEP/Keck, ACT DR6 y SPT-3G. Sus potenciales (Ecs. 39–40) son

$$V_E = \frac{3}{4} \lambda m_p^4 \left(1 - e^{-\sqrt{\frac{2}{3\alpha_K}} \frac{\phi}{m_p}} \right)^k, \quad V_T = \frac{3}{4} \lambda m_p^4 \tanh^k \left(\frac{\phi}{\sqrt{6\alpha_K} m_p} \right), \quad (2.1)$$

donde llamamos α_K al α del potencial de Kähler, para no confundirlo con el exponente de reescalo temporal α de *CosmoLattice* (que para $n = 4$ vale $\alpha = 1$). En nuestra notación ($V = A|f(\phi/M)|^n$) esto es

$$n = k, \quad A = \frac{3}{4} \lambda m_p^4, \quad M_E = \sqrt{\frac{3}{2} \alpha_K} m_p, \quad M_T = \sqrt{6 \alpha_K} m_p. \quad (2.2)$$

2.2. Por qué $k = 4$ y qué valores elegir

Para $k = 4$ la ecuación de estado del inflatón oscilando es $w = (k-2)/(k+2) = 1/3$, y el término de reheating de N_* se anula (Sec. VII.B del paper): $N_* \simeq 55,7$ (E) y $55,8$ (T) para $\alpha_K = 1$, independientemente de T_{RH} (Ec. B15). Por eso n_s y r dependen sólo de α_K y, para las ondas gravitacionales, el universo se expande como radiación desde el final de la inflación, de modo que el

corrimiento al rojo del espectro hasta hoy no depende de la historia de reheating. Además, por la Sec. 1.5, $n = 4$ no tiene la inestabilidad creciente de $n > 4$.

Lo que el paper encuentra para $k = 4$:

- **E-model:** $\alpha_K = 1$ da $n_s \simeq 0,965$, que atraviesa las elipses de Planck 2018 y es compatible con CMB-SPA; con $\alpha_K \simeq 5$ entra apenas en el 95 % de P-ACT-LB. La cota en r da $\alpha_K \lesssim 17$.
- **T-model:** $\alpha_K \lesssim 11$ es compatible con Planck 2018 y con el 95 % de CMB-SPA, aunque queda por debajo de ACT DR6.

Elegimos como casos de referencia el canónico $\alpha_K = 1$ para ambos modelos, y $\alpha_K = 5$ en el E-model como el más cercano a ACT. En vez de la Ec. 38 del paper ($\lambda \simeq 24\alpha_K\pi^2 A_s/N_*^2$, aproximada) normalizamos λ exactamente con $A_s = V/(24\pi^2\epsilon_V m_p^4) = 2,1 \times 10^{-9}$ en ϕ_* . Para eso calculamos ϕ_{end} ($\epsilon_H = 1$, fondo exacto) y ϕ_* (N_* e-folds antes, Ec. 18). Las condiciones iniciales son las de la Sec. 1.3 ($\epsilon_V = 1$), con las fórmulas de cada modelo (Sec. 8 y la rama **e-model**).

	E, $\alpha_K = 1$	T, $\alpha_K = 1$	E, $\alpha_K = 5$
N_*	55,7	55,8	55,7
n_s	0,9647	0,9641	0,9652
r	0,0036	0,0038	0,0153
λ	$1,528 \times 10^{-10}$	$1,600 \times 10^{-10}$	$7,12 \times 10^{-10}$
H_* [GeV]	$1,49 \times 10^{13}$	$1,52 \times 10^{13}$	$3,06 \times 10^{13}$
n	4	4	4
M [GeV]	$2,98225 \times 10^{18}$	$5,96451 \times 10^{18}$	$6,66852 \times 10^{18}$
A [GeV ⁴]	$4,02858 \times 10^{63}$	$4,21854 \times 10^{63}$	$1,87750 \times 10^{64}$
initial_amplitudes [GeV]	$3,56906 \times 10^{18}$	$4,69413 \times 10^{18}$	$4,73073 \times 10^{18}$
initial_momenta [GeV ²]	$-2,2449 \times 10^{31}$	$-2,0345 \times 10^{31}$	$-2,5689 \times 10^{31}$
ω_* [GeV]	$5,09 \times 10^{13}$	$1,71 \times 10^{13}$	$2,92 \times 10^{13}$
$\lambda_{\text{eff}} = 4A/M^4$	$2,04 \times 10^{-10}$	$1,33 \times 10^{-11}$	$3,80 \times 10^{-11}$

Tabla 1: Casos de referencia para $n = 4$ y valores para `genemodel.in` / `gentmodel.in` ($m_p = 2,435 \times 10^{18}$ GeV). Los recalcula `code/parametros.cuarticos.py`.

Como chequeo, el mismo código con $\alpha_K = 1$ y $N_* = 55$ reproduce la Tabla II del paper: $n_s = 0,9643$ (E) y $0,9636$ (T), idénticos, y r a menos del 1 % (el paper calcula las perturbaciones exactas; nosotros usamos slow-roll). La Ec. 38 del paper sobreestima λ en un 5 % (E, $\alpha_K = 1$) y un 13 % (E, $\alpha_K = 5$); para el T-model coincide.

Dos observaciones. Primero, $\phi_0/M = 1,20$ (E, $\alpha_K = 1$), $0,79$ (T) y $0,71$ (E, $\alpha_K = 5$): al principio el campo no está en la región cuántica, y ω_* (calculado con la aproximación local A/M^n) es sólo una escala de referencia hasta que la amplitud cae por debajo de M . Segundo, el paper no fija el acople g , de modo que q sigue siendo una elección nuestra. Cerca del mínimo el potencial de programa es $\phi^4/4 + \frac{1}{2}q\phi^2\tilde{\chi}^2$, igual que en `lphi4`, con $q = g^2/\lambda_{\text{eff}}$; un punto de partida razonable es el $q = 300$ de `lphi4.in`.

3. Parámetros cosmológicos para modelos cuadráticos ($n = 2$)

3.1. El número de e-folds depende de T_{RH}

Para $k = 2$ (el T-model y el E-model canónicos, que con $\alpha_K = 1$ es Starobinsky) el inflatón oscila como materia, $w = 0$, hasta que decae. Entonces el último término de la Ec. 27 del paper no se anula, como pasaba para $k = 4$, y N_* depende de la temperatura de reheating. Con $w_{\text{int}} = 0$,

$$N_* = 61,49 - \frac{1}{12} \ln g_{\text{RH}} + \frac{1}{4} \ln \frac{V_*^2}{m_p^4 \rho_{\text{end}}} + \frac{1}{12} \ln \frac{\rho_{\text{RH}}}{\rho_{\text{end}}}, \quad \rho_{\text{RH}} = \frac{\pi^2}{30} g_{\text{RH}} T_{\text{RH}}^4, \quad (3.1)$$

con $g_{\text{RH}} = 915/4$ (MSSM, como el paper) y ρ_{end} la densidad en $\epsilon_H = 1$, del fondo exacto. Como λ , y con ella V_* y ρ_{end} , depende de ϕ_* , la ecuación se resuelve en forma autoconsistente (`code/parametros_cuadraticos.py`). Como chequeo, con $\alpha_K = 1$ el resultado queda 0,15–0,17 e-folds por debajo de las aproximaciones analíticas B9 (E) y B10 (T) del paper, que según el mismo paper tienen un error de hasta 0,2 %. Además reproduce su ejemplo de la Sec. VII.A: $N_* = 50$ para $T_{\text{RH}} \simeq 5 \times 10^7 \text{ GeV}$, con $n_s = 0,961$.

3.2. Qué valores elegir

Según el paper (Sec. VII.A y Fig. 2), con $\alpha_K = 1$ los dos modelos son compatibles con el límite inferior de n_s de Planck 2018 (al 95 %) para $220 \text{ GeV} \lesssim T_{\text{RH}} \lesssim 10^{10} \text{ GeV}$ (E) y $2 \times 10^4 \text{ GeV} \lesssim T_{\text{RH}} \lesssim 10^{10} \text{ GeV}$ (T). Ninguno entra en el 95 % de P-ACT-LB para ningún T_{RH} . Valores mayores de α_K reducen la tensión (la cota en r da $\alpha_K \lesssim 25$ para E y $\lesssim 11$ para T). Elegimos:

- los mismos α_K que en el caso cuártico, para poder comparar: E y T con $\alpha_K = 1$, y E con $\alpha_K = 5$;
- $T_{\text{RH}} = 10^{10} \text{ GeV}$: es la cota de gravitinos, cae dentro de la ventana de Planck para los dos modelos y es la que da el n_s más alto de esa ventana (el más cercano a ACT).

Ese T_{RH} también entra en el reescaleo a hoy de las GWs (Sec. 4.4).

	E, $\alpha_K = 1$	T, $\alpha_K = 1$	E, $\alpha_K = 5$	ϕ^2 (control)
N_*	51,6	51,8	52,1	51,8
n_s	0,9626	0,9615	0,9645	0,9617
r	0,0040	0,0043	0,0151	0,153
λ	$1,691 \times 10^{-10}$	$1,843 \times 10^{-10}$	$7,01 \times 10^{-10}$	–
$H_* [\text{GeV}]$	$1,56 \times 10^{13}$	$1,63 \times 10^{13}$	$3,04 \times 10^{13}$	–
$M [\text{GeV}]$	$2,98225 \times 10^{18}$	$5,96451 \times 10^{18}$	$6,66852 \times 10^{18}$	–
A	$4,45852 \times 10^{63}$	$4,85975 \times 10^{63}$	$1,84811 \times 10^{64}$	$1,36605 \times 10^{26}$
<code>initial_amplitudes</code> [GeV]	$2,28933 \times 10^{18}$	$2,94243 \times 10^{18}$	$2,77636 \times 10^{18}$	$3,44361 \times 10^{18}$
<code>initial_momenta</code> [GeV ²]	$-2,5990 \times 10^{31}$	$-2,3131 \times 10^{31}$	$-3,3625 \times 10^{31}$	$-2,9233 \times 10^{31}$
$\omega_* = m [\text{GeV}]$	$3,17 \times 10^{13}$	$1,65 \times 10^{13}$	$2,88 \times 10^{13}$	$1,65 \times 10^{13}$
ϕ_0/M	0,77	0,49	0,42	–

Tabla 2: Casos cuadráticos con $T_{\text{RH}} = 10^{10} \text{ GeV}$. A está en GeV^4 en los T/E-models y en GeV^2 en el monomial ($V = A\phi^2$). n_s y r son de slow-roll (el paper da los exactos). Los recalcula `code/parametros_cuadraticos.py`.

Para $n = 2$, $\omega_* = \sqrt{2A}/M$ es la masa del inflatón en el mínimo, $\alpha = 0$ (el tiempo de programa es $\tilde{t} = mt$) y el potencial de programa cerca del mínimo es $\tilde{\phi}^2/2 + \frac{1}{2}q\tilde{\phi}^2\chi^2$, con $q = g^2\phi_0^2/m^2$. La masa del E-model con $\alpha_K = 1$, $3,2 \times 10^{13} \text{ GeV}$, es la conocida de Starobinsky. El monomial de control, $V = m^2\phi^2/2$, usa la masa del T-model con $\alpha_K = 1$, así que tiene el mismo potencial cerca del mínimo; está excluido por r . Arranca en $\phi_0 = \sqrt{2}m_p$ ($\epsilon_V = 1$).

El paper no fija el acople g . Usamos $q = 4 \times 10^4$, el de `tanh2.in` de *CosmoLattice*, en los cuatro casos. Con ese q la resonancia es ancha y las GWs salen en $\tilde{k} \sim 50$.

4. Análisis de las corridas y reescaleo a hoy

El script `code/analisis_cosmolattice.py` lee el directorio de salida de una corrida y produce seis gráficos (fondo, campos, espectros de los campos, errores, GWs y energías) más un `resumen.txt`. Las fórmulas de esta sección están verificadas con `sympy` en `code/verificar_reescaleo.py`, y el reescaleo a hoy está implementado en `code/reescaleo_gws.py`.

4.1. Qué escribe CosmoLattice

Todo está en variables de programa: $\tilde{t}$ con $d\tilde{t} = \omega_* a^{-\alpha} dt$, $\tilde{k} = k/\omega_*$, $\tilde{\phi} = \phi/f_*$ y $\tilde{\rho} = \rho/(f_*^2 \omega_*^2)$, con $a = 1$ al comienzo. El script lee los parámetros del `<modelo>.infos` que deja la corrida y recalcula f_* , ω_* y α con las fórmulas de la Sec. 1.1 (o las de `lphi4`). Los archivos que usa son:

- `average_scale_factor.txt`: $\tilde{t}$, a , $a' = da/d\tilde{t}$ y a'/a . El Hubble físico es $H = \omega_* a^{-\alpha} a'/a$.
- `average_scalar_i.txt`: $\langle \tilde{\phi} \rangle$, $\langle \tilde{\phi}' \rangle$, sus cuadrados y sus rms.
- `average_energies.txt`: $\tilde{\rho}$ cinético y de gradiente de cada campo, cada término del potencial y el total.
- `average_energy_conservation.txt`: el error relativo de la primera ecuación de Friedmann.
- `spectra_scalar_i.txt`: un bloque por tiempo (los tiempos están en `average_spectra_times.txt`) con $\tilde{k}$, $\Delta_{\tilde{\phi}}(\tilde{k})$, $\Delta_{\tilde{\phi}'}(\tilde{k})$ y la multiplicidad del bin.
- `spectra_energy_gws.txt` y `average_energies_gws.txt`: $\Omega_{GW}(\tilde{k}, \tilde{t}) = \rho_{\text{tot}}^{-1} d\rho_{GW}/d\log k$ (normalizado por la densidad total, no por la crítica, aunque con expansión autoconsistente son lo mismo; nota técnica II de CosmoLattice, Sec. 4), y la integral $\rho_{GW}/\rho_{\text{tot}}$.

4.2. Fondo y dinámica de los campos

La presión se arma con los términos de energía: para cada escalar $\tilde{p} = \tilde{K} - \tilde{G}/3 - \tilde{V}$ (para campos gauge, $\tilde{p} = \tilde{\rho}/3$), y $w = \tilde{p}/\tilde{\rho}$. Para un condensado que oscila en $V \propto |\phi|^n$, el teorema del virial da $\langle \dot{\phi}^2 \rangle = n\langle V \rangle$, y entonces

$$\langle w \rangle = \frac{n-2}{n+2}, \quad \rho \propto a^{-3(1+w)} = a^{-6n/(n+2)}, \quad \Phi \propto a^{-6/(n+2)}, \quad (4.1)$$

donde Φ es la amplitud de las oscilaciones. El script grafica w instantáneo y promediado, $\tilde{\rho} a^{3(1+w_n)}$ (constante si el fondo es autosimilar) y $a^{6/(n+2)} \langle \tilde{\phi} \rangle$ (oscilación de amplitud constante mientras el condensado domina). Para $n = 4$: $w = 1/3$ y $\Phi \propto a^{-1}$. El promedio de w se toma sobre períodos enteros de $\langle \tilde{\phi} \rangle$, medidos de sus cruces por cero, porque el período en $\tilde{t}$ depende de la amplitud: en `lphi4` es $T \simeq 6,52$ y no el 7,42 de amplitud unidad.

4.3. Chequeos de errores

En variables de programa (verificado con `sympy` partiendo de las ecuaciones en tiempo cósmico):

$$a'^2 = \frac{a^{2\alpha+2}}{3} \left(\frac{f_*}{m_p} \right)^2 \tilde{\rho}, \quad (4.2)$$

$$a'' = \frac{a^{2\alpha+1}}{6} \left(\frac{f_*}{m_p} \right)^2 [(2\alpha - 1)\tilde{\rho} - 3\tilde{p}], \quad (4.3)$$

$$\tilde{\rho}' = -3 \frac{a'}{a} (\tilde{\rho} + \tilde{p}), \quad (4.4)$$

y la Ec. (4.4) no depende de α . Como chequeo, con $\alpha = 1$ y radiación ($\tilde{p} = \tilde{\rho}/3$) la Ec. (4.3) da $a'' = 0$, es decir $a \propto \tilde{t}$ (tiempo conforme). El script grafica:

- el error de la Ec. (4.2), que calcula CosmoLattice;
- los residuos de (4.3) y (4.4), con las derivadas calculadas por un spline cúbico de la salida. Estos residuos están limitados por `tOutputFreq`: con diferencias centradas daban $\sim 2\%$, y con el spline quedan en $\sim 4 \times 10^{-4}$, del orden del error de Friedmann;
- la cola UV, $\Delta(\tilde{k}_{\text{máx}})/\text{máx } \Delta$, de cada espectro: si no es chica, falta resolución;

- la integral $\sum \Omega_{GW} \Delta k/k$ contra el ρ_{GW}/ρ que escribe $\mathcal{Cosmo}\mathcal{Lattice}$;
- aH/k_{IR} , que tiene que ser < 1 . Si no, hay modos de GWs fuera del horizonte, que no se diluyen como radiación y para los que el reescaleo de abajo no vale.

4.4. Reescaleo a hoy

Sea a_e el factor de escala al final de la simulación (con $a_i = 1$) y ρ_e la densidad total en ese momento. Suponemos que entre a_e y el comienzo de la dominación por radiación a_{RD} la ecuación de estado es la autosimilar, $w = (n-2)/(n+2)$, y que después se conserva la entropía. Entonces

$$\rho_{RD} = \rho_e \left(\frac{a_e}{a_{RD}} \right)^{3(1+w)} = \frac{\pi^2}{30} g_* T_{RD}^4, \quad \frac{a_{RD}}{a_0} = \left(\frac{g_{s0}}{g_{s*}} \right)^{1/3} \frac{T_0}{T_{RD}}. \quad (4.5)$$

Combinándolas (y usando $a_e/a_{RD} = (\rho_{RD}/\rho_e)^{1/4} \epsilon^{1/4}$),

$$\frac{a_e}{a_0} = \frac{\epsilon^{1/4}}{\rho_e^{1/4}} T_0 \left(\frac{\pi^2 g_*}{30} \right)^{1/4} \left(\frac{g_{s0}}{g_{s*}} \right)^{1/3}, \quad \epsilon \equiv \left(\frac{a_e}{a_{RD}} \right)^{1-3w} = \left(\frac{a_e}{a_{RD}} \right)^{\frac{2(4-n)}{n+2}}. \quad (4.6)$$

4.4.0.1 Frecuencia.

Un modo comóvil k tiene hoy $f_0 = k/(2\pi a_0)$. Escribiendo $k = \tilde{k} \omega_*$ y $\rho_e = \tilde{\rho}_e f_*^2 \omega_*^2$,

$$f_0 = \frac{\tilde{k}}{a_e \tilde{\rho}_e^{1/4}} \left(\frac{\omega_*}{f_*} \right)^{1/2} \epsilon^{1/4} C_f, \quad C_f = \frac{T_0}{2\pi} \left(\frac{\pi^2 g_*}{30} \right)^{1/4} \left(\frac{g_{s0}}{g_{s*}} \right)^{1/3} = 4,59 \times 10^{10} \text{ Hz} \quad (4.7)$$

para el Modelo Estándar ($g_* = g_{s*} = 106,75$, $g_{s0} = 3,909$, $T_0 = 2,7255 \text{ K}$). La dependencia en el modelo entra por ω_*/f_* y por n (a través de ϵ):

$$\frac{\omega_*}{f_*} = \sqrt{nA} \phi_0^{\frac{n-4}{2}} \text{ (monomial)}, \quad \frac{\omega_*}{f_*} = \sqrt{nA} M^{-n/2} \phi_0^{\frac{n-4}{2}} \text{ (T y E)}. \quad (4.8)$$

Para $n = 4$ no dependen de ϕ_0 : $\omega_*/f_* = \sqrt{4A}/M^2 = \sqrt{\lambda_{\text{eff}}} \text{ (T/E)} y \sqrt{\lambda}$ en `lphi4`.

4.4.0.2 Amplitud.

Las GWs se diluyen como radiación, $\rho_{GW} \propto a^{-4}$, así que $\Omega_{GW,0} = \Omega_{GW,e} \rho_e (a_e/a_0)^4 / \rho_{c,0}$. Escribiendo $\rho_{c,0} = \rho_{\gamma,0} / \Omega_{\gamma,0}$ con $\rho_{\gamma,0} = (\pi^2/30) 2 T_0^4$,

$$h^2 \Omega_{GW,0}(f_0) = C_\Omega \epsilon \Omega_{GW,e}(\tilde{k}), \quad C_\Omega = h^2 \Omega_{\gamma,0} \frac{g_*}{2} \left(\frac{g_{s0}}{g_{s*}} \right)^{4/3} = 1,61 \times 10^{-5} \quad (4.9)$$

con $h^2 \Omega_{\gamma,0} = 2,474 \times 10^{-5}$. La amplitud no depende de ω_* : sólo de n , a través de ϵ .

4.4.0.3 El caso cuártico.

Para $n = 4$ se tiene $1 - 3w = 0$, y entonces $\epsilon = 1$ exactamente, sin importar cuándo empieza la dominación por radiación: el resultado no depende de la historia de reheating, igual que el N_* de la Sec. 2. Así,

$$f_0 = \frac{\tilde{k} \sqrt{\lambda_{\text{eff}}}}{a_e \tilde{\rho}_e^{1/4}} \times 4,59 \times 10^{10} \text{ Hz}, \quad h^2 \Omega_{GW,0} = 1,61 \times 10^{-5} \Omega_{GW,e}. \quad (4.10)$$

Para $n \neq 4$ hay que dar a_e/a_{RD} (opción `--a_e_sobre_a_RD`). Si el inflatón se fragmenta, $w \rightarrow 1/3$ antes y $\epsilon \rightarrow 1$ (Sec. VII.B de Ellis *et al.*).

4.4.0.4 El caso cuadrático.

Para $n = 2$, $w = 0$ y $\epsilon = a_e/a_{RD}$. Si el universo se comporta como materia desde el final de la simulación hasta el reheating, $a_e/a_{RD} = (\rho_{RD}/\rho_e)^{1/3}$, con $\rho_{RD} = (\pi^2 g_*/30) T_{RH}^4$. Entonces

$$h^2 \Omega_{GW,0} \propto \epsilon = \left(\frac{\rho_{RD}}{\rho_e} \right)^{1/3}, \quad f_0 \propto \epsilon^{1/4}, \quad (4.11)$$

y la señal se diluye tanto más cuanto más bajo es T_{RH} . El analizador lo calcula con `--TRH` (y con `--w_post` se puede usar otra ecuación de estado entre a_e y a_{RD}). Es el mismo factor que dan Dufaux *et al.* (arXiv:0707.0875, nota al pie 4 de la Sec. III.D y Sec. VIII) para una etapa intermedia de materia que va de a_1 a a_2 : la amplitud baja en a_1/a_2 y la frecuencia en $(a_1/a_2)^{1/4}$. Esta suposición es la más pesimista: en las corridas, al final de la simulación $\langle w \rangle \simeq 0,25\text{--}0,29$, no 0, porque buena parte de la energía está en fluctuaciones semirrelativistas de los dos campos (Sec. 6, «Por qué $\langle w \rangle$ no es 0»). Por eso damos también la cota opuesta, $\epsilon = 1$ (radiación desde el final de la simulación). Con $T_{RH} = 10^{10}$ GeV los dos casos difieren en unos cinco órdenes de magnitud en la amplitud (Sec. 6).

4.5. Comparación con la literatura

- **Dufaux *et al.* 2007** (arXiv:0707.0875, Ecs. 45–47) escriben $f = k/(a_j \rho_j^{1/4}) \times 4 \times 10^{10}$ Hz y $\Omega_{gw} h^2 = \Omega_{rad} h^2 (g_*/g_0)^{-1/3} \epsilon \Omega_{GW,e}$, con $g_*/g_0 = 100$, $g = g_s$ y $\Omega_{rad} h^2 = 4,3 \times 10^{-5}$ (lo que da $9,3 \times 10^{-6}$). Nuestras fórmulas se reducen exactamente a las suyas con $g_s = g$ (verificado con sympy). Con sus mismas hipótesis dan $C_f = 3,97 \times 10^{10}$ Hz, y $C_\Omega = 9,26 \times 10^{-6}$ si se usa su $\Omega_{rad} h^2$ (con el nuestro, $4,16 \times 10^{-5}$, da $8,96 \times 10^{-6}$).
- **Figueroa & Torrentí 2017** (arXiv:1707.04533, Ecs. 2.24–2.27) usan la misma cadena de factores de escala y el mismo $\epsilon = (a/a_{RD})^{1-3w}$. Para la amplitud, $h^2 \Omega_{rad} (g_o/g_{RD})^{1/3}$ coincide con nuestro C_Ω salvo un factor $(g_{s0}/g_0)^{4/3} = 1,22$, porque ellos toman $g_s = g$ también hoy. Para la frecuencia escriben 8×10^9 Hz, mientras que su propia expresión con $\rho_o = 2 \times 10^{-15} \text{eV}^4$ da $\rho_o^{1/4}/(2\pi) = 5,1 \times 10^{10}$ Hz, un factor $6,4 \approx 2\pi$ mayor. No pudimos reconciliar ese factor a partir del texto; nuestro C_f coincide con el de Dufaux *et al.*
- **Prueba de punta a punta:** corrimos `lphi4` con los parámetros de Dufaux *et al.* ($q = g^2/\lambda = 120$, hasta $\tilde{t} = 240$; $N = 64$, $\tilde{k}_{IR} = 0,7$, `withGWs = true`) y la analizamos con el script. El fondo sigue a la radiación: $\langle w \rangle = 0,334$ en los dos últimos períodos. El error de Friedmann queda por debajo de $4,0 \times 10^{-4}$, y $k_{IR}/(aH) = 162$ al final, así que todos los modos de GWs están dentro del horizonte. El pico final da $h^2 \Omega_{GW,0} = 7,0 \times 10^{-11}$ en $f_0 = 1,09 \times 10^8$ Hz, contra $h^2 \Omega_{gw} \sim 3 \times 10^{-11}$ en $f \sim 7 \times 10^7$ Hz del paper (su Fig. 4). Pasado a sus constantes ($9,3 \times 10^{-6}$ y 4×10^{10} Hz) nuestro pico queda en $4,1 \times 10^{-11}$ y $9,5 \times 10^7$ Hz: un factor $\sim 1,4$ en ambos. Es una concordancia razonable, porque el espectro es ancho (varía menos de un factor 2 en $1 \lesssim \tilde{k} \lesssim 10$), nuestra caja es chica ($\Delta \tilde{k}/\tilde{k} = 20\%$ en el pico) y el código y las condiciones iniciales son distintos. No es una reproducción fina.

4.6. Uso

```
python3 code/analisis_cosmolattice.py DIR_DE_LA_CORRIDA [--gstar 106.75] [--a_e_sobre_a_RD 1]
python3 code/verificar_reescalo.py # sympy + comparación con la literatura
```

Para que haya espectro de GWs hay que correr con `withGWs = true`.

5. Corridas cuárticas: archivos y requisitos de memoria y tiempo

5.1. Los `.in`

Los tres casos de la Tabla 1 quedaron en `models/parameter-files/`: `gentmodel.cuartico.in` (T , $\alpha_K = 1$), `genemodel.cuartico.in` (E , $\alpha_K = 1$) y `genemodel.cuartico_aK5.in` (E , $\alpha_K = 5$); el monomial de control

`genmonomial_cuartico.in` se describe en la rama `monomial`. Los tres usan `withGWs = true`, $n = 4$, $q = 120$ (el de Dufaux *et al.*, con el que se comparó el analizador en la Sec. 4.5), $N = 64$, $\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,7$, $\delta\tilde{t} = 0,01$ y `VV2`. `code/parametros_cuarticos.py` comprueba que M , A , ϕ_0 y $\dot{\phi}_0$ coinciden con la tabla (diferencia relativa $\leq 1,3 \times 10^{-5}$, por el redondeo).

Con $N = 32$ los tres corren hasta el final, con $\langle w \rangle \rightarrow 1/3$ y error de Friedmann $\leq 5 \times 10^{-4}$. Al comienzo $a'/a = 0,44$ (T), $0,16$ (E, $\alpha_K = 1$) y $0,32$ (E, $\alpha_K = 5$), todos menores que $\tilde{k}_{\text{IR}}$, así que ningún modo arranca fuera del horizonte. El campo hijo crece por resonancia y ρ_{GW}/ρ llega a $\sim 10^{-5}$, pero lo hace lentamente: alcanza el 90 % de su valor final en $\tilde{t} \simeq 270$ (T), 360 (E, $\alpha_K = 5$) y 420 (E, $\alpha_K = 1$, que en $\tilde{t} = 500$ todavía crece un 10 %). Por eso $\tilde{t}_{\text{máx}} = 500$, y 600 para el E-model con $\alpha_K = 1$.

5.2. Memoria

Medida como el máximo de memoria residente (`/usr/bin/time`) en corridas de pocos pasos con dos escalares:

$$\text{RSS} \simeq 10 \text{ MB} + b N^3, \quad b \simeq \begin{cases} 148 \text{ B/sitio} & \text{con GWs} \\ 63 \text{ B/sitio} & \text{sin GWs} \end{cases} \quad (5.1)$$

Con GWs se midieron 13, 48, 310, 592 y 1011 MB para $N = 32, 64, 128, 160$ y 192; la estimación que imprime `CosmoLattice` al empezar queda un $\sim 30\%$ por debajo. Los 148 B son unos 18 números de doble precisión por sitio: ϕ , π de los dos escalares, las 6 componentes de h_{ij} y sus 6 momentos, más temporarios. La máquina tiene 3.7 GB de RAM, con ~ 2 GB libres en uso normal, de modo que:

- $N \leq 192$ (1.06 GB) entra. Para $N = 192$ conviene cerrar el navegador.
- $N = 224$ (1.7 GB) queda al límite.
- $N = 256$ (2.5 GB con GWs) no entra: pasaría a swap y el tiempo se dispara. Sin GWs (1.1 GB) sí entraría.

5.3. Tiempo

El costo por paso escala como N^3 : $\simeq 140$ ns por sitio con GWs y 84 ns sin GWs, con 8 hilos (medido restando dos corridas de distinta duración, para descontar la inicialización). En números: $N = 64$, 32 ms/paso; $N = 128$, 0.30 s/paso; $N = 192$, 1.0 s/paso. Con 4 hilos (los núcleos físicos) es un $\sim 13\%$ más lento, así que conviene `OMP_NUM_THREADS=8`. Cada espectro (`tOutputInfreq`) cuesta lo mismo que ~ 3 pasos, despreciable con `tOutputInfreq = 10`. El tiempo total es

$$t_{\text{total}} \simeq 140 \text{ ns} \times N^3 \times \frac{\tilde{t}_{\text{máx}}}{\delta\tilde{t}}. \quad (5.2)$$

5.4. El paso temporal

En variables de programa con $n = 4$ y $\alpha = 1$, la frecuencia más alta de la grilla no crece con a (Sec. 1.5):

$$\tilde{\omega}_{\text{máx}}^2 \simeq \left(\frac{2\sqrt{3}}{\delta\tilde{x}} \right)^2 + q (a\tilde{\phi})^2, \quad \delta\tilde{x} = \frac{2\pi}{N\tilde{k}_{\text{IR}}}, \quad (5.3)$$

con $a\tilde{\phi} \lesssim 1$. `VV2` es estable si $\tilde{\omega}_{\text{máx}}\delta\tilde{t} < 2$. Comprobamos tres cosas:

- **Barrido en $\delta\tilde{t}$** ($N = 32$, $\tilde{t}_{\text{máx}} = 300$; $\delta\tilde{t} = 0,04, 0,02, 0,01, 0,005$): el error máximo de Friedmann da $9,9 \times 10^{-3}$, $2,2 \times 10^{-3}$, $5,6 \times 10^{-4}$ y $1,4 \times 10^{-4}$, es decir $\simeq 5,6 \delta\tilde{t}^2$, como corresponde a un integrador de segundo orden. En la etapa no lineal ese error crece con N , porque se pueblan más modos: con $\delta\tilde{t} = 0,01$ el máximo pasa de $5,6 \times 10^{-4}$ ($N = 32$) a $1,3 \times 10^{-3}$ ($N = 64$, corrida completa). Si para $N \geq 128$ se quiere mantenerlo por debajo de 10^{-3} , conviene bajar a $\delta\tilde{t} = 0,007$, lo que alarga el tiempo un 40 %. El ρ_{GW}/ρ final varía un $\pm 10\%$ sin tendencia con $\delta\tilde{t}$: es la sensibilidad propia de la dinámica no lineal, y conviene tomarla como la incerteza de una sola corrida.
- **¿Hace falta bajar $\delta\tilde{t}$ al subir N ?** Corrimos $N = 32$ con $\tilde{k}_{\text{IR}} = 2,8$ y 4,2, que tienen la misma $\delta\tilde{x}$ que $N = 128$ y 192 con $\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,7$ (y sin `kCutOff`, para poblar el UV). Con $\delta\tilde{t} = 0,01$ ($\tilde{\omega}_{\text{máx}}\delta\tilde{t}$ hasta 0,75) contra 0,005, ρ_{GW}/ρ cambia menos de un 1 %. Por lo tanto $\delta\tilde{t} = 0,01$ sirve hasta $N = 192$ y no hace falta la regla $\delta\tilde{t} \propto 1/N$.
- **Regla adoptada:** $\delta\tilde{t} = \min(0,01, 0,75/\tilde{\omega}_{\text{máx}})$. Con $\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,7$ sólo empieza a bajar a partir de $N \simeq 210$.

5.5. Recomendación

N	$\tilde{k}_{\text{IR}}$	$\tilde{k}_{\text{máx}}$	$\delta\tilde{t}$	memoria	s/paso	$\tilde{t}_{\text{máx}} = 500$
32	0.7	19	0.01	0.01 GB	0.005	4 min
64	0.7	39	0.01	0.05 GB	0.037	0.5 h
128	0.35	39	0.01	0.32 GB	0.29	4.1 h
192	0.233	39	0.01	1.06 GB	0.99	14 h
256	—	—	—	2.5 GB	2.3	no entra

Tabla 3: Costo con GWs y 8 hilos (estimado con `code/recursos_cosmolattice.py`, a partir de las mediciones de arriba).

Con $N = 64$ la cola UV de los espectros ya es chica ($\Delta(\tilde{k}_{\text{máx}})/\text{máx } \Delta \lesssim 10^{-7}$ para los campos), pero el pico de GWs cae en $\tilde{k} \sim 3\text{--}11$, donde los bins de $\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,7$ son anchos. Por eso, al subir N conviene **mantener $\tilde{k}_{\text{máx}}$ y bajar $\tilde{k}_{\text{IR}}$ como $0,7 \times 64/N$** . Así se agranda la caja y se resuelve mejor el pico, sin cambiar $\delta\tilde{t}$, y el costo sigue escalando como N^3 . Con $\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,35$ el T-model arranca con los modos más IR fuera del horizonte ($a'/a = 0,44$), pero salen enseguida, porque aH cae como $1/\tilde{t}$. El chequeo $aH/k_{\text{IR}} < 1$ del analizador lo verifica al final.

Pasos sugeridos:

1. Explorar con $N = 64$ (media hora por corrida).
2. Correr las de producción con $N = 128$, $\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,35$ (unas 4 h, por ejemplo de noche). Ya están hechas para los cuatro casos: entre 2.9 y 4.3 h cada una (Sec. 5.7). Como con $N = 128$ la forma del espectro no cambia y la amplitud se mueve tanto como entre semillas, para seguir bajando la incertidumbre conviene correr más semillas antes que subir N .
3. Reservar $N = 192$ para una única corrida de convergencia (14 h, con la máquina descargada).

Como es una notebook (i7-8565U), en corridas largas puede bajar la frecuencia por temperatura, así que los tiempos son una cota inferior. Por ejemplo:

```
python3 code/recursos_cosmolattice.py --kmax-fijo --N 64 128 192 --tMax 500
OMP_NUM_THREADS=8 ./gentmodel input=../models/parameter-files/gentmodel_cuartico.in N=128 kIR=0.35
```

Para correr los tres casos en secuencia (compila los ejecutables si faltan, verifica antes de empezar que la memoria alcance, saltea las corridas ya terminadas y analiza cada una al terminar):

```
nohup code/correr_cuarticos.sh 128 > corridas_N128.log 2>&1 & # kIR = 0.7*64/N por defecto
DT=0.007 MODELLOS="gentmodel_cuartico" code/correr_cuarticos.sh 128
```

Las salidas quedan en `build.corridas/<caso>_N<N>kIR<kIR>/`.

5.5.0.1 Validación con $N = 64$.

Corrimos `gentmodel_cuartico.in` tal como está ($N = 64$, $\tilde{t}_{\text{máx}} = 500$). Tardó 28 min (33.5 ms/paso; la estimación era 30 min), y el analizador da:

- fondo: $\langle w \rangle = 0,333$, error máximo de Friedmann $1,3 \times 10^{-3}$, colas UV $\leq 10^{-8}$ y $k_{\text{IR}}/(aH) = 344$ al final;
- GWs: $\rho_{\text{GW}}/\rho = 1,1 \times 10^{-5}$, que llega al 90 % de su valor final en $\tilde{t} \simeq 260$ (con $N = 32$ era 270), y un pico hoy de $h^2\Omega_{\text{GW},0} = 8,7 \times 10^{-11}$ en $f_0 = 4,1 \times 10^8$ Hz.

Con $N = 32$ el ρ_{GW}/ρ final era $1,8 \times 10^{-5}$: un 40 % de diferencia entre las dos resoluciones. Es una razón más para hacer las corridas de producción con $N = 128$ y comparar. Con $N = 128$ ($\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,35$, misma semilla) la diferencia con $N = 64$ baja a un 3 % (Sec. 5.7).

5.6. Resultados cuárticos con $N = 64$

Corrimos los cuatro casos de la Tabla 9 con `code/correr_cuarticos.sh 64` ($N = 64$, $\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,7$, $\delta\tilde{t} = 0,01$, el $\tilde{t}_{\text{máx}}$ de cada `.in`): entre 19 y 30 min cada uno. La Fig. 1 los compara y la Tabla 4 resume los números; las figuras de cada caso están en la sección de su modelo, en su rama. Ambas las regenera `code/comparar_corridas.py`.




Figura 1: Los cuatro casos cuárticos con $N = 64$. (a) Espectro de GWs al final de la simulación, en unidades de programa. (b) El mismo espectro llevado a hoy (Sec. 4.4); el punto marca el máximo. (c) Fracción de la energía en GWs; la línea punteada marca el máximo de $\text{rms}(\tilde{\chi})$, es decir, cuándo la resonancia satura.

caso	$f_{\text{pico}} [\text{Hz}]$	$\tilde{k}_{\text{pico}}$	$h^2\Omega_{GW,0}^{\text{pico}}$	$\tilde{k}$ con $> \frac{1}{2}$ pico	Hz por $\tilde{k}$	ρ_{GW}/ρ	$\tilde{t}_\chi$	$\tilde{t}_{90}$
T, $\alpha_K = 1$	$4,1 \times 10^8$	3.5	$8,7 \times 10^{-11}$	1.4–11	$1,19 \times 10^8$	$1,12 \times 10^{-5}$	121	270
E, $\alpha_K = 1$	$9,5 \times 10^8$	2.8	$6,3 \times 10^{-11}$	1.4–6.3	$3,40 \times 10^8$	$0,79 \times 10^{-5}$	186	380
E, $\alpha_K = 5$	$4,9 \times 10^8$	2.8	$8,4 \times 10^{-11}$	1.4–8.4	$1,76 \times 10^8$	$0,99 \times 10^{-5}$	146	340
ϕ^4 (control)	$9,9 \times 10^8$	11.2	$8,8 \times 10^{-11}$	2.1–17	$0,89 \times 10^8$	$1,36 \times 10^{-5}$	80	230

Tabla 4: Resultados con $N = 64$. $\tilde{t}_\chi$: máximo de $\text{rms}(\tilde{\chi})$; $\tilde{t}_{90}$: cuándo ρ_{GW}/ρ llega al 90 % de su valor final. La columna «Hz por $\tilde{k}$ » es el factor que lleva $\tilde{k}$ a f_0 (Sec. 4.4).

5.6.0.1 Las corridas son confiables.

En las cuatro, $\langle w \rangle$ queda a menos de 0,5 % de $1/3$ y el error de Friedmann es $\leq 2,4 \times 10^{-3}$ (el mayor es el del monomial, que es el que más se expande). Todos los modos de GWs terminan dentro del horizonte ($k_{\text{IR}}/(aH) \geq 343$), y la integral del espectro de GWs reproduce el ρ_{GW}/ρ de CosmoLattice a 10^{-14} . La producción está saturada: ρ_{GW}/ρ crece menos de un 5 % en los últimos 100 de $\tilde{t}$. La corrida T repite la de validación con otra semilla y da el mismo ρ_{GW}/ρ a un 0,2 % ($1,116 \times 10^{-5}$ contra $1,114 \times 10^{-5}$), pero esa coincidencia fue casual: con cinco semillas la dispersión es del 6 % (Sec. 5.7).

5.6.0.2 En la red, los cuatro espectros son casi iguales en el IR y difieren en el UV.

Para $\tilde{k} \lesssim 3$ los cuatro espectros finales coinciden dentro de un factor 1,5 ($\Omega_{GW,e} \simeq 1\text{--}5 \times 10^{-6}$; Fig. 1a). Esto es lo esperable, porque en variables de programa los cuatro casos tienen el mismo potencial cerca del mínimo ($\tilde{\phi}^4/4$) y el mismo $q = 120$. La diferencia está en el UV: el espectro se extiende más cuanto antes satura la resonancia. El orden es el mismo en $\tilde{t}_\chi$ y en el corte UV: monomial ($\tilde{t}_\chi = 80$, el espectro supera la mitad del pico hasta $\tilde{k} \simeq 17$), T (121; 11), E con $\alpha_K = 5$ (146; 8.4) y E con $\alpha_K = 1$ (186; 6.3). Una explicación posible es que, al saturar antes, la cascada no lineal tiene más tiempo para llevar energía al UV; con estas cuatro corridas no lo podemos separar de otros efectos. Que la resonancia llegue antes o después tiene que ver con cuánto se aparta el arranque del régimen cuártico, pero no sólo a través de ϕ_0/M : el E-model con $\alpha_K = 1$ ($\phi_0/M = 1,2$) es el más tardío, pero el E-model con $\alpha_K = 5$ ($\phi_0/M = 0,71$) resuena después que el T-model ($\phi_0/M = 0,79$), así que también importa la forma del potencial.

5.6.0.3 Hoy, las amplitudes son parecidas y las frecuencias se separan.

Como $\epsilon = 1$ (Sec. 4.4), la amplitud de hoy es el $\Omega_{GW,e}$ de la red por la misma constante en los cuatro casos. Por eso los máximos quedan todos entre 6 y 9×10^{-11} . La frecuencia, en cambio, se reescala con un factor distinto en cada caso, $\propto (\omega_*/f_*)^{1/2}/(a_e\tilde{\rho}_e^{1/4})$, que va de $0,89 \times 10^8$ Hz (monomial) a $3,4 \times 10^8$ Hz (E, $\alpha_K = 1$) por unidad de $\tilde{k}$. Ese factor es lo que separa las curvas de la Fig. 1b. El T-model y el monomial tienen el mismo ω_*/f_* , pero el monomial arranca con más energía en unidades de programa y se expande más antes de llegar a $w = 1/3$: su $a\tilde{\rho}^{1/4}$ es 1,20 veces el del T-model al principio y 1,34 veces al final (en radiación, $a\tilde{\rho}^{1/4}$ es constante). Por eso sus frecuencias quedan 1,34 veces más bajas.

5.6.0.4 La frecuencia del pico no es robusta.

Los cuatro espectros son anchos: el de hoy supera la mitad del máximo en una década de $\tilde{k}$ (en el monomial, de $\tilde{k} = 2,1$ a 17). Además, con $\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,7$ los bins tienen un ancho de 20–25 % en el pico. Por eso el máximo puede caer en bins muy distintos. Por ejemplo, el monomial y el E-model con $\alpha_K = 1$ tienen el pico casi en la misma frecuencia ($\simeq 10^9$ Hz) por razones opuestas: el monomial tiene un factor de reescalo chico y el pico en $\tilde{k} = 11,2$, porque su espectro sigue plano hasta ahí, y el E-model un factor grande y el pico en $\tilde{k} = 2,8$. Para comparar modelos conviene usar la banda en la que el espectro supera la mitad del máximo, no la frecuencia del pico. Las corridas con $N = 128$ y $\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,35$ lo confirman (Sec. 5.7). Con bins el doble de finos, el pico del monomial pasa de $\tilde{k} = 11,2$ a $4,55$ y el del E-model con $\alpha_K = 1$ de $2,8$ a $1,4$, mientras que la banda casi no cambia.

5.7. Semillas y resolución: más realizaciones y $N = 128$

Las corridas de la Sec. 5.6 usaron una semilla aleatoria distinta en cada caso, así que las diferencias entre modelos mezclaban la física con la variación entre realizaciones de las fluctuaciones iniciales. Para separarlas hicimos tres series:

- el T-model con $N = 64$ y otras cuatro semillas (`baseSeed` = 20261005, 1, 2 y 3);
- los cuatro casos con $N = 64$ y la misma semilla (20261005);
- los cuatro casos con $N = 128$, $\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,35$ (mismo $\tilde{k}_{\text{máx}} = 39$, caja el doble de grande) y la misma semilla.

Todas se corrieron con `SEMILLA=<s>code/correr_cuarticos.sh <N>` y se comparan con `code/comparar_corridas.py` y `code/semillas_resolucion.py` (que da las tablas de esta sección).

semilla	ρ_{GW}/ρ	$h^2\Omega_{GW,0}^{\text{pico}}$	$\tilde{k}$ con $> \frac{1}{2}$ pico	$\tilde{t}_\chi$	$\tilde{t}_{90}$
original	$1,12 \times 10^{-5}$	$8,7 \times 10^{-11}$	1.4–11	121	270
20261005	$1,00 \times 10^{-5}$	$7,7 \times 10^{-11}$	1.4–11	110	260
1	$1,15 \times 10^{-5}$	$7,6 \times 10^{-11}$	1.4–12	113	250
2	$1,11 \times 10^{-5}$	$8,8 \times 10^{-11}$	1.4–11	113	240
3	$1,00 \times 10^{-5}$	$7,7 \times 10^{-11}$	1.4–11	121	280
media $\pm$ desv.	$(1,07 \pm 0,07) \times 10^{-5}$	$(8,1 \pm 0,6) \times 10^{-11}$		116 ± 5	

Tabla 5: El T-model ($\alpha_K = 1$) con $N = 64$ y cinco semillas. El pico de hoy cae siempre en $\tilde{k} = 3,5$ ($4,1 \times 10^8$ Hz).

5.7.0.1 La variación entre realizaciones es del 6–7 %.

En el T-model, ρ_{GW}/ρ varía un 6,4 % entre semillas (desviación estándar relativa), el máximo de hoy un 7,3 % y $\tilde{t}_\chi$ un 4 % (Tabla 5). La banda y el bin del pico son los mismos en las cinco. La dispersión está medida sólo para el T-model; en el E-model con $\alpha_K = 1$ podría ser mayor: con dos semillas, su $\tilde{t}_\chi$ va de 186 a 239.

caso	ρ_{GW}/ρ [10^{-5}]			$\tilde{k}_{\text{pico}}$ 64 $\rightarrow$ 128	$\tilde{k}$ con $> \frac{1}{2}$ pico 64 $\rightarrow$ 128	$h^2\Omega_{GW,0}^{\text{pico}}$	$N = 128$ banda [Hz]
	$N = 64$, orig.	$N = 64$	$N = 128$				
T, $\alpha_K = 1$	1.12	1.00	0.97	3,5 $\rightarrow$ 3,15	1,4–11 $\rightarrow$ 1,4–10	$7,9 \times 10^{-11}$	$1,7 \times 10^8$ – $1,2 \times 10^9$
E, $\alpha_K = 1$	0.79	0.72	0.59	2,8 $\rightarrow$ 1,4	1,4–6,3 $\rightarrow$ 1,05–6,3	$4,5 \times 10^{-11}$	$3,6 \times 10^8$ – $2,1 \times 10^9$
E, $\alpha_K = 5$	0.99	0.93	0.84	2,8 $\rightarrow$ 3,15	1,4–8,4 $\rightarrow$ 1,4–7,7	$7,4 \times 10^{-11}$	$2,5 \times 10^8$ – $1,4 \times 10^9$
ϕ^4 (control)	1.36	1.30	1.22	11,2 $\rightarrow$ 4,55	2,1–17 $\rightarrow$ 1,75–16	$8,8 \times 10^{-11}$	$1,55 \times 10^8$ – $1,4 \times 10^9$

Tabla 6: Los cuatro casos con la semilla original de cada uno ($N = 64$, Tabla 4) y con la misma semilla (20261005) para $N = 64$ y $N = 128$ ($\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,35$). La banda es donde el espectro de hoy supera la mitad de su máximo.




Figura 2: Los cuatro casos cuárticos con $N = 128$, $\tilde{k}_{\text{IR}} = 0,35$ y la misma semilla. Paneles como en la Fig. 1.

5.7.0.2 El orden entre modelos es robusto; la diferencia entre T y E con $\alpha_K = 5$, no.

Con las dos semillas y con las dos resoluciones, ρ_{GW}/ρ sigue el orden monomial $> T > E (\alpha_K = 5) > E (\alpha_K = 1)$ (Tabla 6). Con la misma semilla y $N = 64$, el monomial produce un 30 % más que el T-model y el E-model con $\alpha_K = 1$ un 28 % menos: varias veces la dispersión entre semillas. El E-model con $\alpha_K = 5$, en cambio, produce un 7 % menos que el T-model con $N = 64$ y un 13 % menos con $N = 128$, del orden de esa dispersión, y sus máximos de hoy se invierten entre las dos semillas. Con estas corridas no los podemos distinguir.

5.7.0.3 Con $N = 128$ la forma del espectro no cambia; la amplitud se mueve como entre realizaciones.

Las cuatro corridas son tan buenas como las de $N = 64$: $\langle w \rangle$ a menos de 0,4 % de $1/3$, error de Friedmann $\leq 2,4 \times 10^{-3}$, $k_{\text{IR}}/(aH) \geq 172$ al final y la integral del espectro igual a ρ_{GW}/ρ a 10^{-15} . Respecto de $N = 64$ con la misma semilla, ρ_{GW}/ρ baja entre un 3 % (T) y un 18 % (E, $\alpha_K = 1$). La forma del espectro, en cambio, se mantiene: la fracción de ρ_{GW} en cada rango de $\tilde{k}$ ($< 1,05$, $1,05-3$, $3-8$, $8-20$) cambia a lo sumo en 0,07. Si la diferencia viniera de la caja más grande o de la resolución, se concentraría en el IR o en el UV. Con otra grilla, la misma semilla genera otra realización de las fluctuaciones iniciales, así que una diferencia que no cambia la forma es lo esperable de la variación entre realizaciones. La mayor es la del E-model con $\alpha_K = 1$, que resuena más tarde ($\tilde{t}_\chi \simeq 235$ con esta semilla), no termina de saturar (crece un 8,5 % en los últimos 100 de $\tilde{t}$, con las dos resoluciones) y cuyo $\tilde{t}_\chi$ es el que más varía con la semilla. Sus valores son cotas inferiores.

5.7.0.4 La banda es robusta; el pico no.

Con bins el doble de finos, el pico se mueve hasta un factor 2,5 en $\tilde{k}$ (monomial: de 11,2 a 4,55), porque los espectros son mesetas anchas y el máximo cae en cualquier punto de ellas. Los bordes de la banda, en cambio, se mueven menos de un bin de $N = 64$ abajo y menos de un 10 % arriba. Hoy, con $N = 128$, los cuatro casos superan la mitad de su máximo entre $1,55 \times 10^8$ y $2,1 \times 10^9$ Hz, con máximos de $4,5$ a $8,8 \times 10^{-11}$.

6. Corridas cuadráticas: resultados con $N = 64$

Corrimos los cuatro casos de la Tabla 2 con `code/correr_cuadraticos.sh 64`. Para que sean comparables entre sí, los cuatro usan la misma grilla ($N = 64$, $\tilde{k}_{\text{IR}} = 3$, $\tilde{k}_{\text{máx}} = 166$), el mismo paso ($\delta\tilde{t} = 0,003$), el mismo $\tilde{t}_{\text{máx}} = 400$, el mismo $q = 4 \times 10^4$ y la misma semilla (`baseSeed = 20261005`). Así las fluctuaciones iniciales son la misma realización y las diferencias vienen sólo del potencial. Cada corrida tardó entre 51 y 70 min. Los casos cuárticos de la Sec. 5.6 tenían semillas aleatorias distintas.




Figura 3: Los cuatro casos cuadráticos con $N = 64$ y la misma semilla. (a) Espectro de GWs al final de la simulación. (b) Llevado a hoy con $T_{RH} = 10^{10}$ GeV y $w = 0$ hasta el reheating (línea llena; el punto marca el máximo), y con $\epsilon = 1$, radiación desde el final de la simulación (línea cortada). (c) Fracción de la energía en GWs; la línea punteada marca cuándo $\text{rms}(\tilde{\chi})$ llega a la mitad de su máximo.

caso	ρ_{GW}/ρ	crece	$\langle w \rangle_e$	$h^2 \Omega_{GW,0}^{\text{máx}} (w=0)$	banda ($w=0$) [Hz]	$h^2 \Omega_{GW,0}^{\text{máx}} (\epsilon=1)$	ϵ
T, $\alpha_K = 1$	$1,23 \times 10^{-5}$	10 %	0,27	$2,4 \times 10^{-16}$	$1,4 \times 10^7 - 2,6 \times 10^8$	$7,3 \times 10^{-11}$	$3,3 \times 10^{-6}$
E, $\alpha_K = 1$	$0,89 \times 10^{-5}$	26 %	0,29	$0,9 \times 10^{-16}$	$1,3 \times 10^7 - 4,3 \times 10^8$	$4,2 \times 10^{-11}$	$2,1 \times 10^{-6}$
E, $\alpha_K = 5$	$1,02 \times 10^{-5}$	16 %	0,26	$1,3 \times 10^{-16}$	$1,9 \times 10^7 - 3,2 \times 10^8$	$5,5 \times 10^{-11}$	$2,3 \times 10^{-6}$
ϕ^2 (control)	$2,46 \times 10^{-5}$	4 %	0,25	$4,8 \times 10^{-16}$	$5,8 \times 10^6 - 1,9 \times 10^8$	$1,5 \times 10^{-10}$	$3,3 \times 10^{-6}$

Tabla 7: Resultados cuadráticos con $N = 64$. «Crece»: aumento de ρ_{GW}/ρ en los últimos 100 de $\tilde{t}$. $\langle w \rangle_e$: promedio en los dos últimos periodos. La banda es donde el espectro de hoy supera la mitad de su máximo. $\epsilon = a_e/a_{RD}$ para $T_{RH} = 10^{10}$ GeV y $w = 0$.

6.0.0.1 Las corridas son numéricamente buenas.

El error de Friedmann es $\leq 9 \times 10^{-5}$ en las cuatro, la integral del espectro de GWs reproduce ρ_{GW}/ρ a 10^{-14} y todos los modos terminan dentro del horizonte ($k_{IR}/(aH) \geq 39$).

6.0.0.2 El condensado se fragmenta casi por completo.

En los cuatro casos, $\langle \tilde{\phi} \rangle a^{3/2}$ (que sin resonancia oscilaría con amplitud constante) cae a la mitad entre $\tilde{t} \simeq 108$ y 140. Al final queda entre el 0,2 % y el 3 % de su amplitud inicial.

6.0.0.3 Por qué $\langle w \rangle$ no es 0.

Para un potencial cuadrático, $w = 0$ vale para el condensado homogéneo oscilando: por el teorema del virial, la presión promediada en una oscilación se anula. En las corridas eso se cumple antes de la resonancia, pero deja de valer cuando el condensado se fragmenta:

caso	$\tilde{t} = 20-50$	100-150	200-250	350-400	gradientes / total (final)
T, $\alpha_K = 1$	0,028	0,149	0,239	0,265	37 %
E, $\alpha_K = 1$	0,016	0,130	0,219	0,280	38 %
E, $\alpha_K = 5$	0,026	0,125	0,225	0,268	36 %
ϕ^2 (control)	0,029	0,043	0,238	0,250	33 %

Tabla 8: $\langle w \rangle$ promediado en ventanas de $\tilde{t}$, y fracción de la energía total que está en gradientes al final de cada corrida cuadrática.

Antes de la resonancia $\langle w \rangle \simeq 0,02-0,03$. Lo esperable es 0; la diferencia probablemente viene de que la ventana no abarca un número entero de oscilaciones y de que al principio la expansión no es despreciable frente a la frecuencia de oscilación. Después, w sube hasta 0,25-0,29, en el monomial más tarde porque resuena más tarde. El mecanismo es el siguiente:

- **La energía pasa a modos con momento alto.** La resonancia y la cascada no lineal que la sigue pasan la energía del condensado ($k = 0$) a fluctuaciones de χ y de ϕ con momentos comparables o mayores que la masa. Al final, la mitad de la energía de gradiente de cada campo está en $\tilde{k} \gtrsim 60\text{--}100$, es decir, con momento físico $p/m = \tilde{k}/a \simeq 1,5\text{--}2,5$ (con la masa desnuda $m = \omega_*$). Esas partículas son semirrelativistas y su presión se acerca a la de la radiación.
- **No llega a 1/3** porque parte de la energía sigue en modos no relativistas (restos del condensado y partículas con $p \lesssim m$) y porque las masas efectivas inducidas por la interacción ($g^2\langle\chi^2\rangle$ para ϕ , $g^2\langle\phi^2\rangle$ para χ) son apreciables.

Es lo mismo que encontraron Podolsky, Felder, Kofman & Peloso para $m^2\phi^2/2 + g^2\phi^2\chi^2/2$ en simulaciones en la red (Phys. Rev. D **73**, 023501 (2006), arXiv:hep-ph/0507096, Sec. III.B y Fig. 1): w pasa bruscamente de 0 a $\sim 0,2\text{--}0,3$ al final del preheating, en $t \sim 100\text{--}150/m$, y no llega enseguida a 1/3. Según los autores, esto se debe en parte a que justo después del preheating el campo liviano todavía tiene una masa efectiva inducida importante, y en parte a la contribución residual del inflatón homogéneo. Dufaux *et al.* (arXiv:0707.0875, Sec. III.D) toman ese mismo resultado como punto de partida del reescalo a hoy.

6.0.0.4 Qué pasa después de la simulación.

El valor $w \simeq 0,25$ no debería mantenerse. El momento físico de cada partícula cae como $1/a$, así que, si el inflatón no decae antes, sus partículas se vuelven no relativistas cuando el universo se expande otro factor $\sim 2\text{--}3$ (con las estimaciones de arriba) y w vuelve a bajar hacia 0. Podolsky *et al.* (Sec. III.B, punto iii) lo argumentan así para un inflatón masivo: aun en minoría al final del preheating, sus partículas terminan dominando y el universo vuelve a estar dominado por materia. Lozanov & Amin (Phys. Rev. Lett. **119**, 061301 (2017), arXiv:1608.01213) encuentran lo mismo en simulaciones de la fragmentación del inflatón sin campo hijo: para $V \propto |\phi|^{2n}$ cerca del mínimo, a tiempos largos $w \rightarrow 0$ si $n = 1$ y $w \rightarrow 1/3$ para n mayores (modelos de un solo campo, con simulaciones en la red). Para el caso cuártico ($n = 2$ en su notación) esto es consistente con $w = 1/3$ y con que $\epsilon = 1$ (Sec. 4.4). Para seguir la evolución de w fuera de la red, `w_post_simulacion.py` trata cada modo del último espectro como partículas libres:

- el número de partículas $n_k = \rho_k/\omega_k$, con $\rho_k = (\Delta_\pi + \omega_k^2 \Delta_\phi)/2$, se conserva (es un invariante adiabático);
- la energía por partícula es $\omega_k = \sqrt{\tilde{k}^2/a^2 + \tilde{m}_{\text{eff}}^2}$, con las masas de campo medio $\tilde{m}_\phi^2 = 1 + q\langle\tilde{\chi}^2\rangle$ y $\tilde{m}_\chi^2 = q\langle\tilde{\phi}^2\rangle$, recalculadas a cada a ;
- el condensado es el modo $k = 0$ de ϕ .

Las masas de campo medio cuentan dos veces la interacción $U = \frac{q}{2}\langle\tilde{\phi}^2\rangle\langle\tilde{\chi}^2\rangle$. Por eso la energía es $\rho = \sum n_k \omega_k - U$ y la presión es $p = \sum n_k \tilde{k}^2/(3a^2 \omega_k) + U$. Con estas dos expresiones, $d\rho/d\ln a = -3(\rho + p)$ se cumple a 2×10^{-7} . Sin ningún ajuste, el modelo da $w(a_s) = 0,27\text{--}0,29$ al final de la simulación, cerca de lo medido en la red (0,25–0,28, Tabla 8). Después, w baja de 0,1 cuando a crece otro factor 4,6–6,3, y es prácticamente 0 a partir de $a \sim 100 a_s$ (Fig. 4).




Figura 4: $w(a)$ entre el final de la simulación (a_s) y el reheating ($T_{\text{RH}} = 10^{10}$ GeV, $a_{\text{RD}} \simeq 2\text{--}3 \times 10^5 a_s$), en el modelo de partículas libres con masas de campo medio. La línea de trazos es $w = 1/3$.

6.0.0.5 El orden es el inverso del caso cuártico.

Las GWs empiezan a crecer ($\rho_{\text{GW}}/\rho = 10^{-8}$) en $\tilde{t} \simeq 70$ (E, $\alpha_K = 1$), 75 (T y E con $\alpha_K = 5$) y 120 (monomial). En el caso cuártico el monomial era el primero en resonar (Sec. 5.6). Aun así, el monomial termina con más GWs: $\rho_{\text{GW}}/\rho = 2,5 \times 10^{-5}$, el doble que el T-model, con más potencia en el IR ($\Omega_{\text{GW},e} \simeq 0,9 \times 10^{-5}$ en $\tilde{k} = 3$, contra

$1,4\text{--}2,6 \times 10^{-6}$). Con una sola semilla por caso no podemos decir si esa diferencia es mayor que la variación entre realizaciones.

6.0.0.6 En la red, la producción es como la del caso cuártico.

$\rho_{GW}/\rho \simeq 1\text{--}2,5 \times 10^{-5}$, y el espectro final es plano ($\Omega_{GW,e} \simeq 1\text{--}5 \times 10^{-6}$) desde $\tilde{k} \simeq 3$ hasta $\tilde{k} \simeq 100$ (Fig. 3a). Hay dos limitaciones:

- **El UV no está resuelto.** El espectro sigue plano hasta muy cerca de $\tilde{k}_{\text{máx}} = 166$, y la cola de GWs en $\tilde{k}_{\text{máx}}$ es $\sim 10^{-4}$ del máximo. Con $N = 32$ ($\tilde{k}_{\text{máx}} = 83$) el T-model daba un máximo en $\tilde{k} \simeq 50$, cerca de su propio corte, y $\rho_{GW}/\rho = 1,7 \times 10^{-5}$ (28 % más). La forma del espectro por encima de $\tilde{k} \sim 50$ depende entonces de la resolución, y el máximo no tiene sentido: cae en el primer bin o en cualquier punto de la meseta. Para resolver el UV hace falta $N = 128$ con el mismo $\tilde{k}_{\text{IR}}$, unas 9 h por corrida.
- **La producción no terminó del todo.** ρ_{GW}/ρ crece entre un 4 % y un 26 % en los últimos 100 de $\tilde{t}$. Con $w \simeq 0,25$, sin fuente ese cociente bajaría como $a^{-0,25}$, así que todavía se producen GWs. Los valores finales son entonces cotas inferiores, con un margen de $\sim 10\text{--}30\%$.

6.0.0.7 Hoy, lo que manda es la historia después de la simulación.

Con $T_{\text{RH}} = 10^{10}$ GeV y $w = 0$ hasta el reheating, $\epsilon = 2\text{--}3 \times 10^{-6}$. La meseta queda en $h^2\Omega_{GW,0} \sim 10^{-16}$ (máximos de $0,9$ a $4,8 \times 10^{-16}$), entre 6×10^6 y 4×10^8 Hz. Con $\epsilon = 1$ los mismos espectros dan $4 \times 10^{-11}\text{--}1,5 \times 10^{-10}$ entre 10^8 y 2×10^9 Hz, del mismo orden que el caso cuártico. Si w se quedara en el valor medido al final ($\simeq 0,25$) hasta el reheating, $\epsilon \simeq 0,07\text{--}0,08$ y los máximos serían $3\text{--}12 \times 10^{-12}$ (`--w.post 0.25`). Ninguno de los extremos es realista:

- $w = 0$ desde a_e ignora que el inflatón ya está fragmentado;
- $w \simeq 0,25$ constante ignora que las partículas de ϕ y χ , que tienen masa, se vuelven no relativistas a medida que el universo se expande, y entonces w vuelve a bajar.

Con la evolución de w del modelo de partículas libres (Fig. 4), $\epsilon = (\rho_s/\rho_{RD})(a_s/a_{RD})^4 = 1,3\text{--}1,8 \times 10^{-5}$. Es entre 4,5 y 6,4 veces el valor con $w = 0$, y entre 4400 y 5800 veces menor que con $w \simeq 0,25$ constante. La etapa semirrelativista dura poco, así que el resultado queda cerca del extremo $w = 0$. Los máximos de hoy son $h^2\Omega_{GW,0} = 0,6\text{--}2,1 \times 10^{-15}$, entre 8×10^6 y 7×10^8 Hz (más de la mitad del máximo). El modelo tiene sus propios supuestos:

- supone que entre a_s y a_{RD} no hay dispersión ni decaimiento, y que el reheating es instantáneo;
- usa la relación de dispersión del continuo, aunque con $N = 64$ el UV no está resuelto;
- toma la energía total de la simulación en a_s y del modelo usa sólo la forma de $\rho(a)$.

Como la etapa con $w > 0,1$ dura un factor ~ 5 en a , un error de $\sim 10\%$ en w cambia ϵ en $\sim 15\%$. Lo robusto es la comparación con el caso cuártico: la producción en la red es parecida, y lo que separa a los modelos cuadráticos (hasta cinco órdenes de magnitud abajo) es la expansión tipo materia hasta el reheating, que no existe para $n = 4$.

7. Guía de uso: los cuatro casos, sus parámetros y cómo correrlos

7.1. Los cuatro casos

	T, $\alpha_K = 1$	E, $\alpha_K = 5$	E, $\alpha_K = 1$	monomial (control)
archivo .in	gentmodel.cuartico	genemodel.cuartico_aK5	genemodel.cuartico	genmonomial.cuartico
ejecutable	gentmodel	genemodel	genemodel	genmonomial
$V(\phi)$	$A \tanh^4(\phi/M)$	$A(1 - e^{-\phi/M})^4$	$A(1 - e^{-\phi/M})^4$	$A\phi^4$
M [GeV]	$5,96451 \times 10^{18}$	$6,66852 \times 10^{18}$	$2,98225 \times 10^{18}$	—
A [GeV ⁴ o adim.]	$4,21854 \times 10^{63}$	$1,87750 \times 10^{64}$	$4,02858 \times 10^{63}$	$3,33322 \times 10^{-12}$
$\phi_0 = f_*$ [GeV]	$4,69413 \times 10^{18}$	$4,73073 \times 10^{18}$	$3,56906 \times 10^{18}$	$6,88722 \times 10^{18}$
$\dot{\phi}_0$ [GeV ²]	$-2,0345 \times 10^{31}$	$-2,5689 \times 10^{31}$	$-2,2449 \times 10^{31}$	$-6,2899 \times 10^{31}$
ω_* [GeV]	$1,714 \times 10^{13}$	$2,915 \times 10^{13}$	$5,094 \times 10^{13}$	$2,515 \times 10^{13}$
$\omega_*/f_* = \sqrt{\lambda_{\text{eff}}}$	$3,651 \times 10^{-6}$	$6,163 \times 10^{-6}$	$1,427 \times 10^{-5}$	$3,651 \times 10^{-6}$
q	120	120	120	120
tMax	500	500	600	500
n_s, r	0.964, 0.004	0.965, 0.015	0.965, 0.004	0.946, 0.29 (excluido)

Tabla 9: Los cuatro casos cuárticos ($n = 4$, por lo tanto $\alpha = 1$ en `CosmoLattice`). En los tres primeros, A está en GeV⁴ porque multiplica una función adimensional; en el monomial es adimensional ($V = A\phi^4$). Todos los valores los recalcula `code/parametros.cuarticos.py`, que además comprueba que coinciden con los .in.

7.2. Cada parámetro de los .in

Todos los .in cuárticos tienen las mismas claves. Las que no aparecen toman el valor por defecto de *CosmoLattice* (`include/CosmoInterface/runparameters.h`). Cualquiera se puede cambiar desde la terminal sin editar el archivo, agregando `clave=valor` al comando (ver la Sec. 7.3).

7.2.0.1 Salida.

`outputfile = ./` Directorio donde se escriben los archivos de salida, relativo al directorio desde el que se lanza el ejecutable.

`print_headers = true` Escribe una línea de encabezado con el nombre de cada columna. El analizador la usa para identificar las columnas.

`overwriteFiles = false` Si en el directorio ya hay una salida, *CosmoLattice* se niega a pisarla. Para repetir una corrida, pasar `overwriteFiles=true` (el script lo hace solo).

7.2.0.2 Evolución.

`expansion = true` Expansión autoconsistente: $a(\tilde{t})$ se evoluciona con las ecuaciones de Friedmann, usando la energía de los campos.

`evolver = VV2` Velocity-Verlet de segundo orden para los escalares. Las GWs se evolucionan con leapfrog (`doLFforGWs = true` por defecto). Error de Friedmann $\propto \delta\tilde{t}^2$ (Sec. 5.4).

7.2.0.3 Grilla.

`N = 64` Puntos por lado; hay N^3 sitios. Fija la memoria ($\simeq 10 \text{ MB} + 148 \text{ B} \times N^3$) y el tiempo ($\propto N^3$). Ver la Tabla 3.

`dt = 0.01` Paso temporal en tiempo de programa $\tilde{t}$. Es estable y está convergido hasta $N = 192$ (Sec. 5.4).

`kIR = 0.7` Momento más chico de la caja, en unidades de ω_* . El lado de la caja es $\tilde{L} = 2\pi/\tilde{k}_{\text{IR}} \simeq 9$, el momento máximo es $\tilde{k}_{\text{máx}} = \sqrt{3}N\tilde{k}_{\text{IR}}/2$ (39 para $N = 64$) y el ancho de los bins de los espectros es $\tilde{k}_{\text{IR}}$. Al subir N , conviene bajarlo como $0,7 \times 64/N$.

7.2.0.4 Tiempos de salida

(en $\tilde{t}$).

`tOutputFreq = 0.2` Cada cuánto se escriben los promedios (`average*.txt`: fondo, campos, energías, Friedmann). Tiene que resolver la oscilación del inflatón (período $\tilde{T} \simeq 6\text{--}10$), porque el analizador promedia w por períodos y deriva con splines.

`tOutputInfreq = 10` Cada cuánto se escriben los espectros de los campos y de GWs (`spectra*.txt`). Cada uno cuesta ~ 3 pasos, así que bajarlo a 5 es barato si se quieren más curvas.

`tOutputRareFreq = 50` Cada cuánto se toman instantáneas 3D de la energía. Sólo actúa si se piden instantáneas (claves `snapshots`, que no usamos).

`tMax` Tiempo final. Es 500 o 600 (Tabla 9), elegido para que ρ_{GW}/ρ haya saturado (Sec. 5.1).

7.2.0.5 Espectros.

`PS_type = 1` Espectro de tipo I: suma sobre los modos de cada bin con su multiplicidad exacta. Captura mejor la cola UV que el tipo II (nota técnica II de *CosmoLattice*, Sec. 4.1).

`PS_version = 1` Reescalea cada bin por su valor central.

7.2.0.6 Condiciones iniciales.

`kCutOff = 18` Las fluctuaciones cuánticas iniciales se siembran sólo en $\tilde{k} < 18$. Así se evita que el ruido de vacío de los modos UV, que no tiene significado físico en la grilla, genere GWs espurias. La resonancia está en $\tilde{k} \sim 1\text{--}10$.

`initial_amplitudes =  $\phi_0$` 0 Valor homogéneo inicial de ϕ y de χ en GeV. El primero fija $f_* = \phi_0$. Viene de $\epsilon_V = 1$ (Sec. 1.3).

`initial_momenta =  $\dot{\phi}_0$` 0 Velocidades homogéneas iniciales en GeV^2 : slow-roll con H autoconsistente (Sec. 1.4).

`baseSeed` (no está en los .in) Semilla de las fluctuaciones iniciales. Si no se da, es aleatoria y cada corrida es una realización distinta: de ahí la dispersión de $\pm 10\%$ en ρ_{GW}/ρ de la Sec. 6.4. Para comparar corridas que difieren en un solo parámetro conviene fijarla (`baseSeed=1234`).

7.2.0.7 Modelo.

n = 4 Potencia del potencial. Fija $\alpha = 3(n-2)/(n+2) = 1$ y la ecuación de estado $w = 1/3$.

M Escala del T/E-model en GeV: $\sqrt{6\alpha_K} m_p$ (T) o $\sqrt{3\alpha_K/2} m_p$ (E). No aparece en el monomial.

A Altura del potencial, $A = \frac{3}{4}\lambda m_p^4$ con λ normalizado al CMB (Sec. 2). En el monomial, $A = \lambda_{\text{eff}}/4$.

q = 120 Parámetro de resonancia $q = g^2\phi_0^2/\omega_*^2 = g^2/\lambda_{\text{eff}}$ para el acople $\frac{1}{2}g^2\phi^2\chi^2$. El paper no lo fija: 120 es el valor de Dufaux *et al.*

7.2.0.8 GWs.

withGWs = true Evoluciona las perturbaciones tensoriales h_{ij} , que duplica la memoria y suma $\sim 70\%$ al tiempo por paso, y escribe **spectra_energy_gws.txt** y **average_energies_gws.txt**.

GWprojectorType = 1 Proyector transverso-sin-traza construido con el momento de red $k_L = k_L^0$ (derivada centrada). Las tres opciones dan espectros casi idénticos salvo en la cola UV (nota técnica II, Sec. 4.1).

7.3. Cómo correrlo desde la terminal

Todos los comandos se escriben desde la raíz del repositorio (CL_GWs/).

7.3.0.1 1. Estimar memoria y tiempo antes de lanzar.

```
python3 code/recursos_cosmolattice.py --kmax-fijo --N 64 128 192 --tMax 500
```

Imprime $\delta\tilde{t}$, memoria, segundos por paso y horas totales, y avisa si no entra en la memoria libre.

7.3.0.2 2a. Correr los casos con el script (recomendado).

```
code/correr_cuarticos.sh           # los 3 del paper, N = 64 (~1.5 h)
code/correr_cuarticos.sh 128       # N = 128, kIR = 0.35 (~13 h)
CONTROL=1 code/correr_cuarticos.sh 64 # los 3 + el monomial de control (~2 h)
MODELOS="genmonomial_cuartico" code/correr_cuarticos.sh 64 # sólo el control
nohup code/correr_cuarticos.sh 128 > corridas_N128.log 2>&1 & # sigue al cerrar la terminal
```

El script compila los ejecutables que faltan y verifica la memoria antes de empezar. Después corre los casos uno por uno: cada uno usa los 8 hilos, así que correrlos a la vez no ahorra tiempo. Saltea los que ya terminaron (**FORZAR=1** para repetirlos) y analiza cada uno al terminar. Otras opciones: un segundo argumento para **kIR**, **DT=0.007**, **NTHREADS=4** y **EXTRA_ARGS="baseSeed=1234 tMax=300"**. Las salidas quedan en **build.corridas/<caso>_N<N>_kIR<kIR>/**, y los tiempos reales en **build.corridas/tiempos.txt**.

7.3.0.3 2b. Correr un caso a mano.

```
# compilar (una vez por modelo)
mkdir -p build_genmonomial && cd build_genmonomial
cmake .. -DMODEL=genmonomial -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release && make -j4
# correr (desde un directorio propio, porque escribe la salida en ./)
mkdir -p corrida_N64 && cd corrida_N64
OMP_NUM_THREADS=8 ../genmonomial input=../../models/parameter-files/genmonomial_cuartico.in
# cualquier parámetro del .in se puede pisar en la línea de comandos:
OMP_NUM_THREADS=8 ../genmonomial input=../../models/parameter-files/genmonomial_cuartico.in \
  N=128 kIR=0.35 baseSeed=1234 overwriteFiles=true
```

7.3.0.4 3. Seguir una corrida en curso.

```
tail -f build_corridas/gentmodel_cuartico_N64_kIR0.7/salida.log # "Step ... Current time: t~"
tail -f corridas_N128.log # progreso del script
free -h # memoria libre
```

7.3.0.5 4. Analizar.

python3 code/analisis_cosmolattice.py build_corridas/gentmodel_cuartico_N64_kIR0.7

Los gráficos y el `resumen.txt` quedan en `analisis/` dentro de cada corrida (Sec. 4). Para comparar el control con el T-model, hay que mirar los `05_gws.png` y `06_energias.png` de las dos corridas con la misma N y `kIR`, idealmente con la misma `baseSeed`.

8. T-models: $V = A \tanh^n(\phi/M)$

Implementado en `models/gentmodel.h`; los `.in` son `gentmodel.in` ($n = 2, 5$, exploratorio) y `gentmodel_cuartico.in` (caso del paper, Sec. 2).

8.1. Derivadas

Consideremos que los potenciales de tipo T-model generales son de la forma

$$V(\phi) = A \tanh^n\left(\frac{\phi}{M}\right) \quad (8.1)$$

Para la implementación de estos modelos en `CosmoLattice` debemos calcular sus derivadas primera y segunda:

$$V'(\phi) = \frac{An}{M} \tanh^{n-1}\left(\frac{\phi}{M}\right) \operatorname{sech}^2\left(\frac{\phi}{M}\right) \quad (8.2)$$

$$V''(\phi) = \frac{An}{M^2} \operatorname{sech}^2\left(\frac{\phi}{M}\right) \tanh^{n-2}\left(\frac{\phi}{M}\right) \left[(n-1) \operatorname{sech}^2\left(\frac{\phi}{M}\right) - 2 \tanh^2\left(\frac{\phi}{M}\right) \right] \quad (8.3)$$

8.2. Variables computacionales

El potencial de los T-models está acotado: satura en A para $|\phi| \gg M$. Si eligiéramos ω_* pidiendo que el coeficiente de $\tanh^n(\phi/M)$ en $\tilde{V}$ sea exactamente 1, ω_* no quedaría atado a la frecuencia física de oscilación alrededor de $\phi = 0$ y el α de la Sec. 1.2 dejaría de cumplir su propósito. Seguimos en cambio el criterio de la Sec. 1.1: durante el reheating el campo oscila en $|\phi| \ll M$, donde

$$V(\phi) = A \tanh^n\left(\frac{\phi}{M}\right) \underset{|\phi| \ll M}{\simeq} \frac{A}{M^n} |\phi|^n, \quad (8.4)$$

así que $A_{\text{eff}} = A/M^n$ y

$$\omega_*^2 = A_{\text{eff}} n \phi_0^{n-2} = \frac{An}{M^n} \phi_0^{n-2} \quad \implies \quad \begin{cases} \omega_* = \sqrt{An} M^{-n/2} \phi_0^{n/2-1} \\ q = \frac{g^2 \phi_0^2}{\omega_*^2} = \frac{g^2 \phi_0^{4-n} M^n}{nA} \end{cases} \quad (8.5)$$

Con esta elección, y definiendo nuevamente $\tilde{M} \equiv M/\phi_0$, el potencial de programa resulta (puede verificarse por sustitución directa de $\phi = \phi_0 \tilde{\phi}$, $\chi = \phi_0 \tilde{\chi}$)

$$\tilde{V}(\tilde{\phi}, \tilde{\chi}) = \frac{1}{n} \left| \tilde{M} \tanh\left(\frac{\tilde{\phi}}{\tilde{M}}\right) \right|^n + \frac{1}{2} q \tilde{\phi}^2 \tilde{\chi}^2, \quad (8.6)$$

que se reduce correctamente al caso monomial ($|\tilde{\phi}|^n/n$) en el límite $\tilde{M} \rightarrow \infty$ ($M \rightarrow \infty$ a ϕ_0 fijo), y a `tanh2.h` para $n = 2$ ($\omega_* = \sqrt{2A}/M \rightarrow \sqrt{\Lambda^4}/M$ con $A = \Lambda^4/2$), como debe ser.

8.3. Condiciones iniciales

La condición $\epsilon_V = 1$ (Sec. 1.3) para este potencial:

$$\begin{aligned} \epsilon &= \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2 \\ \frac{V'(\phi)}{V(\phi)} &= \frac{n \operatorname{sech}^2(\phi/M)}{M \tanh(\phi/M)} = \frac{n}{M} \frac{1}{\sinh(\phi/M) \cosh(\phi/M)} = \frac{2n}{M} \operatorname{csch}\left(\frac{2\phi}{M}\right) \\ 1 &= \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{2n}{M} \operatorname{csch}\left(\frac{2\phi_0}{M}\right) \right]^2 \\ \frac{M^2}{2n^2 m_p^2} &= \operatorname{csch}^2\left(\frac{2\phi_0}{M}\right) \\ \sinh\left(\frac{2\phi_0}{M}\right) &= \frac{\sqrt{2} n m_p}{M} \\ \phi_0 &= \frac{M}{2} \operatorname{arcsinh}\left(\frac{\sqrt{2} n m_p}{M}\right) \end{aligned} \quad (8.7)$$

8.4. Momento inicial

Por el argumento de la Sec. 1.4, $\dot{\phi}_0 = -\sqrt{(\sqrt{7/3}-1)A} \tanh^n(\phi_0/M)$. Con los parámetros de `gentmodel.in` ($n = 2, 5$, $M = 10 m_p$) da $\dot{\phi}_0 = -1,914 \times 10^{31} \text{ GeV}^2$. El final exacto de la inflación ($\epsilon_H = 1$) cae en $\phi = 3,18 \times 10^{18} \text{ GeV}$, contra $\phi_0 = 4,22 \times 10^{18} \text{ GeV}$.

8.5. Resultados con $N = 64$

La comparación con los otros casos está en la Sec. 5.6; acá van las figuras de la corrida `gentmodel.cuartico.in`, que salen de `code/analisis_cosmolattice.py` (las cuatro restantes, `01_fondo`, `03_espectros_campos`, `04_errores` y `06_energias`, quedan en `build-corridas/<caso>_N64_kIRO.7/analisis/`).




Figura 5: T-model, $\alpha_K = 1$, $N = 64$. Izquierda: $\langle \tilde{\phi} \rangle$ multiplicado por $a^{6/(n+2)} = a$, que sería una oscilación de amplitud constante sin resonancia. Derecha: rms de cada campo y $|\langle \tilde{\phi} \rangle|$.




Figura 6: T-model, $\alpha_K = 1$, $N = 64$. Espectro de GWs en la red (izquierda) y llevado a hoy (derecha), a cada tiempo de salida (claro = temprano).

El campo hijo crece exponencialmente desde $\tilde{t} \simeq 25$ y su rms es máximo en $\tilde{t} = 121$. Ahí la resonancia satura: el condensado $\langle \tilde{\phi} \rangle$ deja de oscilar con amplitud constante (Fig. 5) y la energía pasa a las fluctuaciones de los dos campos. Las GWs siguen ese mismo orden (Fig. 6). Primero crece la banda de la resonancia, $\tilde{k} \simeq 1-3$; después la cascada no lineal llena el espectro hasta $\tilde{k} \sim 20$. A partir de $\tilde{t} \simeq 270$ el espectro sólo cambia de forma (ρ_{GW}/ρ crece un 4% en los últimos 100 de $\tilde{t}$).

Hoy, el espectro final tiene el máximo en $h^2 \Omega_{GW,0} = 8,7 \times 10^{-11}$, en $f_0 = 4,1 \times 10^8 \text{ Hz}$, y supera la mitad del máximo entre $1,7 \times 10^8$ y $1,3 \times 10^9 \text{ Hz}$ ($\tilde{k} = 1,4-11$). La corrida repite la de validación de la Sec. 5.5 con otra semilla, y ρ_{GW}/ρ coincide a un 0,2%.

8.6. Corridas cuadráticas con $N = 64$

La comparación de los cuatro casos cuadráticos (misma grilla, mismo q y misma semilla) y sus limitaciones (el UV no está resuelto y la producción no terminó del todo) están en la Sec. 6. Acá van las figuras de `gentmodel_cuadratico.in`.




Figura 7: T-model cuadrático, $\alpha_K = 1$, $N = 64$. Izquierda: $\langle\tilde{\phi}\rangle$ multiplicado por $a^{6/(n+2)} = a^{3/2}$, que sin resonancia oscilaría con amplitud constante. Derecha: rms de cada campo y $|\langle\tilde{\phi}\rangle|$.




Figura 8: T-model cuadrático, $\alpha_K = 1$, $N = 64$. Espectro de GWs en la red (izquierda) y llevado a hoy con $T_{\text{RH}} = 10^{10}$ GeV y $w = 0$ hasta el reheating (derecha), a cada tiempo de salida (claro = temprano).

Las GWs empiezan a crecer en $\tilde{t} \simeq 75$ ($\rho_{\text{GW}}/\rho = 10^{-8}$). La amplitud de $a^{3/2}\langle\tilde{\phi}\rangle$ cae a la mitad en $\tilde{t} \simeq 108$, y al final queda el 0,2% de la inicial: es el caso con la fragmentación más completa de los cuatro (Fig. 7). Al final, $\rho_{\text{GW}}/\rho = 1,23 \times 10^{-5}$, que todavía crece un 10% en los últimos 100 de $\tilde{t}$, y $\langle w \rangle = 0,27$.

En la red, el espectro final es plano entre $\tilde{k} \simeq 6$ y 108 (Fig. 8). Con $N = 32$ ($\tilde{k}_{\text{máx}} = 83$), la misma configuración daba el máximo en $\tilde{k} \simeq 50$ y $\rho_{\text{GW}}/\rho = 1,7 \times 10^{-5}$, así que la forma por encima de $\tilde{k} \sim 50$ depende de la resolución. Hoy, con $T_{\text{RH}} = 10^{10}$ GeV y $w = 0$, la meseta da un máximo de $h^2\Omega_{\text{GW},0} = 2,4 \times 10^{-16}$ y supera la mitad del máximo entre $1,4 \times 10^7$ y $2,6 \times 10^8$ Hz. Con $\epsilon = 1$ daría $7,3 \times 10^{-11}$ en $8,3 \times 10^8$ Hz, del orden del T-model cuártico ($8,7 \times 10^{-11}$, Sec. 8.5).