



Politechnika Wrocławska

Wydział Matematyki

Kierunek studiów: Matematyka

Specjalność: Matematyka teoretyczna

Praca dyplomowa – licencjacka

## TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ

Imię i nazwisko dyplomanta

słowa kluczowe:  
tutaj podajemy najważniejsze słowa kluczowe (łącznie nie powinny być dłuższe niż 150 znaków).

krótkie streszczenie:

Tutaj piszemy krótkie streszczenie pracy (nie powinno być dłuższe niż 530 znaków).

Opiekun pracy dyplomowej	dr inż. Dawid Huczek	.....	.....
	Tytuł/stopień naukowy/imię i nazwisko	ocena	podpis

*Do celów archiwalnych pracę dyplomową zakwalifikowano do:\**

*a) kategorii A (akta wieczyste)*

*b) kategorii BE 50 (po 50 latach podlegające ekspertyzie)*

*\* niepotrzebne skreślić*

pieczętka wydziałowa

Wrocław, rok 2019





Wrocław University  
of Science and Technology

Faculty of Pure and Applied Mathematics

Field of study: Mathematics

Specialty: Theoretical Mathematics

Bachelor's Thesis

## TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ W JĘZYKU ANGIELSKIM

Imię i nazwisko dyplomanta

keywords:

tutaj podajemy najważniejsze słowa kluczowe w języku angielskim (łącznie nie powinny być dłuższe niż 150 znaków)

short summary:

Tutaj piszemy krótkie streszczenie pracy w języku angielskim (nie powinno być dłuższe niż 530 znaków).

Supervisor	dr inż. Dawid Huczek	.....	.....
	Title/degree/name and surname	grade	signature

*For the purposes of archival thesis qualified to:\**

*a) category A (perpetual files)*

*b) category BE 50 (subject to expertise after 50 years)*

*\* delete as appropriate*

stamp of the faculty

Wrocław, 2019



# Spis treści

<b>Wstęp</b>	<b>3</b>
<b>1 Definicje, lematy, twierdzenia, przykłady i wnioski</b>	<b>5</b>
1.1 Definicje . . . . .	5
1.1.1 Definicje i fakty ogólne . . . . .	5
1.1.2 Fakty ogólne, dotyczące zwartych przestrzeni metrycznych . . . . .	7
1.1.3 Definicje utworzone na potrzeby dowodu twierdzenia o rozszerzaniu	8
1.2 Lematy . . . . .	8
<b>2 Twierdzenie o rozszerzaniu odwzorowań chaotycznych w sensie Devaney’a</b>	<b>11</b>
<b>Podsumowanie</b>	<b>15</b>
<b>Dodatek</b>	<b>17</b>
<b>Bibliografia</b>	<b>18</b>



# Wstęp

We wstępie zapowiadamy, o czym będzie praca. Próbujemy zachęcić czytelnika do dalszej lektury, np. krótko informując, dlaczego wybraliśmy właśnie ten temat i co nas w nim zainteresowało.





# Rozdział 1

## Definicje, lematy, twierdzenia, przykłady i wnioski

### 1.1 Definicje

#### 1.1.1 Definicje i fakty ogólne

1. ciąg
2. podciąg
3. ciąg Cauchy'ego (pojawia się w definicji zupełności)
4. wnetrze zbioru
5. topologia
6. topologia indukowana? - pojawia sie w definicji przestrzeni zwartej
7. baza topologii
8. przestrzeń topologiczna
9. topologia zbieżności jednostajnej (pojawia się w definicji metryki na przestrzeni odwzorowań trojkatnych)
10. pokrycie zbiorami otwartymi
11. przestrzeń metryczna zwarta,
12. punkt izolowany w przestrzeni metrycznej
13. Ciaglosc funkcji na przestrzeni metrycznej (zbior  $C(X)$ )
14. układ dynamiczny,
15. orbita,
16. orbita okresowa
17. punkt okresowy odwzorowania

18. niezmienniczosc zbioru ze wzgledu na odwzorowanie
19. topologiczna tranzytywnosc
20. entropia topologiczna
21. RODZAJE CHAOSU (Devaney, Li Yorke)
22. napisac ze chaotycznosc odwzorowania rozumiem przez chaotycznosc odpowiedniego układu dynamicznego
23. zbiór rezydualny
24. separable, second category (czyli 1 i 2 kategoria bairea) TODO: separable znaczy chyba osrodkowa??
25. g-delta
26. odwzorowania trójkątne, zbior  $C_{\Delta}(X \times I)$

**Definicja 1.1** (Metryka). Metryką na zbiorze  $X$  nazywamy funkcję  $\rho : X \times X \longrightarrow \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$  spełniającą następujące warunki:

1.  $\forall_{x,y \in X} : \rho(x,y) = 0 \iff x = y,$
2.  $\forall_{x,y \in X} : \rho(x,y) = \rho(y,x),$
3.  $\forall_{x,y,z \in X} : \rho(x,y) \leq \rho(x,z) + \rho(z,y).$

Warunek 3 nazywany jest zwykle nierównością trójkąta.

**Definicja 1.2** (Przestrzeń metryczna). Przestrzenią metryczną nazywamy parę  $(X, \rho)$ , gdzie  $X$  jest zbiorem a  $\rho$  zdefiniowaną na nim metryką.

**Definicja 1.3** (Kula otwarta). Kulą otwartą w przestrzeni metrycznej  $(X, \rho)$  nazywamy zbiór:  $K(s, r) = \{x \in X : \rho(s, x) < r\}$ . Punkt  $s$  nazywamy wówczas środkiem kuli  $K$ , a  $r \in \mathbb{R}_+ \cup \{0\}$  jej promieniem.

**Definicja 1.4** (Zbiór gęsty). Dla danej przestrzeni metrycznej  $(X, \rho)$ . Zbiór  $A \subset X$  nazwiemy gęstym, gdy  $\forall_{x \in X} \forall_{\epsilon > 0} \exists_{a \in A} : \rho(x, a) < \epsilon$ .

**Definicja 1.5** (Pokrycie otwarte). [3, s. 195] Pokryciem otwartym przestrzeni metrycznej  $X$  nazywamy rodzinę zbiorów otwartych  $(U_i)_{i \in I}$  taką, że  $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ .

**Definicja 1.6** (Przestrzeń metryczna zwarta, definicja pokryciowa). [3, s. 196] Przestrzeń metryczną  $X$  nazywamy zwartą jeżeli każde pokrycie otwarte  $(U_i)_{i \in I}$  tej przestrzeni zawiera podpokrycie skończone, to znaczy istnieje skończony zbiór indeksów  $J \subset I$  taki, że  $X = \bigcup_{i \in J} U_i$ . Podzbiór  $Y \subset X$  jest zwarty jeżeli  $Y$  jest zwarty względem topologii indukowanej.

**Definicja 1.7** (Przestrzeń metryczna zwarta, definicja ciągowa). Przestrzeń metryczna  $(X, \rho)$  jest zwarta  $\iff$  z każdego ciągu  $(x_n) \subset X$  można wybrać podciąg zbieżny.

### 1.1.2 Fakty ogólne, dotyczące zwartych przestrzeni metrycznych

**Definicja 1.8** (Ośrodkowość).

**Definicja 1.9** (Zupełność). Przestrzeń metryczna jest zupełna jeśli każdy ciąg Cauchy'ego jest zbieżny.

**Twierdzenie 1.10** (Ośrodkowość zwartych przestrzeni metrycznych). *Jeżeli przestrzeń metryczna jest zwarta to jest również ośrodkowa.*

*Dowód.* Niech  $(X, \rho)$  będzie przestrzenią metryczną zwartą. Oznacza to, że z każdego pokrycia  $X$  zbiorami otwartymi, można wybrać podpokrycie skończone.

Niech  $\mathcal{A}_i = \{K(x, \frac{1}{i}) : x \in X\}$ ,  $\mathcal{A}_i$  jest oczywiście pokryciem  $X$  zbiorami otwartymi, ponieważ  $\forall x \in X, i \in \mathbb{N} : K(x, \frac{1}{i})$  jest otwarty, oraz  $\forall i \in \mathbb{N} \forall x \in X \exists A \in \mathcal{A}_i : x \in A$ , w szczególności  $\forall i \in \mathbb{N} \forall x \in X : x \in K(x, \frac{1}{i}) \in \mathcal{A}_i$ . Zatem z każdej rodziny  $\mathcal{A}_i$  możemy wybrać podpokrycie skończone, oznaczmy je przez  $\mathcal{B}_i$ . Rozważmy teraz następującą rodzinę:

$$B = \bigcup_{i=1}^{\infty} \mathcal{B}_i$$

Składa się ona ze zbiorów postaci  $K(x, \frac{1}{i})$  dla pewnych  $i \in \mathbb{N}$  i  $x \in X$  i jako przeliczalna suma rodzin skończonych jest przeliczalną rodziną zbiorów. Niech teraz

$$C = \{s : \exists i \in \mathbb{N} K(s, \frac{1}{i}) \in B\}$$

Zbiór  $C$  jest równoliczny ze zbiorem  $B$ , a więc przeliczalny. Ponadto  $C$  jest gęsty w  $X$ . Niech  $\epsilon > 0$ . Weźmy dowolny  $x \in X$ . Oczywiście  $\exists i_0 \in \mathbb{N} : \frac{1}{i_0} < \epsilon$ . Wiemy, że  $\mathcal{B}_{i_0}$  stanowi pokrycie  $X$  i składa się ze zbiorów postaci  $K(s, \frac{1}{i_0})$ , gdzie  $s \in X$ . Skoro  $\mathcal{B}_{i_0}$  jest pokryciem  $X$  to  $\exists_{K(s, \frac{1}{i_0}) \in \mathcal{B}_{i_0}} : x \in K(s, \frac{1}{i_0})$ , czyli  $\rho(x, s) < \frac{1}{i_0} < \epsilon$ , natomiast  $s \in C$  z definicji zbioru  $C$

Czyli  $X$  zawiera podzbiór przeliczalny i gęsty, zatem przestrzeń  $(X, \rho)$  jest ośrodkowa.  $\square$

**Twierdzenie 1.11** (Zupełność zwartych przestrzeni metrycznych). *Każda zwarta przestrzeń metryczna jest zupełna.*

*Dowód.* Niech  $(X, \rho)$  będzie przestrzenią zwartą. Weźmy ciąg Cauchy'ego  $(x_n)$  elementów  $X$ . Ze zwartości (definicja 1.7) wynika, że istnieje podciąg  $(y_n) \subset (x_n)$  zbieżny do jakiegoś  $g \in X$ . Zatem  $\forall \epsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0 \rho(y_n, g) < \epsilon$ . Pokażemy, że  $(x_n)$  zbiega do  $g$ .

Ustalmy  $\epsilon > 0$ . Z faktu, że  $(x_n)$  jest ciągiem Cauchy'ego wynika, że

$$\exists N \in \mathbb{N} \forall n, m > N \rho(x_m, x_n) < \frac{\epsilon}{2}$$

Ponadto

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n > n_0 \rho(y_n, g) < \frac{\epsilon}{2}$$

Weźmy teraz element  $y_k$  podciągu  $(y_n)$ , taki że  $y_k = x_M$ , gdzie  $M > N \wedge M > n_0$ . Wówczas

$$M > N \implies \forall n > N \rho(x_M, x_n) < \frac{\epsilon}{2}$$

$$M > n_0 \implies \rho(x_M, g) < \frac{\epsilon}{2}$$

Zatem  $\forall n > N : \rho(x_n, g) \leq \rho(x_n, x_M) + \rho(x_M, g) < \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$ , czyli  $g \in X$  jest granicą ciągu  $(x_n)$ , a więc  $(x_n)$  jest zbieżny w  $(X, \rho)$ .  $\square$

**Twierdzenie 1.12** (Równoważność definicji pokryciowej i ciągowej zwartości przestrzeni metrycznych).

*Dowód.*  $\square$

### 1.1.3 Definicje utworzone na potrzeby dowodu twierdzenia o rozszerzaniu

Na potrzeby dowodu wprowadźmy pojęcia odległości między odwzorowaniami oraz dwie funkcje:  $\text{pr}_1(x, y)$  i  $\text{pr}_2(x, y)$ .

**Definicja 1.13** (Metryka na przestrzeni funkcji ciągłych w przestrzeni metrycznej). Niech  $(M, \sigma)$  będzie zwartą przestrzenią metryczną, rozważmy odwzorowania  $h, k \in C(M)$ . Odległość między nimi zdefiniujemy jako  $\max_{m \in M} \sigma(h(m), k(m))$  i oznaczmy ją jako  $d_1(h, k)$ .

**Definicja 1.14** (Metryka na przestrzeni odwzorowań trójkątnych). Odległość między odwzorowaniami trójkątnymi definiujemy wówczas następująco: Niech  $(X, \rho)$  i  $(Y, \tau)$  będą zwartymi przestrzeniami metrycznymi a  $F(x, y) = (f(x), g_x(y))$  i  $\Phi(x, y) = (\phi(x), \psi_x(y))$  trójkątnymi odwzorowaniami należącymi do  $C_\Delta(X \times Y)$ . Odległość definiujemy wówczas jako

$$\begin{aligned} d_2(F, \Phi) &= \max_{(x, y) \in X \times Y} \max\{\rho(f(x), \phi(x)), \tau(g_x(y), \psi_x(y))\} \\ &= \max\{d_1(f, \phi), \max_{x \in X} d_1(g_x, \psi_x)\} \end{aligned}$$

Zauważmy, że jak wynika z lematu 1.16 przestrzenie metryczne  $(C(X), d_1)$  oraz  $(C_\Delta(X \times Y), d_2)$  są zupełne i odpowiednie topologie na nich są topologiami zbieżności jednostajnej.

**Definicja 1.15** ( $\text{pr}_1(x, y)$ ,  $\text{pr}_2(x, y)$ ). Dla  $(x, y) \in X \times Y$  niech  $\text{pr}_1(x, y) = x$  i  $\text{pr}_2(x, y) = y$ . Odwzorowanie identycznościowe na  $Y$  będziemy oznaczać przez  $\text{Id}_Y$  lub krótko  $\text{Id}$ . W dalszej części pracy przestrzeń  $Y$  będzie odcinkiem rzeczywistym  $I = [0, 1]$ .

## 1.2 Lematy

**Lemat 1.16.**

**Lemat 1.17.** *Niech  $(X, \rho)$  będzie zwartą przestrzenią metryczną bez punktów izolowanych. Każda okresowa orbita  $P_0$  odwzorowania  $f \in C(X)$  jest nigdziegęstym domkniętym podzbiorem  $X$ .*

**Lemat 1.18.**

**Lemat 1.19.** *dla przestrzeni nieskonczonej i zwartej czyli referencja 25 z pracy glownej*

**Lemat 1.20.**

**Lemat 1.21.**

**Lemat 1.22.**

**Twierdzenie 1.23.** *[1] - dowod twierdzenia 1.5*

**Lemat 1.24.**

**Lemat 1.25.**

**Lemat 1.26.** *W glownej pracy to byl lemat 3*

**Lemat 1.27.**

**Lemat 1.28.** [1] Niech  $(X, \rho)$  będzie zwartą przestrzenią metryczną i niech  $F = (f, g_x)$  będzie odwzorowaniem należącym do  $C_\Delta(X \times I)$  którego wszystkie włókna są niemające i pozostawiają krańce  $I$  nie zmienione. Niech  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  będzie podzbiorem  $X$  oraz dla  $i = 1, 2, \dots, n$  niech  $U_i$  będą parami rozłącznymi zbiorami otwartymi takimi, że  $a_i \in U_i$ . Załóżmy, że  $h_i$  są niemającymi odwzorowaniami z  $C(I)$  pozostawiającymi krańce  $I$  niezmienione i spełniającymi  $d_1(h_i, g_{a_i}) < \epsilon$  dla pewnego dodatniego  $\epsilon$  i każdego  $i = 1, 2, \dots, n$ . Wówczas istnieje odwzorowanie  $\tilde{F} = (f, \tilde{g}_x) \in C_\Delta(X \times I)$  spełniające cztery następujące warunki:

1. wszystkie włókna  $\tilde{F}$  są niemające i pozostawiające krańce  $I$  niezmienione,
2.  $d_2(F, \tilde{F}) < \epsilon$ ,
3.  $\tilde{g}_{a_i} = h_i$  dla  $i = 1, 2, \dots, n$ ,
4.  $\tilde{g}_x = g_x$  dla  $x \in X \setminus \bigcup_{i=1}^n U_i$ .

*Dowód.* [1] Dla każdego  $i = 1, 2, \dots, n$  niech  $V_i \subset U_i$  będzie otwartym sąsiedztwem  $a_i$  takim, że dla pewnego dodatniego  $\tilde{\epsilon} < \epsilon$ ,  $d_1(h_i, g_x) < \tilde{\epsilon}$  zawsze wtedy gdy  $x \in V_i$ .

Oznaczmy  $U = \bigcup_{i=1}^n U_i$ ,  $V = \bigcup_{i=1}^n V_i$  i weźmy  $u : X \rightarrow [0, 1]$ , ciągłą funkcję, przyjmującą wartość 1 na zbiorze  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ , natomiast 0 poza zbiorem  $V$ . Zastąpmy każde odwzorowanie włóknowe  $g_x$  przez  $\tilde{g}_x$ , gdzie

$$\tilde{g}_x(y) = \begin{cases} g_x(y) & \text{if } x \in X \setminus V, \\ g_x(y)(1 - u(x)) + h_i(y)u(x) & \text{if } x \in \{1, 2, \dots, n\}. \end{cases} \quad (1.1)$$

dla każdego  $y \in I$ . Zauważmy ponadto, że dla  $x \in V_i$  oraz  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  możemy równoważnie napisać

$$\tilde{g}_x(y) = u(x)(h_i(y) - g_x(y)) + g_x(y). \quad (1.2)$$

Rozważmy odwzorowanie  $\tilde{F} = (f, \tilde{g}_x)$ . Należy ono do  $C_\Delta(X \times I)$ . Z równości 1.1 widzimy, że wszystkie włókna  $\tilde{g}_x$  są niemające i pozostawiając krańce przedziału  $I$  nie zmienione (TODO sprawdzić czy to dobre tłumaczenie, mżoe krancc ustalone? krancc stale?). Ponadto  $\tilde{g}_{a_i} = h_i$  dla każdego  $i$  oraz  $\tilde{g}_x = g_x$  dla  $x \in X \setminus V \supset X \setminus U$ . Ponieważ dla  $x \in V_i$ , gdzie  $i \in \{1, 2, \dots, n\}$  mamy  $d_1(h_i, g_x) < \tilde{\epsilon}$  oraz  $u(x) \in [0, 1]$ , zatem z równości 1.2 otrzymujemy  $d_1(g_x, \tilde{g}_x) < \tilde{\epsilon}$  dla każdego  $x \in V$ . Wynika z tego, że  $d_2(F, \tilde{F}) \leq \tilde{\epsilon} < \epsilon$  (TODO uzasadnić tutaj wewnątrz to ostatnie przejście od d1 do d2 z definicji d1 i d2), co kończy dowód. □

**Lemat 1.29.**

**Lemat 1.30.**

**Lemat 1.31.**

**Lemat 1.32.**

**Lemat 1.33.**

**Lemat 1.34.**

**Lemat 1.35.**

**Lemat 1.36.**



## Rozdział 2

# Twierdzenie o rozszerzaniu odwzorowań chaotycznych w sensie Devaney’a

**Twierdzenie 2.1** (O rozszerzaniu). *Twierdzenie wraz z dowodem przytaczamy za pracą [2] Niech  $(X, \rho)$  będzie zwartą przestrzenią metryczną bez punktów izolowanych oraz niech  $f \in C(X)$  będzie odwzorowaniem chaotycznym w sensie Devaney’a. Wówczas odwzorowanie  $f$  można rozszerzyć do odwzorowania  $F \in C_\Delta(X \times I)$  (to znaczy tak, że  $f$  jest odwzorowaniem bazowym dla  $F$ ) w taki sposób, że:*

- (i)  $F$  jest również chaotyczne w sensie Devaney’a,
- (ii)  $F$  ma taką samą entropię topologiczną jak  $f$ ,
- (iii) zbiory  $X \times \{0\}$  i  $X \times \{1\}$  są niezmiennicze ze względu na  $F$ .

*Dowód twierdzenia o rozszerzaniu.* Odwzorowanie  $f$  jest chaotyczne w sensie Devaney’a, zatem spełnia warunek (2), czyli ma gęsty zbiór punktów okresowych, w szczególności istnieje orbita okresowa. Możemy zatem ustalić okresową orbitę  $P_0$  odwzorowania  $f$ . Z lematu 1.17 mamy, że  $P_0$  jest nigdziegęstym, domkniętym podzbiorem  $X$ .

Rozważmy zbiór  $\mathcal{F}$  wszystkich odwzorowań  $F = (f, g_x)$  ze zbioru  $C_\Delta(X \times I)$  spełniających następujące warunki:

1. Odwzorowanie bazowe  $f$  spełnia założenia twierdzenia 2.1.
2.  $\forall_{x \in X}$  odwzorowanie  $g_x$  jest niemalejące i krańce przedziału  $I$  pozostawia niezmiennicze.
3.  $\forall_{x \in P_0}$   $g_x$  jest identycznością

Warunek ?? implikuje, że dla każdego odwzorowania z  $\mathcal{F}$  zbiory  $X \times \{0\}$  i  $X \times \{1\}$  są niezmiennicze, czyli  $\forall_{F \in \mathcal{F}}$  zachodzi warunek (iii) twierdzenia 2.1. Zachodzenie warunku (ii) twierdzenia 2.1 dla każdego odwzorowania  $F \in \mathcal{F}$  wynika z lematu 1.18. Pozostaje zatem wykazać prawdziwość warunku (i), czyli chaotyczność w sensie Devaney’a jakiegoś odwzorowania  $F \in \mathcal{F}$ . Takie odwzorowanie będzie bowiem łącznie spełniało wszystkie 3 warunki, czyli też twierdzenia.

Z lematu 1.19 wynika, że aby odwzorowanie  $F$  było chaotyczne w sensie Devaneya potrzeba i wystarcza, żeby spełniało dwa poniższe warunki:

1.  $F$  jest topologicznie tranzytywne

2. zbiór punktów okresowych odwzorowania  $F$  jest gęsty w  $(X \times I)$

Jest tak gdyż przestrzeń  $(X \times I)$  spełnia założenia lematu, tj. jest przestrzenią nieskończoną i zwartą.

Chcemy wykazać, że  $\exists_{F \in \mathcal{F}}$  będące jednocześnie topologicznie tranzytywne i posiadające gęsty w  $(X \times I)$  zbiór punktów okresowych. Z lematu 1.20 wiemy, że  $\mathcal{F}$  jest niepustym, domkniętym podzbiorem przestrzeni  $C_\Delta(X \times I)$ , która jak wynika z lematu 1.21 jest przestrzenią metryczną zupełną.

Przekrój dwóch zbiorów rezydualnych jest rezydualny (patrz lemat 1.22) a więc niepusty. Wystarczy zatem pokazać, że oba zbiory:

- zbiór odwzorowań topologicznie tranzytywnych
- zbiór odwzorowań, których zbiór punktów okresowych jest gęsty w  $(X \times I)$

są rezydualne w  $\mathcal{F}$ . Wówczas każde odwzorowanie należące do ich przekroju będzie spełniało wszystkie trzy warunki tezy twierdzenia 2.1

Zbiór odwzorowań tranzytywnych jest rezydualny w  $\mathcal{F}$ , zostało to udowodnione w twierdzeniu 1.23

Pozostało wykazać, że również zbiór odwzorowań posiadających gęsty zbiór punktów okresowych jest rezydualny w  $\mathcal{F}$ . Oznaczmy zbiór takich odwzorowań (jednocześnie należących do  $\mathcal{F}$ ) przez  $\mathcal{F}_{DP}$ .

Niech  $\{U_i^X\}_{i=1}^\infty$  będzie bazą topologii  $X$  i niech  $\{U_i^I\}_{i=1}^\infty$  będzie zbiorem wszystkich odcinków otwartych o końcach wymiernych, należących do odcinka otwartego  $(0, 1)$ . Niech  $\{U_i\}_{i=1}^\infty$  będzie ponumerowaniem zbioru  $\{U_i^X \times U_j^I : i, j \in \mathbb{N}\}$ . Wtedy każda kula otwarta w  $X \times I$  zawiera jakiś spośród otwartych zbiorów  $U_i$ .

Dla każdego  $i = 1, 2, \dots$  niech zbiór  $\mathcal{F}_{SO}^i$  ( $\acute{S}$ -stabilny,  $\acute{O}$ -okresowy) będzie zdefiniowany następująco. Odwzorowanie  $G$  należy do  $\mathcal{F}_{SO}^i$  wtedy i tylko wtedy, gdy należy do  $\mathcal{F}$ , posiada punkt okresowy w  $U_i$  oraz wszystkie dostatecznie bliskie  $G$  odwzorowania z  $\mathcal{F}$  również posiadają punkt okresowy w  $U_i$  (być może różne od punktów okresowych odwzorowania  $G$ ). Zbiory  $\mathcal{F}_{SO}^i$  są otwartymi podzbiarami  $\mathcal{F}$  (patrz lemat 1.24). Ponieważ  $\mathcal{F}_{DP} \supseteq \bigcap_{i=1}^\infty \mathcal{F}_{SO}^i$  aby pokazać, że  $\mathcal{F}_{DP}$  jest rezydualny w  $\mathcal{F}$  wystarczy pokazać, że  $\forall_{i \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_{SO}^i$  jest gęsty w  $\mathcal{F}$ . (Wynika to z faktów: 1.29 i 1.30).

Aby wykazać że każdy zbiór  $\mathcal{F}_{SO}^i$  jest gęsty w  $\mathcal{F}$  ustalmy dowolne:  $i \in \mathbb{N}$ ,  $F = (f, g_x) \in \mathcal{F}$  i  $\epsilon > 0$ . Pokażemy, że istnieje odwzorowanie  $G \in \mathcal{F}_{SO}^i$ , którego odległość od  $F$  nie przekracza  $\epsilon$ . Dla uproszczenia sytuacji założmy, że  $\rho(\text{pr}_1(U_i), P_0) > 0$  (Jeżeli tak nie jest, zawsze możemy wziąć zamiast  $U_i$  mniejszy prostokąt  $U_i^* \subset U_i$ ).

Weźmy dodatnią liczbę naturalną  $N \geq \frac{4}{\epsilon}$ . Następnie rozważmy otwarte sąsiedztwo  $V$  orbity  $P_0$  w przestrzeni  $(X, \rho)$  takie, że  $\rho(\text{pr}_1(U_i), V) \geq 0$  oraz  $d_1(g_x, \text{Id}) < \frac{\epsilon}{4}$  dla każdego  $x \in V$  (pamiętamy, że  $g_x = \text{Id}$  dla  $x \in P_0$ ).

$P_0$  jest zbiorem niezmienniczym ze względu na  $f$ , na mocy lematu 1.25 istnieje niepusty zbiór otwarty  $W \subseteq V$  taki, że  $W \cup f(W) \cup \dots \cup f^N(W) \subseteq V$ . Na mocy lematu 1.26 istnieje punkt okresowy  $x_0$  odwzorowania  $f$  taki, że  $x_0 \in \text{pr}_1(U_i)$  oraz orbita  $x_0$  kroi się niepusto ze zbiorem  $W$ . Niech  $r > 0$  będzie pierwszą dodatnią liczbą całkowitą dla której  $f^r(x_0) \in W$ . Wtedy  $f^r(x_0), f^{r+1}(x_0), \dots, f^{r+N-1}(x_0) \in V$ . Niech  $s \geq 0$  będzie pierwszą nieujemną liczbą całkowitą dla której  $f^{r+N+s}(x_0) = x_0$ , tj.  $r + N + s$  jest okresem punktu  $x_0$ . Weźmy  $y_0$  takie, że  $(x_0, y_0) \in U_i$ . Ponieważ wszystkie odwzorowania włóknowe  $(g_x)$  odwzorowania  $F$  są ńa", to istnieje punkt  $y^* \in (0, 1)$  taki, że  $F^s(f^{r+N}(x_0), y^*) = (x_0, y_0)$  (patrz lemat 1.27).

Przypadek 1.  $z = \text{pr}_2(F^r(x_0, y_0))$  jest różne od 0 i 1. Oznaczmy przez  $g$  odwzorowanie z  $C(I)$  posiadające następujące trzy własności:



$$(g1) \quad d_1(g, \text{Id}) < \frac{\epsilon}{4},$$

(g2)  $g$  jest odwzorowaniem niemalejącym, pozostawiającym końce przedziału  $I$  niezmiennicze,

$$(g3) \quad g^N(z) = y^*.$$

Następnie, rozważmy odwzorowanie  $h \in C(I)$  posiadające trzy następujące własności:

$$(h1) \quad d_1(h, g_{x_0}) < \frac{\epsilon}{4},$$

$$(h2) \quad h(y_0) = g_{x_0}(y_0),$$

(h3)  $h$  jest stałe na zwartym odcinku  $[a, b] \subseteq \text{pr}_2(U_i)$  zawierającym punkt  $y_0$  w swoim wnętrzu.

Weźmy teraz odwzorowanie  $G = (f, \tilde{g}_x) \in \mathcal{F}$  takie, że  $d_2(G, F) < \frac{\epsilon}{2}$  oraz

$$\tilde{g}_x = \begin{cases} h & \text{if } x = x_0, \\ g & \text{if } x \in \{f^k(x_0) : r \leq k \leq r + N - 1\}, \\ g_x & \text{if } x \in \{f^k(x_0) : 1 \leq k \leq r - 1 \text{ or } r + N \leq k \leq r + N + s - 1\}. \end{cases} \quad (2.1)$$

Odwzorowanie takie istnieje na mocy lematu 1.28, ponieważ

$$d_1(\tilde{g}_{x_0}, g_{x_0}) = d_1(h, g_{x_0}) < \frac{\epsilon}{4}$$

oraz dla  $x \in \{f^r(x_0), f^{r+1}(x_0), \dots, f^{r+N-1}(x_0)\}$ ,

$$d_1(\tilde{g}_x, g_x) = d_1(g, g_x) \leq d_1(g, \text{Id}) + d_1(\text{Id}, g_x) < \frac{\epsilon}{4} + \frac{\epsilon}{4} = \frac{\epsilon}{2}$$

Punkt  $(x_0, y_0) \in U_i$  jest punktem okresowym odwzorowania  $G$ , ponieważ

$$\begin{aligned} G^{r+N+s}(x_0, y_0) &= G^{r+N+s-1}(G(x_0, y_0)) \\ &= G^{r+N+s-1}(F(x_0, y_0)) = G^{N+s}(F^r(x_0, y_0)) \\ &= G^{N+s}(f^r(x_0), z) = G^s(f^{r+N}(x_0), y^*) \\ &= F^s(f^{r+N}(x_0), y^*) = (x_0, y_0). \end{aligned} \quad (2.2)$$

Szczegółowe uzasadnienie powyższej równości znajduje się w 1.31

Ponadto, ze względu na (h3), na mocy 1.32 zachodzi

$$G^{r+N+s}(\{x_0\} \times [a, b]) = \{(x_0, y_0)\}.$$

Z faktu  $y_0 \in (a, b)$  oraz 1.33 wynika, że każde odwzorowanie  $\tilde{G} \in \mathcal{F}$  dostatecznie bliskie  $G$  posiada własność

$$\tilde{G}^{r+N+s}(\{x_0\} \times [a, b]) \subseteq \{x_0\} \times [a, b].$$

Zatem  $\tilde{G}$  posiada punkt okresowy w  $\{x_0\} \times [a, b] \subseteq U_i$ . Zatem  $G \in \mathcal{F}_{SO}^i$ , co kończy dowód dla przypadku 1.

Przypadek 2.  $\text{pr}_2(R^r(x_0, y_0))$  jest równy 0 lub 1.

W takim przypadku użyjemy lematu 1.28 aby dostać odwzorowanie  $H = (f, h_x) \in \mathcal{F}$  takie, że  $d_2(H, F) < \frac{\epsilon}{2}$  i dla  $x \in \{x_0, f(x_0), \dots, f^{r-1}(x_0)\}$  odwzorowania włóknowe  $h_x$  są ściśle rosnące. (Odwzorowanie takie istnieje na mocy 1.34) Ponieważ  $y_0$  jest różne od 0 i 1 dostajemy, że  $\text{pr}_2(H^r(x_0, y_0))$  również jest różne od 0 i 1 (uzasadnienie w 1.35). Następnie korzystając z przypadku 1 i z lematu 1.36 dostajemy odwzorowanie  $G \in \mathcal{F}_{SO}^i$ , dla którego zachodzi nierówność  $d_2(G, H) < \frac{\epsilon}{2}$ . Wówczas  $d_2(G, F) < \epsilon$ . (TODO powołać się na nierówność trójkąta)

□

# Podsumowanie

Podsumowanie w pracach matematycznych nie jest obligatoryjne. Warto jednak na zakończenie krótko napisać, co udało nam się zrobić w pracy, a czasem także o tym, czego nie udało się zrobić.



# Dodatek

Dodatek w pracach matematycznych również nie jest wymagany. Można w nim przedstawić np. jakiś dłuższy dowód, który z pewnych przyczyn pominęliśmy we właściwej części pracy lub (np. w przypadku prac statystycznych) umieścić dane, które analizowaliśmy.



# Bibliografia

- [1] ALSEDA, L., KOLYADA, S., LLIBRE, J., SNOHA, L. Entropy and periodic points for transitive maps. *Transactions of the American Mathematical Society* 351, 4 (1999), 1551–1573.
- [2] BALIBREA, F., SNOHA, L. Topological entropy of devaney chaotic maps. *Topology and its Applications* 133, 3 (2003), 225–239.
- [3] RUETTE, S. *Chaos on the Interval*. 2018.