

NAZWISKA W PSYCHIATRII

- **Zespół Antona-Babińskiego** - uszkodzenie płata potylicznego mózgu. występuje ślepotą korową, pacjent zaprzecza i utrzymywać, że cały czas widzi.
- **Objaw Aschaffenburga** - podatność na sugestię. Gdy dostanie telefon to rozmawia przez podany mu wyłączony telefon lub czyta niezapisaną kartkę
- ADHD – **Russel Barkley** (deficyt hamowania i kontroli OUN)
- Depresja – **Beck**
- Schizofrenia – **Eugen Bleuer**, choroba Bluer'a
- Psychoza – **Bilikiewicz**
- Quasiadolescencja – **Peter Blos** (preadolescencja 11-13rż, wczesna 13-17, środkowa 17-19, późna 19-22)
- Teoria dopaminowa schizofreni – **Arvid Calsson**
- **Zespół Capgrasa** – uważa, że ktoś bliski został podmieniony i zastąpiony sobowtorem (zaburzenie urojeniowe)
- **Zespół Clerambaulta** – przeświadczenie, że inna osoba jest w nim zakochana (zaburzenie urojeniowe)
- **Zespół Cotarda** – urojenia nihilistyczne (znikające organy, rozpadanie ciała, przekonanie, że jest się już martwym) (zaburzenie urojeniowe)
- **Zespół da Costy** – „nerwica serca” zespół nerwicowy, ból w klatce, duszność, kołatanie serca, zawroty
- **Zespół Charlesa-Bonneta** – halucynacje wzrokowe, gł. osoby starsze, które mają upośledzony wzrok (AMD)
- **Zespół Diogensa** - skrajne zaniedbywaniem higieny osobistej oraz minimum sanitarnego w mieszkaniu, łównie ludzie w podeszłym wieku, żyjących samotnie, zbieractwo, zrywanie kontaktów z najbliższymi i unikanie towarzystwa innych ludzi, wrażenie bezdomnego nędzarza
- Samobójstwo – **Emil Durkheim.**
- **Zespół Ekboma** - omamy czuciowe i fałszywe przekonanie (urojenia) o byciu zarażonym pasożytami, uczucie pasożytów pod skórą, często po meta amfetaminie (zaburzenie urojeniowe)
- **Jean-Pierre Falret** – klasyfikacja chorób afektywnych
- **Zespół Fragoli** - przekonanie chorego, że różne osoby, które spotyka to w rzeczywistości jedna i ta sama osoba zmieniająca swój wizerunek. Zwykle wiąże się z urojeniami prześladowania (zaburzenie urojeniowe)
- Formularz uzależnienia od nikotyny – **Fagestrona**
- Wzory zachowania – **Friedman i Rosenman**
- **Zespół Gansera** – przypomina symulowanie choroby psychicznej, pacjent pisze długopisem z drugiej strony, klucz do zamka drugą stroną, uderza brak wiedzy podstawowych rzeczy
- **Zespół Kandinskiego- Clarembault** - urojeniom (oddziaływania, o władnięcia) towarzyszy natłok myśli, opustoszenia myślenia i omamy rzekome
- Teoria metabolizmu informacyjno energetycznego – **Antoni Karpiński**

- **Zespół Kleinego-Levina** – napady hiperfagi i pobudzenia seksualnego z naprzemiennie występującymi okresami nadmiernej senności, zaburzenia nastroju - napady złości, drażliwość, agresja
- **Zespół Klüvera-Bucy'ego** uszkodzenie obu płatów skroniowych, związane gł. z dysfunkcją ciała migdałowatego; utrata lęku, hiperseksualność, żarłoczność, propagnozja,
- **Emil Kraepelin** – choroby afektywne z zaburzeń endokrynologicznych, koncepcja psychozy maniakalno-depresyjnej
- Autyzm – **Komer** lata 40 XX wieku
- **objaw Lipman'a**. -Kiedy uciśnie się gałki oczne człowieka w majaczeniu drżennym prowokuje to wystąpienie omamów wzrokowych.
- **objaw Mangana** – w majaczeniu (delirium), np. kokainowego, polegający na odczuwaniu na skórze obecności świerzbowców, owadów, bakterii (omamy czuciowe) lub halucynowaniu wzrokowym drobnych owadów, tzw. robaczki kokainowe.
- **Zespół Munchausena** – udawanie choroby i wymaganie hospitalizacji poprzez wywoływanie u siebie objawów somatycznych
- **Zespół Otella** – patologiczny alkoholowy obłąd zazdrości
- Terapia Gestalt – **Perris** - różnice między chorobami afektywnymi
- **Zespół Picka** – otępienie czołowo-skroniowe, choroba neurodegeneracyjna, , tauopatia, zaburzenia psychiczne, afazja, zachowania aspołeczne
- **Zespół Ringlera** – stan presuicydalny, poprzedza próbę samobójczą
1. Zawężenie 2. Agresja i napięcie 3. Fantazje o samobójstwie
- **Złudzenia sandera**- geometryczne
- **Złudzenie Zollner'a** - kreski

POJĘCIA

- **Acosasmata** - elementarne omamy słuchowe, np. trzaski, pukanie, szmery
- **Agorafobia** – lęk przed przestrzenią
- **Agrawacja** - celowe wyolbrzymianie objawów chorobowych, mające na celu osiągnięcie przez pacjenta korzyści
- **Ajchmofobia** – lęk przed narzędziami medycznymi, ostrymi przedmiotami
- **Akazyja** – nie może usiedzieć na miejscu, lęk, niepokój, rozdrażnienie
- **Akrofobia** – lęk przed wysokością
- **Aleksytymia** – niezdolność rozumienia, nazywania uczuć
- **Alogia** – zubożenie myślenia, mowy
- **Ambisentencja** – sprzeczne myśli, wypowiedzi „nie chcę ślubu, chcę z nim być na zawsze, ale bez ślubu to nie”
- **Ambiwalencja** – przerzywanie sprzecznych nastawień psychicznych
- **Androfobia** – lęk przed mężczyznami
- **Choreoterapia** – terapia tańcem
- **Cyklotymia** – depresja z nieco podwyższonym nastrojem (nie spełnia cech CHAD)
- **Dipsomania** - okresowy przymus picia alkoholu (impulsywność)
- **Echolalia** – słowa powtarza (katatonia)
- **Echopraksja** – ruchy powtarza (katatonia)
- **Echomimia** – mimikę powtarza (katatonia)
- **Ekmnezja** – mylenie teraźniejszości z przeszłością
- **Entomofobia** – lęk przed owadami
- **Katalepsja** – giętkość woskowa, pozostaje w jednej pozycji (schizofrenia katatoniczna) nadanej przez kogoś (to objaw występujący w katatonii)
- **Katapleksja** – utrata napięcia mięśniowego (narkolepsja)
- **Katatonia** – wzrost spoczynkowego napięcia mięśniowego, zanika przy ruchu (giętkość pseudowoskowa, uległość chorego, pozwalającego nadać mu dowolną pozycję, wraca do poprzedniej pozycji) ECHO-
- **Katatymia** – myślenie życzeniowe
- **Keraunofobia** – lęk przed burzą z piorunami
- **Kleptomania** - przymus dokonywania kradzieży (impulsywność)
- **Kryptomnezje** - nieświadomy plagiat, nieświadomione wspomnienia, odtwarza z pamięci informacje, które postrzega jako nowe
- **Kynofobia** – lęk przed psami
- **Mantyzm** – natłok obcych myśli
- **Metasymulacja** – osoba chora w okresie remisji symuluje objawy choroby (których nie ma)
- **Misofobia** – lęk przed brudem, zakażeniem
- **Moria** - wesołkowatość
- **Mutyzm** – niemożność mówienia
- **Nozofobia** – lęk przed zachorowaniem
- **Palinopsja** – perswazja wzrokowa, przetrwałym widzeniu lub wielokrotnym pojawianiu się obrazu, mimo ustania działania wywołującego go bodźca.
- **Parafilie** – zaburzenia seksualne (m.in. fetysyzm, pedofilia, sadomaso, transwestytyzm, ekshibicjonizm)
- **Paralogia** – zaburzenie toku myślenia
- **Parasomnie** – zaburzenia snu
- **Paratymia** – brak związku między uczuciami, a ich ekspresją

- **Paragnomen** – nieoczekiwane wykonanie jakiejś niezwyklej czynności, poprzedzone spokojnym zachowaniem (impulsywność)
- **Paramnezja** – przyjmowanie nowych zjawisk i sytuacji jako znanych, odtwarzanie wspomnień
- **Perswazje** – udzielanie tej samej odpowiedzi zasłyszanej, stereotypów
- **Porioomania (dromomania)** – przymus wędrowny (impulsywność), nie są w stanie rzeczowo wyjaśnić przyczyn swoich wycieczek. Przeważająca część chorych w czasie swoich podróży odczuwa lęk i tęsknotę za domem, jednakże osoby te nie są w stanie dobrowolnie wrócić do domu, decyzje o wyjeździe podejmują mając ograniczoną świadomość swoich czynów.
- **Pseudomnezja** – urojenia dotyczące wspomnień, uważa że istniały, mimo ich braku
- **Puerylizm** – dorosły w trudnej sytuacji, zachowanie dziecięce
- **Raptus katotonicus** – raptowny zryw
- **Ruminacje** – obsesyjne myśli, wątpliwości czy wykonało się określone czynności (takie jak zakręcenie kranu, zamknięcie domu itp.)
- **Schizofazja** – salata słowna (w zdaniu nieład)
- **Somnambulizm** - lunatyk
- **Sublimacja** - skierowanie popędów na inny obiekt zastępczy np. na naukę
- **Syntonía** - chęć do nawiązywania kontaktu emocjonalnego i poczuciem bliskości z ludźmi
- **Werbigeracja** -powtarzanie wielokrotne) słów lub fraz, w sposób bezcelowy, nieadekwatny do kontekstu wypowiedzi lub rozmowy, jak gdyby "automatyczny".

ROZPOZNANIE

depresja	2 tygodnie
mania	1 tydzień
dystymia	2 lata
otępienie	6 miesięcy
hipomania	4 dni
schizorfenia	1 miesiąc
bezsennaść krótkotrwała	Do 3-4 tygodni