
Véletlen fizikai folyamatok

5. beadandó

Márton Tamás

PJF19C

martontamas@caesar.elte.hu



1. feladat

Feladat leírás.

Az atomreaktorokban keletkező, erősen sugárzó hulladékok tárolására a geológiailag stabil, gránit alapú ősmasszívumokat tekintik alkalmasak (Finnországban most épül egy barlangrendszer, amelybe 100 éven keresztül tervezik felhalmozni a hulladékot, ami után az egészet betemetik). Tegyük fel, hogy a terület geológiailag valóban stabil, s a radioaktív magok csak a grániton keresztül történő diffúzióval tudnak a felszínre jutni. Keressük ki a gránit diffúziós együtthatóját nagyobb rendszámú atomokra (pl. az U^{233} izotópra) és számítsuk ki, hogy milyen mélyre kell eltemetni a hulladékot ahhoz, hogy 100000 év elteltével még ne észleljünk radioaktivitást a barlang felett a felszínen!

Feladat megoldása.

A diffúziós együtthatóról korábbi előadásokon és a beadandók során láttuk, hogy:

$$D = \frac{\Delta x^2}{2\tau}. \quad (1.1)$$

Ahol D a diffúziós együttható, Δx a távolság amit a diffúzió alatt megtesz a részecske, τ pedig a diffúzió időtartama. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy milyen mélyre kell eltemetni a sugárzó anyagot, hogy 100000 év elteltével se észleljük a felszínen a radioaktivitást. A diffúziós együtthatót a feladathoz a talált [cikk](#) alapján vett középértéknek vettem $4.95 \cdot 10^{-11} m^2/s$.

$$\Delta x = \sqrt{2\tau \cdot D}, \quad (1.2)$$

mindez behelyettesítve:

$$\Delta x = \sqrt{2 \cdot 100000v \cdot 4.95 \cdot 10^{-11}}, \quad (1.3)$$

ami az átváltások után:

$$\Delta x = \sqrt{2 \cdot 3.1536 \cdot 10^{12}s \cdot 4.95 \cdot 10^{-11}}, \quad (1.4)$$

melynek eredménye:

$$\Delta x = 17.669363316203558m. \tag{1.5}$$

A radioaktív hulladékot 17.669363316203558 m -nél ha mélyebbre ássuk, akkor 100000 év múlva sem tapasztalunk sugárzást a felszínen.

2. feladat

Feladat leírás.

Vizsgáljuk az előadáson tárgyalt 2 Ising spinből álló rendszer relaxációjának problémáját! Az előadáson megkaptuk a rendszer dinamikai mátrixát, s meghatároztuk a sajátvektorokat és a megfelelő sajátértékeket (A számolás megtalálható a kurzus honlapján "Ising spinek dinamikája" cím alatt is).

- Ismerve az összes sajátvektort és sajátértékeket, határozzuk meg milyen valószínűséggel van a rendszer t időpontban az $s_1 = -1, s_2 = +1$ állapotban, ha a kezdeti állapot $s_1 = +1, s_2 = -1$ volt.
- Számítsuk ki a rendszer átlagos mágnesezettségének $[M(t) = \langle (s_1 + s_2) \rangle]$ időfejlődését, ha a kezdeti állapotban $s_1 = +1, s_2 = +1$.

Feladat megoldása.

2.a. feladat

Az előadás anyaga és az említett cikk alapján tudjuk, hogy egy állapot valószínűségét a következő általános formulából számíthatjuk:

$$\vec{P}(t) = \vec{P}^{(e)} + \sum_{i=2}^4 a_i e^{\lambda_i t} \vec{P}^i, \quad (2.1)$$

és az a_i együtthatókat a kezdeti feltételből kaphatjuk meg, ami $s_1 = +1, s_2 = -1$, vagyis a $(\uparrow\downarrow)$ állapot.

A sajátvektorokat ismerjük:

$$\vec{P}^{(e)} = \frac{1}{2(e^\kappa + e^{-\kappa})} \cdot \begin{pmatrix} e^\kappa \\ e^{-\kappa} \\ e^{-\kappa} \\ e^\kappa \end{pmatrix}, \vec{P}^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \vec{P}^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \vec{P}^{(4)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad (2.2)$$

ahol $\kappa = \beta \cdot J$, és $\beta = \frac{1}{k_B T}$, valamint J egy pozitív konstans ami a spinek energiaskálázásáért felelős. A λ sajátértékeket is tudjuk:

$$\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -2(1 + e^{-2\kappa}), \lambda_3 = -2e^{-\kappa}, \lambda_4 = -2. \quad (2.3)$$

Tehát kezdeti feltételünk:

$$\vec{P}(t=0) = \begin{pmatrix} P(\uparrow\uparrow, t=0) \\ P(\uparrow\downarrow, t=0) \\ P(\downarrow\uparrow, t=0) \\ P(\downarrow\downarrow, t=0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \vec{P}^{(e)} + \sum_{i=2}^4 a_i e^{\lambda_i} \cdot 0 \vec{P}^{(i)} = \vec{P}^{(e)} + \sum_{i=2}^4 a_i \vec{P}^{(i)}. \quad (2.4)$$

Ebből a következő egyenleteket kapjuk az a_i együtthatókra:

$$0 = \frac{e^{\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} + a_2 + a_3 \quad (2.5)$$

$$1 = \frac{e^{-\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} - a_2 + a_4 \quad (2.6)$$

$$0 = \frac{e^{-\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} - a_2 - a_4 \quad (2.7)$$

$$0 = \frac{e^{\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} + a_2 - a_3 \quad (2.8)$$

$$(2.9)$$

Ha kivonjuk a 2.7 egyenletből a 2.8 egyenletet, azt kapjuk, hogy:

$$a_4 = \frac{1}{2} \quad (2.10)$$

Ha kivonjuk a 2.6 egyenletből a 2.9 egyenletet, azt kapjuk, hogy:

$$a_3 = 0 \quad (2.11)$$

Ha a 2.6 egyenletbe beírjuk, hogy $a_3 = 0$, azt kapjuk, hogy:

$$a_2 = \frac{e^{\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} \quad (2.12)$$

Ezek ismeretében válaszolhatunk a feladat kérdésére, ami azt volt, hogy milyen valószínűséggel van a rendszer t időpontban az $s_1 = -1, s_2 = 1$, azaz a $(\downarrow\uparrow)$ állapotban. A keresett valószínűség:

$$P(\downarrow\uparrow, t) = \frac{e^{-\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} + \frac{e^{\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} \cdot e^{-2(1+e^{-2\kappa})} - \frac{1}{2} \quad (2.13)$$

2.b. feladat

A mágnesezettség időfejlődését a következő módon számolhatjuk:

$$M(t) = \langle s_1 + s_2 \rangle = \sum_{s_1 \pm 1} \sum_{s_2 \pm 1} (s_1 + s_2) \cdot P(s_1, s_2, t). \quad (2.14)$$

A számolás módja hasonló lesz az előző alfeladathoz. A kezdeti feltétel most:

$$\vec{P}(t=0) = \begin{pmatrix} P(\uparrow\uparrow, t=0) \\ P(\uparrow\downarrow, t=0) \\ P(\downarrow\uparrow, t=0) \\ P(\downarrow\downarrow, t=0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.15)$$

és ismét a 2.4 egyenlet formájához visszanyúlva, a következő összefüggéseket kapjuk az a_i együtt-hatókra:

$$1 = \frac{e^\kappa}{2(e^\kappa + e^{-\kappa})} + a_2 + a_3 \quad (2.16)$$

$$0 = \frac{e^{-\kappa}}{2(e^\kappa + e^{-\kappa})} - a_2 + a_4 \quad (2.17)$$

$$0 = \frac{e^{-\kappa}}{2(e^\kappa + e^{-\kappa})} - a_2 - a_4 \quad (2.18)$$

$$0 = \frac{e^\kappa}{2(e^\kappa + e^{-\kappa})} + a_2 - a_3 \quad (2.19)$$

Ha a 2.17 egyenletből kivonjuk a 2.18 egyenletet, azt kapjuk, hogy:

$$a_4 = 0 \quad (2.20)$$

Ha a 2.16 egyenletből kivonjuk a 2.19 egyenletet, azt kapjuk, hogy:

$$a_3 = \frac{1}{2} \quad (2.21)$$

Ezek alapján látható a 2.17 egyenletből, hogy:

$$a_2 = \frac{e^{-\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} \quad (2.22)$$

Így felírhatjuk $\vec{P}(t) - t$:

$$\vec{P}(t) = \frac{1}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} \cdot \begin{pmatrix} e^{\kappa} \\ e^{-\kappa} \\ e^{-\kappa} \\ e^{\kappa} \end{pmatrix} + \left(\frac{e^{-\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} \right) \cdot e^{2(1+e^{-2\kappa})t} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (2.23)$$

A mágnesezettségre felírt egyenletben (2.14 egyenlet) láthatjuk, hogy csak a $(\uparrow\uparrow)$ és a $(\downarrow\downarrow)$ állapotok adnak járulékot, a $(\downarrow\uparrow)$ és a $(\uparrow\downarrow)$ állapotok zérust eredményeznek. Így azt kapjuk, hogy:

$$M(t) = 2P(\uparrow\uparrow, t) - 2P(\downarrow\downarrow, t). \quad (2.24)$$

Ahol:

$$P(\uparrow\uparrow, t) = \frac{e^{\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} + \frac{e^{-\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} + \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2} \quad (2.25)$$

$$P(\downarrow\downarrow, t) = \frac{e^{\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} + \frac{e^{-\kappa}}{2(e^{\kappa} + e^{-\kappa})} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \quad (2.26)$$

Tehát, mivel:

$$P(\downarrow\downarrow, t) = P(\downarrow\downarrow, t) \quad (2.27)$$

Így a mágnesezettség időfejlődése zérus:

$$M(t) = 0. \quad (2.28)$$

3. feladat

3.a. feladat

Feladat leírás.

3. feladat

Meredek hegyoldalban függőlegesen l távolságra vannak a kapaszkodók. A hegymászó w rátával lép felfelé, és w_0 annak a rátája, hogy lecsúszik egy szintet, és onnan folytatja a mászást.

3.b. feladat

Feladat leírás.

Írjuk fel az egyenletet, amely meghatározza, hogy a hegymászó milyen P_n valószínűséggel van nl magasságban! Használjuk a generátorfüggvény formalizmust a stacionárius eloszlás kiszámítására!

Feladat megoldása.

A Master-egyenlet segítségével határozhatjuk meg, hogy milyen P_n valószínűséggel van a hegymászó nl magasságban:

$$\frac{\partial}{\partial t} P_n = -(w + w_0)P_n + wP_{n-1} + w_0P_{n+1}, \quad (3.1)$$

ahol az első, negatív együtthatós tag az n . állapotból kilépést, a második és harmadik pozitív együtthatós tag pedig az $n \pm 1$. állapotból az n . állapotba áttérést reprezentálja. Nézzük a Master-egyenletet az $n = 0$ esetben:

$$\frac{\partial}{\partial t} P_0 = -wP_0 + w_0P_1, \quad (3.2)$$

Vezessük be az előadáson használt q mennyiséget a kasszás sorban állós példához hasonlóan, és legyenek:

$$q = \frac{w}{w_0}, \tau = \frac{1}{w_0}. \quad (3.3)$$

Most osszuk le az $n \geq 1$ (3.1 egyenlet) és az $n = 0$ (3.2 egyenlet) Master-egyenleteket w_0 -al, és azt kapjuk, hogy:

$$\tau \frac{\partial}{\partial t} P_n = -(q + 1)P_n + qP_{n-1} + P_{n+1} \quad (3.4)$$

$$\tau \frac{\partial}{\partial t} P_0 = -qP_0 + P_1. \quad (3.5)$$

Most írjuk fel általánosan a generátorfüggvényt, majd deriváljuk parciálisan idő szerint:

$$G(s, t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-sn} P_n(t) \longrightarrow \frac{\partial}{\partial t} G(s, t) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-sn} \frac{\partial}{\partial t} P_n(t) \quad (3.6)$$

Most írjuk be a generátorfüggvény időderiváltjába a Master-egyenletre kapott kifejezést:

$$\tau \frac{\partial}{\partial t} G(s, t) = \tau \sum_{n=0}^{\infty} e^{-sn} P_n(t) = -qP_0 + P_1 + \sum_{n=1}^{\infty} \{-(q+1)P_n + qP_{n-1} + P_{n+1}\} e^{-sn} \quad (3.7)$$

A szumma második két tagjánál újra kell indexelnünk, így a szumma utolsó tagja:

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-sn} P_n + 1 = \sum_{n=1}^{\infty} e^{-s(n+1)} P_n + 1 = \sum_{m=2}^{\infty} e^{-sm} P_m \quad (3.8)$$

a szumma második tagja:

$$q \sum_{n=1}^{\infty} e^{-sn} P_n - 1 = qe^{-s} \sum_{n=1}^{\infty} e^{-s(n-1)} P_n + 1 = qe^{-s} \sum_{m=0}^{\infty} e^{-sm} P_m \quad (3.9)$$

Így a 3.7 egyenlet az alábbi formára hozható:

$$\tau \frac{\partial}{\partial t} G(s, t) = P_0(1 - e^{-s}) + \{-(q+1)P_n + qe^{-s} + e^s\} G(s, t) \quad (3.10)$$

Stacionárius megoldást szeretnénk kiszámolni, vagyis azt az esetet kell vizsgálnunk, amikor a generátorfüggvény időderiváltja zérus. Így azt kapjuk, hogy:

$$G^{stac}(s) = \frac{(1 - e^{-s})P_0}{1 - e^s + q - qe^{-s}} = \frac{P_0}{1 - qe^{-s}}. \quad (3.11)$$

A generátorfüggvénynek tudnia kell, hogy $G(s=0) = 1$, és ebből a feltételből azt kapjuk, hogy:

$$P_0 = 1 - q = 1 - \frac{w}{w_0} \quad (3.12)$$

4. feladat

Így stacionárius esetben tehát a generátorfüggvény:

$$g^{stac}(s) = \frac{1-q}{1-qe^{-s}} = \frac{1-\frac{w}{w_0}}{1-\frac{w}{w_0}e^{-s}} \quad (3.13)$$

3.c. feladat

Feladat leírás.

Határozzuk meg, hogy átlagosan milyen magasra jut a hegymászó!

Feladat megoldása.

Ezt a stacionárius generátorfüggvényből könnyen megkaphatjuk, az s változója szerint parciálisan deriváljuk, majd az $s = 0$ helyen kiértékeljük:

$$\langle n \rangle = \left. \frac{\partial}{\partial s} G^{stac}(s) \right|_{s=0} = - \left. \frac{(1-q)qe^{-s}}{(1-qe^{-s})^2} \right|_{s=0} = \frac{(1-q)q}{(1-q)^2} = \frac{w}{w_0 - w} \quad (3.14)$$

3.d. feladat

Feladat leírás.

Van itt a hasonlóság a sorbanállás problémájával?

Feladat megoldása.

4. feladat

Feladat leírás.

Egy járvány során az ember a következő állapotokban lehet: egészséges (e), fertőzött (f), immunis (i), halott (h). Írjuk fel a master-egyenletet, amely leírja az $e \rightarrow f$, $f \rightarrow i$ és $f \rightarrow h$ dinamikát. A médiából elérhető adatokból becsüljük meg az átmeneti rátákat, majd határozzuk meg, hogy elhúzódó járvány esetén hány halott lesz!

Feladat megoldása.