# Mathematik für Informatiker Kombinatorik, Stochastik und Statistik Ubungsblatt 1

Tom Paßberg , Iain Dorsch

# Aufgabe 3

$$\begin{aligned} a &= |\{x \mod 3 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{3} \\ b &= |\{x \mod 5 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5} \\ c &= |\{x \mod 7 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{7} \\ d &= |\{x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{11} \\ ab &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 5 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{3 \cdot 5} \\ ac &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 7 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{3 \cdot 7} \\ ad &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{3 \cdot 11} \\ bc &= |\{x \mod 5 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5 \cdot 11} \\ cd &= |\{x \mod 5 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{7 \cdot 11} \\ abc &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{7 \cdot 11} \\ abc &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 5 = 0 \land x \mod 7 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{3 \cdot 5 \cdot 7} \\ abd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 5 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{3 \cdot 5 \cdot 11} \\ acd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 5 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{3 \cdot 5 \cdot 11} \\ acd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{3 \cdot 7 \cdot 11} \\ bcd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5 \cdot 7 \cdot 11} \\ abcd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 5 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5 \cdot 7 \cdot 11} \\ abcd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 5 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5 \cdot 7 \cdot 11} \\ abcd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 5 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5 \cdot 7 \cdot 11} \\ abcd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 5 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5 \cdot 7 \cdot 11} \\ abcd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 5 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5 \cdot 7 \cdot 11} \\ abcd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 5 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5 \cdot 7 \cdot 11} \\ abcd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5 \cdot 7 \cdot 11} \\ abcd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5 \cdot 7 \cdot 11} \\ abcd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod 11 = 0 \mid 0 \le x \le 100000\}| = \frac{100000}{5 \cdot 7 \cdot 11} \\ abcd &= |\{x \mod 3 = 0 \land x \mod 7 = 0 \land x \mod$$

# Aufgabe 4

#### **a**)

Für jede weiter Stufe wird wie voerherige Mengen kopiert und um das nächste Element erweitert.

Die neuen und die alten Elemente werden in einer neuen Menge zusammengefasst.

```
• n = 0 {{}}

• n = 1 {{}, {1}}

• n = 2 {{}, {1}, {2}, {1, 2}}

• n = 3 {{}, {1}, {2}, {1, 2}, {3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}}
```

• 
$$n = 4$$
 {{}, {1}, {2}, {1, 2}, {3}, {1, 3}, {2, 3}, {1, 2, 3}, {4}, {1, 4}, {2, 4}, {1, 2, 4}, {3, 4}, {1, 3, 4}, {2, 3, 4}, {1, 2, 3, 4}}

## b)

#### Beschreibung

Für n=0 gibt der Algorithmus eine Liste mit einer leeren Liste zurück. (Eine Menge in der sich eine leere Menge befindet)

für n>0 wird die Funktion rekursiv aufgerufen um die Teilmengen von  $\{1,\dots,n-1\}$  zu berechnen.

Die Teilmengen von  $\{1, \ldots, n\}$  ergeben sich aus den Teilmengen von  $\{1, \ldots, n-1\}$ , indem von jeder Teilmengen aus  $\{1, \ldots, n-1\}$  eine Kopie erstellt wird, in die n hinzugefügt wird.

## Funktion zur Berechnung der Teilmengen von $\{1,\ldots,n\}$

```
fn teilmengen_rec(n: u8) -> Vec<Vec<u8>>> {
    if n == 0 {
        return vec![vec![]];
    }
    teilmengen_rec(n - 1)
        .into_iter()
        .flat_map(|old| {
            let mut new = old.clone();
            new.push(n);
            [old, new]
        })
        .collect()
}
```

## Funktiosnaufrufe für $n = 1, \dots, 20$

#### **Output:**

```
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 1\}: 2
Teilmengen von \{1,\ldots,1\}: [[], [1]]
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 2\}: 4
Teilmengen von \{1, ..., 2\}: [[], [2], [1], [1, 2]]
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 3\}: 8
Teilmengen von \{1, ..., 3\}: [[], [3], [2], [2, 3], [1],
[1, 3], [1, 2], [1, 2, 3]
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 4\}: 16
Teilmengen von \{1, ..., 4\}: [[], [4], [3], [3, 4], [2],
[2, 4], [2, 3], [2, 3, 4], [1], [1, 4], [1, 3], [1, 3, 4],
[1, 2], [1, 2, 4], [1, 2, 3], [1, 2, 3, 4]]
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 5\}: 32
Anzahl der Teilmengen von \{1,\ldots,6\}: 64
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 7\}: 128
Anzahl der Teilmengen von \{1, \dots, 8\}: 256
Anzahl der Teilmengen von \{1, \ldots, 9\}: 512
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 10\}: 1024
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 11\}: 2048
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 12\}: 4096
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 13\}: 8192
Anzahl der Teilmengen von {1,..,14}: 16384
Anzahl der Teilmengen von {1,..,15}: 32768
Anzahl der Teilmengen von {1,..,16}: 65536
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 17\}: 131072
Anzahl der Teilmengen von \{1, ..., 18\}: 262144
Anzahl der Teilmengen von \{1,\ldots,19\}: 524288
Anzahl der Teilmengen von \{1,\ldots,20\}: 1048576
```

## Aufgabe 5

Funktion um die Anzahl der Zahlen zwischen 1 und n zu berechnen, die durch mindestens einen der Teiler teilbar sind.

```
use rayon::iter::{IntoParallelIterator, ParallelIterator};
fn count_numbers(n: u64, teiler: &Vec<u64>) -> usize {
    (1..=n). into_par_iter()
        . filter (|\&n| teiler . iter (). any (|\&t| n % t == 0))
}
Funktiosnaufrufe für n = 10, 100, ..., 10000000000 auf:
fn main() {
    let teiler: Vec<u64> = vec![3,5,7,11];
    for n in (1..=10). map(|i| 10u64.pow(i)) {
        println!(
            "{:11} gerade Zahlen zwischen 1 und {n:11}
            sind durch mindestens einen der Teiler {} teilbar.",
            count_numbers(n, &teiler),
            teiler.iter().map(|&t|
                t.to_string()).collect::<Vec<String>>().join(", ")
        );
    }
}
Output:
6 Zahlen zwischen 1 und 10 sind durch mindestens einen
der Teiler 3, 5, 7, 11 teilbar.
59 Zahlen zwischen 1 und 100 sind durch mindestens einen
der Teiler 3, 5, 7, 11 teilbar.
585 Zahlen zwischen 1 und 1000 sind durch mindestens einen
der Teiler 3, 5, 7, 11 teilbar.
5845 Zahlen zwischen 1 und 10000 sind durch mindestens einen
der Teiler 3, 5, 7, 11 teilbar.
58441 Zahlen zwischen 1 und 100000 sind durch mindestens einen
der Teiler 3, 5, 7, 11 teilbar.
584416 Zahlen zwischen 1 und 1000000 sind durch mindestens einen
der Teiler 3, 5, 7, 11 teilbar.
5844156 Zahlen zwischen 1 und 10000000 sind durch mindestens einen
der Teiler 3, 5, 7, 11 teilbar.
58441559 Zahlen zwischen 1 und 100000000 sind durch mindestens einen
der Teiler 3, 5, 7, 11 teilbar.
584415585 Zahlen zwischen 1 und 1000000000 sind durch mindestens einen
```

der Teiler 3, 5, 7, 11 teilbar. 5844155845 Zahlen zwischen 1 und 10000000000 sind durch mindestens einen der Teiler 3, 5, 7, 11 teilbar.