

Tirzah Shiraldin Kook

Estadística

Ejercicio 3

1. ¿Cuántos ítems tiene FRIDA? 90 ítems
2. ¿Cuántos factores evalúa? 7 factores
3. ¿Cuál es la media de la variable Riesgo de consumo de sustancias? 12.6
4. Plantea un problema de investigación utilizando las variables: Género y Conducta violenta
 - a. Escribe la hipótesis: Existe diferencia significativa en la conducta violenta por género.
 - b. Selecciona una prueba para probar la hipótesis: t de student
 - c. Plantea una hipótesis nula: No existe diferencia significativa en la conducta violenta por género.
5. Escribe las salidas computarizadas de SPSS,)Aceptamos la hipotesis 1, porque P salió 0.034, menor de 0.05.

Prueba T para Muestras Independientes

Prueba T para Muestras Independientes

		Estadístico	gl	p
CV	T de Student	-2.15	81.0	0.034

Nota. $H_a: \mu_1 \neq \mu_2$

Descriptivas de Grupo

	Grupo	N	Media	Mediana	DE	EE
CV	1	42	31.7	29.0	7.51	1.16
	2	41	35.6	33.0	8.74	1.36

6. Investiga si hay correlación entre la edad y conducta violenta. Escribe las salidas computarizadas y la interpretación.

Correlación

		Edad	CV
Edad	R de Pearson	—	

Correlación			
		Edad	CV
valor p		—	
CV	R de Pearson	0.118	—
	valor p	0.290	—

No correlacionan por edad porque la valor de P es menor que 0.05.

7. Plantea una hipótesis de correlación entre riesgo de consumo y conducta violenta
 - a. Escribe la hipótesis: H1 Existe correlacion significativa entre entre riesgo de consumo y conducta violenta.
 - b. Selecciona una prueba para probar la hipótesis: prueba correlación R de Pearson.
 - c. Plantea la hipótesis nula: No existe correlacion significativa entre riesgo de consumo y conducta violenta.
8. Escribe las salidas computarizada de SPSS, da la interpretación e indica cual hipótesis se acepta. Aceptamos la hipotesis 1, porque el valor de P salió menor de 0.05.

Correlación			
		RIESGO	CV
RIESGO	R de Pearson	—	
	valor p	—	
CV	R de Pearson	0.384	—
	valor p	< .001	—