

# Регулярные грамматики и выражения. Теорема Клини



---

Теория формальных языков  
2023 г.



# Грамматики

## Определение

Грамматика — это четвёрка  $G = \langle N, \Sigma, P, S \rangle$ , где:

- $N$  — алфавит нетерминалов;
- $\Sigma$  — алфавит терминалов;
- $P$  — множество правил переписывания  $\alpha \rightarrow \beta$  типа  $\langle (N \cup \Sigma)^+ \times (N \cup \Sigma)^* \rangle$ ;
- $S \in N$  — начальный символ.

$\alpha \rightarrow \beta$ , если  $\alpha = \gamma_1 \alpha' \gamma_2$ ,  $\beta = \gamma_1 \beta' \gamma_2$ , и  $\alpha' \rightarrow \beta' \in P$ .  
 $\rightarrow^*$  — рефлексивное транзитивное замыкание  $\rightarrow$ .

Язык  $\mathcal{L}(G)$ , порождаемый  $G$  — множество  $\{u \mid u \in \Sigma^* \text{ \& } S \Rightarrow^* u\}$ . Сентенциальная форма — элемент множества  $\{u \mid u \in (N \cup \Sigma)^* \text{ \& } S \Rightarrow^* u\}$ .



## Регулярные грамматики и НКА

Регулярная (праволинейная) грамматика  $G$  содержит правила вида  $S \rightarrow \varepsilon$  (причём  $S$  не встречается в правых частях никаких правил),  $T_i \rightarrow a_i$ ,  $T_i \rightarrow a_i T_j$ .

То есть во всех сентенциальных формах либо нет нетерминалов, либо он единствен и расположен строго справа от терминальных символов.

Каждый нетерминал  $N$  описывает собственный язык  $\mathcal{L}(N)$  относительно  $G$  — язык слов, которые выводятся из  $N$  за конечное число применений правил грамматики  $G$ .



## Регулярные грамматики и НКА

Регулярная (праволинейная) грамматика  $G$  содержит правила вида  $S \rightarrow \varepsilon$  (причём  $S$  не встречается в правых частях никаких правил),  $T_i \rightarrow a_i$ ,  $T_i \rightarrow a_i T_j$ .

То есть во всех сентенциальных формах либо нет нетерминалов, либо он единствен и расположен строго справа от терминальных символов.

НКА (неформально) определяется списком правил перехода и финальными состояниями.

- $T_i \rightarrow a_i T_j$  соответствует переходу  $\langle T_i, a_i, T_j \rangle$ ;
- $T_i \rightarrow a_i$  соответствует переходу  $\langle T_i, a_i, F \rangle$ , где  $F$  — уникальное финальное состояние;
- $S \rightarrow \varepsilon$  соответствует объявлению  $S$  финальным.



## Лемма о накачке

Пусть  $n$  — число нетерминалов в регулярной грамматике  $G$  для языка  $\mathcal{L}$ .

Рассмотрим слово  $w \in \mathcal{L}(G)$ ,  $|w| \geq n + 1$ . Оно получается применением цепочки из  $n + 1$  правил  $\Rightarrow$  после применения хотя бы двух из них нетерминал в сентенциальной форме результата повторится.

$$\underbrace{S \rightarrow \dots \rightarrow \Phi \ A \rightarrow \dots \rightarrow \Phi \ \Psi \ A \rightarrow \dots \rightarrow \Phi \ \Psi \ \Theta}_{\text{не больше } n+1 \text{ шага}}$$
$$\Downarrow$$
$$|\Phi| + |\Psi| \leq n + 1$$

По построению,  $\Theta \in \mathcal{L}(A)$  (поскольку  $A$  в конечном счёте раскрывается в  $\Theta$ ), и также  $\Psi\Theta \in \mathcal{L}(A)$ , причём  $|\Psi| > 0$ . Кроме того,  $\Phi\mathcal{L}(A) \subseteq \mathcal{L}(G)$ , поскольку  $S \rightarrow^* \Phi A$ .



## Лемма о накачке

Рассмотрим слово  $w \in \mathcal{L}(G)$ ,  $|w| \geq n + 1$ . Оно получается применением цепочки из  $n + 1$  правил  $\Rightarrow$  после применения хотя бы двух из них нетерминал в сентенциальной форме результата повторится.

Известно, что  $|\Phi| + |\Psi| \leq n + 1$ .

$$\begin{array}{c}
 \underbrace{S \rightarrow \dots \rightarrow \Phi A}_{\rho_1: \text{вывод } \Phi A \text{ из } S} \xrightarrow{\overbrace{A \rightarrow \dots \rightarrow \Phi \Psi A}^{\rho_2: \text{вывод } \Psi A \text{ из } A}} \underbrace{\Phi \Psi A \rightarrow \dots \rightarrow \Phi \Psi \Theta}_{\rho_3: \text{вывод } \Theta \text{ из } A}
 \end{array}$$

Поскольку  $A \rightarrow^* \Psi A$ , то  $\forall k (A \rightarrow^* \Psi^k A)$  (достаточно повторить  $k$  раз вывод  $\rho_2$ ). Значит,  $\forall k (\Phi \Psi^k \Theta \in \mathcal{L}(G))$ .



## Лемма о накачке

### Утверждение

Если  $G$  — регулярная, то существует такое  $n \in \mathbb{N}$ , что  $\forall w (w \in \mathcal{L}(G) \ \& \ |w| > n \Rightarrow \exists w_1, w_2, w_3 (|w_2| > 0 \ \& \ |w_1| + |w_2| \leq n \ \& \ w = w_1 w_2 w_3 \ \& \ \forall k (k \geq 0 \Rightarrow w_1 w_2^k w_3 \in \mathcal{L}(G)))$ ).

Известно, что  $|\Phi| + |\Psi| \leq n + 1$ .

$$\begin{array}{c}
 \underbrace{S \rightarrow \dots \rightarrow \Phi}_{\rho_1: \text{вывод } \Phi A \text{ из } S} \quad \overbrace{A \rightarrow \dots \rightarrow \Phi \Psi A}^{\rho_2: \text{вывод } \Psi A \text{ из } A} \quad \underbrace{A \rightarrow \dots \rightarrow \Phi \Psi \Theta}_{\rho_3: \text{вывод } \Theta \text{ из } A}
 \end{array}$$

Поскольку  $A \rightarrow^* \Psi A$ , то  $\forall k (A \rightarrow^* \Psi^k A)$  (достаточно повторить  $k$  раз вывод  $\rho_2$ ). Значит,  $\forall k (\Phi \Psi^k \Theta \in \mathcal{L}(G))$ .



## Ещё раз о структуре накачек

### Утверждение

Если  $G$  — регулярная, то существует такое  $n \in \mathbb{N}$ , что  $\forall w (w \in \mathcal{L}(G) \ \& \ |w| > n \Rightarrow \exists \Phi, \Psi, \Theta (|\Psi| > 0 \ \& \ |\Phi| + |\Psi| \leq n \ \& \ w = \Phi\Psi\Theta \ \& \ \forall k (k \geq 0 \Rightarrow \Phi\Psi^k\Theta \in \mathcal{L}(G)))$ ).

- $n$  — длина накачки;
- $\Phi$  — префикс накачки;
- $\Psi$  — накачиваемый фрагмент (или просто «накачка»);
- $\Theta$  — суффикс накачки;
- $\Phi\Psi$  — область накачки;
- слово  $\Phi\Theta$  (случай  $k = 0$ ) — результат «пустой накачки» или «отрицательной накачки»;
- слова  $\Phi\Psi^k\Theta$ , где  $k \geq 2$  — результаты «положительной накачки».





## Примеры применения леммы о накачке

Обозначим обращение (reversal) слова  $w$  как  $w^R$ .

Рассмотрим язык  $\mathcal{L} = \{w w^R \mid w \in \Sigma^+\}$ .

Пусть длина накачки —  $n$ . Рассмотрим слово

$b^{n+1} a a b^{n+1} \in \mathcal{L}$ . Поскольку  $|\Phi| + |\Psi| \leq n$ , то

$\Psi = b^k$ ,  $k \geq 1$ . Но  $b^m a a b^n \notin \mathcal{L}$ , если  $m \neq n$ . Поэтому  $\mathcal{L}$  — не регулярный.



## Примеры применения леммы о накачке

Обозначим обращение (reversal) слова  $w$  как  $w^R$ .

Рассмотрим язык  $\mathcal{L} = \{w w^R \mid w \in \Sigma^+\}$ .

Пусть длина накачки —  $n$ . Рассмотрим слово

$b^{n+1} a a b^{n+1} \in \mathcal{L}$ . Поскольку  $|\Phi| + |\Psi| \leq n$ , то

$\Psi = b^k$ ,  $k \geq 1$ . Но  $b^m a a b^n \notin \mathcal{L}$ , если  $m \neq n$ . Поэтому  $\mathcal{L}$  — не регулярный.

Рассмотрим язык  $\mathcal{L}' = \{a^n b^m \mid n \neq m\}$ .

Пусть длина накачки —  $n$ . Рассмотрим множество слов

$a^n b^{n+n!} \in \mathcal{L}'$ . Поскольку  $|\Phi| + |\Psi| \leq n$ , то  $\Psi = a^k$ ,  $k \geq 1$ .


Но для всех  $k \leq n \exists v(n + k \cdot v = n + n!)$ . Поэтому слово

вида  $a^{n+n!} b^{n+n!} \in \mathcal{L}'$ , что абсурдно. Следовательно,  $\mathcal{L}'$  не является регулярным.



## Нерегулярные языки

Пусть  $\mathcal{L} = \{w \mid |w|_a = |w|_b\}$ . Все слова вида  $a^k b^k$  принадлежат  $\mathcal{L}$ . Пусть длина накачки равна  $n$ . Рассмотрим слово  $a^n b^n$ . Поскольку  $|\Phi| + |\Psi| \leq n$ , то  $\Psi = a^k$ ,  $k > 0$ . Но слова  $a^{n+k \cdot i} b^n$  не принадлежат  $\mathcal{L}$ .



## Анализ на достаточность

Является ли лемма о накачке достаточной характеристикой регулярных языков? Существуют ли языки, которые «накачиваются» согласно её формулировке, но не регулярны?

### Гипотеза

$G$  — регулярная  $\iff$  существует такое  $n \in \mathbb{N}$ , что  $\forall w (w \in \mathcal{L}(G) \ \& \ |w| > n \Rightarrow \exists w_1, w_2, w_3 (|w_2| > 0 \ \& \ |w_1| + |w_2| \leq n \ \& \ w = w_1 w_2 w_3 \ \& \ \forall k (k \geq 0 \Rightarrow w_1 w_2^k w_3 \in \mathcal{L}(G)))$ ).



## Анализ на достаточность

### Гипотеза

$G$  — регулярная  $\iff$  существует такое  $n \in \mathbb{N}$ , что  $\forall w (w \in \mathcal{L}(G) \ \& \ |w| > n \Rightarrow \exists w_1, w_2, w_3 (|w_2| > 0 \ \& \ |w_1| + |w_2| \leq n \ \& \ w = w_1 w_2 w_3 \ \& \ \forall k (k \geq 0 \Rightarrow w_1 w_2^k w_3 \in \mathcal{L}(G)))$ ).

Рассмотрим язык  $\mathcal{L} = \{w w^R z \mid w \in \Sigma^+ \ \& \ z \in \Sigma^+\}$  и  $n = 4$ .

- Если  $|w| = 1$ , тогда можно разбить слово  $w w^R z$  так:  $\Phi = w w^R$ ,  $\Psi = z[1]$ ,  $\Theta = z[2..|z|]$ . Тогда для всех  $k$   $\Phi \Psi^k \Theta \in \mathcal{L}$ .
- Если  $|w| \geq 2$ , тогда разбиваем так:  $\Phi = \varepsilon$ ,  $\Psi = w[1]$ ,  $\Theta = w[2..|w|] w^R z$ . Слова  $w[2..|w|] w^R z$  и  $w[1]^k w[2..|w|] w^R z$  при  $k \geq 2$  также принадлежат  $\mathcal{L}$ .




## Анализ на достаточность

### Гипотеза

$G$  — регулярная  $\iff$  существует такое  $n \in \mathbb{N}$ , что  $\forall w (w \in \mathcal{L}(G) \ \& \ |w| > n \Rightarrow \exists w_1, w_2, w_3 (|w_2| > 0 \ \& \ |w_1| + |w_2| \leq n \ \& \ w = w_1 w_2 w_3 \ \& \ \forall k (k \geq 0 \Rightarrow w_1 w_2^k w_3 \in \mathcal{L}(G)))$ ).

Мы нашли длину накачки для  $\{w w^R z \mid w \in \Sigma^+ \ \& \ z \in \Sigma^+\}$  (она равна 4), но язык регулярным не является.

Следовательно, лемма о накачке — только необходимое, но не достаточное условие регулярности.



## Смысл леммы о накачке

Структура доказательства указывает, что длина накачки  $n$  регулярного языка  $\mathcal{L}$  не больше (возможно, меньше) числа нетерминалов в минимальной грамматике для  $\mathcal{L}$ .

Покажем, что у некоторых регулярных языков длина накачки действительно меньше, чем размер минимального НКА (или минимальной регулярной грамматики).



## Смысл леммы о накачке

Рассмотрим  $\mathcal{L} = a \mid b \mid (a \{a \mid b\}^* a) \mid (b \{a \mid b\}^* b)$ . Если выбрать длину накачки  $n = 2$ , то в качестве «накачки»  $\Psi$  можно взять вторую букву слова из  $\mathcal{L}$ . Пусть  $G$  имеет два нетерминала  $S, T$  и распознаёт  $\mathcal{L}$ . Если  $G$  содержит правила  $S \rightarrow aT$  и  $S \rightarrow bT$  (или  $S \rightarrow aS, S \rightarrow bS$ ), то для некоторого непустого  $z$  слова вида  $az$  и  $bz$  будут либо оба принадлежать  $\mathcal{L}$ , либо нет, чего не может быть. Значит,  $G$  содержит либо пару  $S \rightarrow aT, S \rightarrow bS$ , либо пару  $S \rightarrow bT, S \rightarrow aS$ . Рассмотрим первый случай. Тогда для некоторого непустого  $z$  имеем  $az \in \mathcal{L} \Leftrightarrow b^+ az \in \mathcal{L}$ , что абсурдно.

Таким образом, в грамматике для  $\mathcal{L}$  должно быть больше двух нетерминалов (можно обойтись тремя).





## Достаточный вариант леммы о накачке

Видно, что проблемы с языком  $\{w w^R z \mid w \in \Sigma^+ \text{ \& } z \in \Sigma^+\}$  возникают из-за того, что у него очень удачный префикс: любая степень буквы, большая первой, начинается с палиндрома. Однако, если бы мы потребовали, чтобы слово из  $\mathcal{L}$  начиналось с палиндрома хотя бы длины 4, подобное рассуждение уже не привело бы к успеху.



## Достаточный вариант леммы о накачке

Мы можем искать не первый повтор нетерминала в пути разбора по грамматике, а любой, если осталось разобрать ещё достаточно длинный суффикс.

$$S \rightarrow \dots \rightarrow \Phi A_0 \rightarrow \Phi \Psi' A \rightarrow \dots \rightarrow \Phi \Psi' \Psi A \rightarrow \dots \rightarrow \Phi \Psi' \Psi \Theta$$

Произвольное  
число шагов

Не более  $m$  шагов  
до повторения нетерминала

$\mathcal{L}$  регулярный  $\Leftrightarrow$  существует универсальная длина накачки  $m$  такая, что  $w \in \mathcal{L}$  ( $|w| \geq m$ ) для любого  $i \leq |w| - m$  может быть представлено как  $\Phi \Psi' \Psi \Theta$ , где  $|\Phi| = i$ ,  $1 \geq |\Psi| \leq m$ ,  $|\Psi'| + |\Psi| \leq m$ , причём  $\forall k (\Phi \Psi' \Psi^k \Theta \in \mathcal{L})$ .



## Академические регулярные выражения $\mathcal{RE}$

### Допустимые операции

- $A^*$  — замыкание Клини — ноль или больше итераций  $A$ ;
- $A^+$  — одна или больше итерация  $A$ ;
- $A?$  — 0 или 1 вхождение  $A$ ;
- $A \mid B$  — альтернатива (вхождение либо  $A$ , либо  $B$ ).



## Академические регулярные выражения $\mathcal{RE}$

### Допустимые операции

- $A^*$  — замыкание Клини — ноль или больше итераций  $A$ ;
- $A^+$  — одна или больше итерация  $A$ ;
- $A?$  — 0 или 1 вхождение  $A$ ;
- $A \mid B$  — альтернатива (вхождение либо  $A$ , либо  $B$ ).

### Следствия

Если  $r_1, r_2 \in \mathcal{RE}$ , тогда


- $r_1 \mid r_2 \in \mathcal{RE}$ ;
- $r_1 r_2 \in \mathcal{RE}$ ;
- $r_1^*, r_2^+ \in \mathcal{RE}$ .



## Полукольца


- Коммутативный моноид по сложению;
- Полугруппа по умножению;
- $\text{id}$  по сложению — ноль по умножению;
- левая и правая дистрибутивности.

Регулярные выражения — идемпотентное полукольцо.



## Алгебра Клини

- $x^*x + 1 = x^* = 1 + xx^*$
- (формализация Клини):  $p + qx = x \Rightarrow x = q^*p$  (где  $q$  не распознаёт  $\varepsilon$ )
- (формализация Козена):  $q + pr \leq r \Rightarrow p^*q \leq r$ ;  
 $q + rp \leq r \Rightarrow qp^* \leq r$ , где  $x \leq y \Leftrightarrow x + y = y$ .



## Неподвижная точка $\mathcal{RE}$

Неподвижная точка функции  $f(x)$  — такое  $x$ , что  $f(x) = x$ .

### Лемма Ардена

Пусть  $X = (AX) \mid B$ , где  $X$  — неизвестное  $\mathcal{RE}$ , а  $A, B$  — известные, причём  $\varepsilon \notin \mathcal{L}(A)$ . Тогда  $X = (A)^*B$ .

Рассмотрим систему уравнений:

$$X_1 = (A_{11}X_1) \mid (A_{12}X_2) \mid \dots \mid B_1$$

$$X_2 = (A_{21}X_1) \mid (A_{22}X_2) \mid \dots \mid B_2$$

...

$$X_n = (A_{n1}X_1) \mid (A_{n2}X_2) \mid \dots \mid B_n$$

Положим  $\varepsilon \notin A_{ij}$ . Будем последовательно выражать  $X_1$  через  $X_2, \dots, X_n$ ,  $X_2$  через  $X_3, \dots, X_n$  и т.д. Получим регулярное выражение для  $X_n$ .



## Операции в регулярных грамматиках

### Объединение

Дано:  $G_1$  и  $G_2$  — праволинейные. Построить  $G : \mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(G_1) \cup \mathcal{L}(G_2)$ .

- 1 Переименовать нетерминалы из  $N_1$  и  $N_2$ , чтобы стало  $N_1 \cap N_2 = \emptyset$  (сделать  $\alpha$ -преобразование). Применить переименовку к правилам  $G_1$  и  $G_2$ .
- 2 Объявить стартовым символом свежий нетерминал  $S$  и для всех правил  $G_1$  вида  $S_1 \rightarrow \alpha$  и правил  $G_2$  вида  $S_2 \rightarrow \beta$ , добавить правила  $S \rightarrow \alpha$ ,  $S \rightarrow \beta$  в правила  $G$ .
- 3 Добавить в правила  $G$  остальные правила из  $G_1$  и  $G_2$ .





## Операции в регулярных грамматиках

### Конкатенация

Дано:  $G_1$  и  $G_2$  — праволинейные. Построить  $G : \mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(G_1) \mathcal{L}(G_2)$ .

- 1 Переименовать нетерминалы из  $N_1$  и  $N_2$ , чтобы стало  $N_1 \cap N_2 = \emptyset$  (сделать  $\alpha$ -преобразование).
- 2 Построить из  $G_1$  её вариант без  $\varepsilon$ -правил (см. ниже).
- 3 По всякому правилу из  $G_1$  вида  $A \rightarrow a$  строим правило  $G$  вида  $A \rightarrow aS_2$ , где  $S_2$  — стартовый нетерминал  $G_2$ .
- 4 Добавить в правила  $G$  остальные правила из  $G_1$  и  $G_2$ .  
Объявить  $S_1$  стартовым.
- 5 Если  $\varepsilon \in \mathcal{L}(G_1)$  (до шага 2), то по всем  $S_2 \rightarrow \beta$  добавить правило  $S_1 \rightarrow \beta$ .



## Операции в регулярных грамматиках

### Положительная итерация Клини

Дано:  $G_1$  — праволинейная. Построить

$G : \mathcal{L}(G) = \mathcal{L}(G_1)^+$ .

- 1 Построить из  $G_1$  её вариант без  $\varepsilon$ -правил.
- 2 По всякому правилу из  $G_1$  вида  $A \rightarrow a$  строим правило  $G$  вида  $A \rightarrow aS_1$ , где  $S_1$  — стартовый нетерминал  $G_1$ .
- 3 Добавить в правила  $G$  все (включая вида  $A \rightarrow a$ ) правила из  $G_1$ . Объявить  $S_1$  стартовым.
- 4 Если  $\varepsilon \in \mathcal{L}(G_1)$  (до шага 2), добавить правило  $S_1 \rightarrow \varepsilon$  и вывести  $S_1$  из рекурсии.



## Построение грамматики без $\varepsilon$ -правил

Дано:  $G$  — праволинейная. Построить  $G'$  без правил вида  $A \rightarrow \varepsilon$  такую, что  $\mathcal{L}(G') = \mathcal{L}(G)$  или  $\mathcal{L}(G') \cup \{\varepsilon\} = \mathcal{L}(G)$ .

- 1 Перенести в  $G'$  все правила  $G$ , не имеющие вид  $A \rightarrow \varepsilon$ .
- 2 Если существует правило  $A \rightarrow \varepsilon$ , то по всем правилам вида  $B \rightarrow \alpha A$  дополнительно строим правила  $B \rightarrow \alpha$ .



## Пересечение регулярных грамматик

Дано:  $G_1, G_2$  — праволинейные. Построить  $G'$  такую, что

$$\mathcal{L}(G') = \mathcal{L}(G_1) \cap \mathcal{L}(G_2).$$

- ❶ Построить стартовый символ  $G'$  — пару  $\langle S_1, S_2 \rangle$ , где  $S_i$  — стартовый символ грамматики  $G_i$ .
- ❷ Поместить  $\langle S_1, S_2 \rangle$  в множество  $U$  неразобранных нетерминалов. Множество  $T$  разобранных нетерминалов объявить пустым.
- ❸ Для каждого очередного нетерминала  $\langle A_1, A_2 \rangle \in U$ :
  - ❶ если  $A_1 \rightarrow a \in G_1, A_2 \rightarrow a \in G_2$ , тогда добавить в  $G'$  правило  $\langle A_1, A_2 \rangle \rightarrow a$ ;
  - ❷ если  $A_1 \rightarrow aA_3 \in G_1, A_2 \rightarrow aA_4 \in G_2$ , тогда добавить в  $G'$  правило  $\langle A_1, A_2 \rangle \rightarrow a\langle A_3, A_4 \rangle$ , а в  $U$  — нетерминал  $\langle A_3, A_4 \rangle$ , если его ещё нет в множестве  $T$ ;
  - ❸ если все пары правил, указанные выше, были обработаны, тогда переместить  $\langle A_1, A_2 \rangle$  из  $U$  в  $T$ .
- ❹ Повторять шаг 3, пока множество  $U$  не пусто.
- ❺ Если  $\varepsilon \in \mathcal{L}(G_1)$  &  $\varepsilon \in \mathcal{L}(G_2)$ , тогда добавить в  $G'$  правило  $\langle S_1, S_2 \rangle \rightarrow \varepsilon$ .



## От грамматики и НКА к $\mathcal{RE}$

### Теорема Клини

По каждому НКА можно построить  $\mathcal{RE}$ , распознающую тот же язык. Верно и обратное.

Здесь считаем, что в НКА нет  $\varepsilon$ -переходов.

- Объявляем каждый нетерминал (или состояние НКА) переменной и строим для него уравнение:
  - По правилу  $A \rightarrow aB$  (или для стрелки из  $A$  в  $B$ ) добавляем альтернативу  $aB$ ;
  - По правилу  $A \rightarrow b$  (или для стрелки в финальное состояние) добавляем альтернативу без переменных.
  - Правило  $S \rightarrow \varepsilon$  обрабатываем отдельно, не внося в уравнение: добавляем в язык альтернативу  $(\mathcal{RE} \mid \varepsilon)$ .
- Решаем систему относительно  $S$ .



## От грамматики к $\mathcal{RE}$

### Пример

Построим  $\mathcal{RE}$  по грамматике:

$$S \rightarrow aT \quad S \rightarrow abS$$

$$T \rightarrow aT \quad T \rightarrow bT \quad T \rightarrow b$$

Строим по правилам грамматики систему:  $S = (abS) \mid (aT)$

$$T = ((a \mid b)T) \mid b$$

Решаем второе уравнение:

$$T = (a \mid b)^*b$$

Подставляем в первое:

$$S = (abS) \mid (a(a \mid b)^*b)$$

Получаем ответ:

$$S = (ab)^*a(a \mid b)^*b$$