

Práctica 3: Demostración en Lógica Proposicional

Tomás Felipe Melli

July 8, 2025

Índice

1	Semántica	2
1.1	Ejercicio 1	2
1.2	Ejercicio 2	3
1.3	Ejercicio 3	3
2	Deducción Natural	4
2.1	Ejercicio 5	4
2.2	Ejercicio 6	7
2.3	Ejercicio 7	8

1 Semántica

1.1 Ejercicio 1

Determinar el valor de verdad de las siguientes proposiciones (fórmulas). El valor de verdad de P, Q : *Verdadero* y el de S, T : *Falso*

1. $(\neg P \vee Q)$

$$\begin{aligned}\neg(V) \vee V \\ F \vee V \\ V\end{aligned}$$

2. $(P \vee (S \wedge T) \vee Q)$

$$\begin{aligned}(V \vee (F \wedge F) \vee V) \\ (V \vee F \vee V) \\ (V \vee V) \\ V\end{aligned}$$

3. $\neg(Q \vee S)$

$$\begin{aligned}\neg(V \vee F) \\ \neg(V) \\ F\end{aligned}$$

4. $(\neg P \vee S) \iff (\neg P \wedge \neg S)$

$$\begin{aligned}(\neg V \vee F) \iff (\neg V \wedge \neg F) \\ F \iff F \\ V\end{aligned}$$

5. $((P \vee S) \wedge (T \vee Q))$

$$\begin{aligned}((V \vee F) \wedge (F \vee V)) \\ (V \wedge V) \\ V\end{aligned}$$

6. $((P \vee S) \wedge (T \vee Q)) \iff (P \vee (S \wedge T) \vee Q)$

$$\begin{aligned}(((V \vee F) \wedge (F \vee V)) \iff (V \vee (F \wedge F) \vee V)) \\ ((V \wedge V) \iff (V \vee F \vee V)) \\ (V \iff (V \vee V)) \\ (V \iff V) \\ V\end{aligned}$$

7. $(\neg Q \wedge \neg S)$

$$\begin{aligned}(\neg V \wedge \neg F) \\ (F \wedge V) \\ F\end{aligned}$$

1.2 Ejercicio 2

Dado una fórmula τ , demostrar que existe otra fórmula τ' equivalente a τ , que usa solo los conectivos \neg y \vee .

1. Caso Base :

$$\tau = P$$

Donde sólo usamos \neg, \vee y no usamos \wedge, \Rightarrow

2. Caso Inductivo :

• \vee

$$\tau = \alpha \vee \beta$$

$$\stackrel{H.I.}{\equiv} \alpha' \vee \beta'$$

** HI : α, β se pueden escribir usando \neg, \vee . $\exists \alpha', \beta'$ equivalentes $\alpha = \alpha', \beta = \beta'$.

• \neg

$$\tau = \neg \alpha$$

$$\equiv \neg \alpha'$$

$$\equiv \tau'$$

$\exists \tau' \equiv \tau$ usando \neg, \vee .

• \wedge

$$\tau \equiv \alpha \wedge \beta$$

$$\stackrel{(??.)}{\equiv} \neg(\neg \alpha' \vee \neg \beta')$$

Queremos que toda evaluación que valide $\alpha \wedge \beta$ valide $\neg(\neg \alpha' \vee \neg \beta')$. Por tanto,

Sea $v \models \alpha \wedge \beta \iff v \models \alpha$ y $v \models \beta$ por HI $v \models \alpha'$ y $v \models \beta'$.

Qué podemos decir de las negaciones y sus equivalencias ?

$v \not\models \neg \alpha'$ o $v \not\models \neg \beta'$ en particular, $v \not\models \neg \alpha' \vee \neg \beta'$, pero si sucede que ...

$$v \models \neg(\neg \alpha' \vee \neg \beta')$$

Como v es arbitrario...

$$\underbrace{\alpha \wedge \beta}_{\tau} \equiv \neg(\neg \alpha' \vee \neg \beta')$$

y como α', β' están escritos con \neg, \vee entonces τ' también.

• \implies

$$\tau = \alpha \implies \beta$$

$$\stackrel{(??.)}{\equiv} \neg \alpha' \vee \beta'$$

Queremos entonces que toda evaluación que valide $\alpha \implies \beta$ valide $\neg \alpha' \vee \beta'$. Por tanto,

Sea $v \models \alpha \implies \beta \iff v \not\models \alpha$ o $v \models \beta$. En particular $v \not\models \alpha \iff v \models \neg \alpha$. Dicho esto

$$v \models \neg \alpha' \vee \beta'$$

Dado que v es arbitrario

$$\tau \equiv \neg \alpha' \vee \beta'$$

1.3 Ejercicio 3

Nos piden determinar si las siguientes expresiones son **tautologías**, **contradicciones** o **contingencias**. Primero definamos qué son estos conceptos :

- **Tautología** : una fórmula (expresión lógica) que es siempre verdadera, sin importar los valores de verdad de sus componentes. Una fórmula lógica τ es una tautología si para toda valuación v , se cumple que: $v \models \tau$
- **Contradicción**: La fórmula es falsa bajo toda valuación, es decir, nunca resulta verdadera, sin importar los valores de las variables. $\forall v, v \not\models \tau$
- **Contingencia** : Es verdadera para algunas valuaciones y falsa para otras. Es decir, a veces vale, a veces no, depende de los valores de verdad de sus variables. $\exists v, v \models \tau$ y $\exists v', v' \not\models \tau$

Ahora bien, nos dicen que $\tau \implies \sigma$ es tautología y $\rho \implies \zeta$ es contradicción.

- $(\tau \implies \sigma) \vee (\rho \implies \zeta)$

Suponemos que existe valuación que la haga falsa. Entonces $v \not\models (\tau \implies \sigma) \vee (\rho \implies \zeta)$

$$\begin{aligned} v &\not\models (\tau \implies \sigma) \vee (\rho \implies \zeta) \\ v &\not\models (\tau \implies \sigma) \quad v \not\models (\rho \implies \zeta) \\ \tau &\implies \sigma \text{ no es tautología. Abs!} \end{aligned}$$

- $(\tau \implies \rho) \vee (\sigma \implies \zeta)$

Suponemos que existe valuación $v : P \rightarrow \{V, F\}$ tal que $v \not\models (\tau \implies \rho) \vee (\sigma \implies \zeta)$ Entonces,

$$\begin{aligned} v &\not\models (\tau \implies \rho) \text{ y } v \not\models (\sigma \implies \zeta) \\ v &\models \tau \text{ y } v \not\models \rho \text{ y } v \models \sigma \text{ y } v \not\models \zeta \\ \text{Si } \tau &\implies \rho \text{ es tautología, } v \not\models \tau \text{ o } v \models \sigma \\ \text{Si } \sigma &\implies \zeta \text{ es contradicción, } v \models \rho \text{ o } v \not\models \zeta \end{aligned}$$

Con esto tenemos, $v \models \rho$ y $v \not\models \rho$ lo cual es ABS! con lo cual $\Rightarrow \exists v$ tal que $v \not\models (\tau \implies \rho) \vee (\sigma \implies \zeta) \Rightarrow$ es Tautología

- $(\rho \implies \sigma) \vee (\zeta \implies \sigma)$

2 Deducción Natural

2.1 Ejercicio 5

1. *modus ponens* relativizado : $(\rho \implies \sigma \implies \tau) \implies (\rho \implies \sigma) \implies \rho \implies \tau$

$$\begin{array}{c} \frac{}{\Gamma \vdash \rho \implies (\sigma \implies \tau)} \text{ ax} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \rho} \text{ ax} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \rho \implies \sigma} \text{ ax} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \rho} \text{ ax} \\ \hline \frac{\Gamma \vdash \sigma \implies \tau \quad \Gamma \vdash \sigma}{(\rho \implies (\sigma \implies \tau)), (\rho \implies \sigma), \rho \vdash \tau} \Rightarrow_e \\ \hline \frac{(\rho \implies (\sigma \implies \tau)), (\rho \implies \sigma), \rho \vdash \tau}{(\rho \implies (\sigma \implies \tau)), (\rho \implies \sigma) \vdash \rho \implies \tau} \Rightarrow_i \\ \hline \frac{(\rho \implies (\sigma \implies \tau)) \vdash (\rho \implies \sigma) \implies \rho \implies \tau}{\vdash (\rho \implies (\sigma \implies \tau)) \implies (\rho \implies \sigma) \implies \rho \implies \tau} \Rightarrow_i \end{array}$$

2. Reducción al absurdo : $(\rho \implies \perp) \implies \neg \rho$

$$\begin{array}{c} \frac{}{\Gamma \vdash \rho \implies \perp} \text{ ax} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \rho} \text{ ax} \\ \hline \frac{\rho \Rightarrow \perp, \rho \vdash \perp}{\rho \Rightarrow \perp \vdash \rho} \neg_i \\ \hline \frac{\rho \Rightarrow \perp \vdash \rho}{\vdash (\rho \implies \perp) \implies \neg \rho} \Rightarrow_i \end{array}$$

3. Introducción de la doble negación $\rho \implies \neg \neg \rho$

$$\begin{array}{c} \frac{}{\Gamma \vdash \rho} \text{ ax} \quad \frac{}{\Gamma \vdash \neg \rho} \text{ ax} \\ \hline \frac{\Gamma, \neg \rho \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg \neg \rho} \neg_e \\ \hline \frac{\Gamma \vdash \neg \neg \rho}{\vdash \rho \implies \neg \neg \rho} \Rightarrow_i \end{array}$$

4. Eliminación de la triple negación $\neg \neg \neg \rho \implies \neg \rho$

$$\begin{array}{c} \frac{}{\Gamma \vdash \rho} \text{ ax} \\ \hline \frac{\Gamma \vdash \neg \neg \rho}{\Gamma \vdash \neg \neg \neg \rho} \neg_i \quad \frac{}{\Gamma \vdash \neg \neg \neg \rho} \text{ ax} \\ \hline \frac{\neg \neg \neg \rho, \rho \vdash \perp}{\neg \neg \neg \rho \vdash \neg \rho} \neg_e \\ \hline \frac{\neg \neg \neg \rho \vdash \neg \rho}{\vdash \neg \neg \neg \rho \implies \neg \rho} \Rightarrow_i \end{array}$$

5. Contraposición $(\rho \Rightarrow \sigma) \Rightarrow (\neg\sigma \Rightarrow \neg\rho)$

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash \rho \Rightarrow \sigma}^{\text{ax}}}{\Gamma \vdash \sigma} \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash \rho}^{\text{ax}}}{\Gamma \vdash \neg\sigma} \Rightarrow_e}{\frac{(\rho \Rightarrow \sigma), \neg\sigma, \rho \vdash \perp}{(\rho \Rightarrow \sigma), \neg\sigma \vdash \neg\rho} \neg_i}{\frac{(\rho \Rightarrow \sigma) \vdash \neg\sigma \Rightarrow \neg\rho}{\vdash (\rho \Rightarrow \sigma) \Rightarrow (\neg\sigma \Rightarrow \neg\rho)} \Rightarrow_i}$$

6. Adjunción $((\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau) \Longleftrightarrow (\rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau)$

• \Rightarrow

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash (\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau}^{\text{ax}}}{\Gamma \vdash (\rho \wedge \sigma)} \quad \frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash \rho}^{\text{ax}} \quad \overline{\Gamma \vdash \sigma}^{\text{ax}}}{\Gamma \vdash (\rho \wedge \sigma)} \wedge_i}{((\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau), \rho, \sigma \vdash \tau} \Rightarrow_e}{\frac{((\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau), \rho \vdash \sigma \Rightarrow \tau}{((\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau) \vdash \rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau} \Rightarrow_i}{\vdash ((\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau) \Rightarrow (\rho \Rightarrow \sigma \Rightarrow \tau)} \Rightarrow_i$$

• \Leftarrow

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash \rho \Rightarrow (\sigma \Rightarrow \tau)}^{\text{ax}}}{\Gamma \vdash \sigma \Rightarrow \tau} \quad \frac{\frac{\overline{\Gamma \vdash \rho \wedge \sigma}^{\text{ax}}}{\Gamma \vdash \rho} \wedge_{e1} \quad \frac{\overline{\Gamma \vdash \rho \wedge \sigma}^{\text{ax}}}{\Gamma \vdash \sigma} \wedge_{e2}}{(\rho \Rightarrow (\sigma \Rightarrow \tau)), (\rho \wedge \sigma) \vdash \tau} \Rightarrow_e}{\frac{(\rho \Rightarrow (\sigma \Rightarrow \tau)) \vdash (\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau}{\vdash (\rho \Rightarrow (\sigma \Rightarrow \tau)) \Rightarrow ((\rho \wedge \sigma) \Rightarrow \tau)} \Rightarrow_i}$$

7. DeMorgan (I) $\neg(\rho \vee \sigma) \Longleftrightarrow (\neg\rho \wedge \neg\sigma)$

• \Rightarrow

$$\frac{\frac{\frac{\overline{\neg(\rho \vee \sigma), \rho \vdash \rho}^{\text{ax}}}{\neg(\rho \vee \sigma), \rho \vdash \rho \vee \sigma} \vee_{i1} \quad \frac{\overline{\neg(\rho \vee \sigma), \rho \vdash \neg(\rho \vee \sigma)}^{\text{ax}}}{\neg(\rho \vee \sigma) \vdash \neg\rho} \neg_e}{\frac{\neg(\rho \vee \sigma), \rho \vdash \perp}{\neg(\rho \vee \sigma) \vdash \neg\rho} \neg_i} \quad \frac{\frac{\frac{\overline{\neg(\rho \vee \sigma), \sigma \vdash \sigma}^{\text{ax}}}{\neg(\rho \vee \sigma), \sigma \vdash \rho \vee \sigma} \vee_{i2} \quad \frac{\overline{\neg(\rho \vee \sigma), \sigma \vdash \neg(\rho \vee \sigma)}^{\text{ax}}}{\neg(\rho \vee \sigma) \vdash \neg\sigma} \neg_e}{\frac{\neg(\rho \vee \sigma), \sigma \vdash \perp}{\neg(\rho \vee \sigma) \vdash \neg\sigma} \neg_i} \wedge_i$$

$$\frac{\neg(\rho \vee \sigma) \vdash \neg\rho \wedge \neg\sigma}{\vdash \neg(\rho \vee \sigma) \Rightarrow (\neg\rho \wedge \neg\sigma)} \Rightarrow_i$$

• \Leftarrow

$$\frac{\frac{\overline{\Gamma, (\rho \vee \sigma) \vdash (\rho \vee \sigma)}^{\text{ax}} \quad \frac{\frac{\overline{\Gamma, \rho \vdash \rho}^{\text{ax}}}{\Gamma, \rho \vdash \perp} \quad \frac{\frac{\overline{(\neg\rho \wedge \neg\sigma), (\rho \vee \sigma), \rho \vdash (\neg\rho \wedge \neg\sigma)}^{\text{ax}}}{\Gamma, \rho \vdash \neg\rho} \wedge_{e1}}{\Gamma, \sigma \vdash \neg\rho} \neg_e}{\Gamma, \sigma \vdash \sigma}^{\text{ax}} \quad \frac{\overline{\Gamma, \sigma \vdash (\neg\rho \wedge \neg\sigma)}^{\text{ax}}}{\Gamma, \sigma \vdash \neg\sigma} \wedge_{e2}}{\Gamma, \sigma \vdash \perp} \vee_e$$

$$\frac{\neg(\rho \wedge \neg\sigma), (\rho \vee \sigma) \vdash \perp}{\neg(\rho \wedge \neg\sigma) \vdash \neg(\rho \vee \sigma)} \neg_i$$

$$\frac{\neg(\rho \wedge \neg\sigma) \vdash \neg(\rho \vee \sigma)}{\vdash (\neg\rho \wedge \neg\sigma) \Rightarrow \neg(\rho \vee \sigma)} \Rightarrow_i$$

8. DeMorgan (II) $\neg(\rho \wedge \sigma) \Longleftrightarrow (\neg\rho \vee \neg\sigma)$. Para \Rightarrow es necesario usar principios de razonamiento clásico.

• \Rightarrow falta !!

• \Leftarrow

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\frac{\Gamma' \vdash \rho \wedge \sigma}{\Gamma' \vdash \sigma} \text{ax} \quad \frac{\Gamma' \vdash \neg \sigma}{\Gamma' \vdash \neg \sigma} \text{ax}}{\frac{\Gamma, \neg \sigma, \rho \vdash \perp}{\Gamma, \neg \sigma \vdash \neg \rho} \neg_i} \neg_e \\
\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash \neg \rho \vee \neg \sigma}{\Gamma \vdash \neg \rho} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, \neg \rho \vdash \neg \rho}{\Gamma \vdash \neg \rho} \text{ax}}{\Gamma \vdash \neg \rho} \neg_e \\
\frac{\frac{\Gamma \vdash \neg \rho}{\Gamma \vdash \neg \rho} \text{ax} \quad \frac{\Gamma \vdash \neg \rho}{\Gamma \vdash \neg \rho} \neg_e}{\frac{\Gamma \vdash \perp}{(\neg \rho \vee \neg \sigma) \vdash \neg(\rho \wedge \sigma)} \neg_i} \Rightarrow_i \\
\frac{\frac{\Gamma \vdash \perp}{(\neg \rho \vee \neg \sigma) \vdash \neg(\rho \wedge \sigma)} \neg_i}{\vdash (\neg \rho \vee \neg \sigma) \Rightarrow \neg(\rho \wedge \sigma)} \Rightarrow_i
\end{array}$$

9. Conmutatividad $\wedge : (\rho \wedge \sigma) \Rightarrow (\sigma \wedge \rho)$

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\frac{(\rho \wedge \sigma) \vdash \rho \wedge \sigma}{(\rho \wedge \sigma) \vdash \sigma} \text{ax} \quad \frac{(\rho \wedge \sigma) \vdash \rho \wedge \sigma}{(\rho \wedge \sigma) \vdash \rho} \text{ax}}{\frac{(\rho \wedge \sigma) \vdash (\sigma \wedge \rho)}{\vdash (\rho \wedge \sigma) \Rightarrow (\sigma \wedge \rho)} \Rightarrow_i} \wedge_i
\end{array}$$

10. Asociatividad $\wedge : ((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \Longleftrightarrow (\rho \wedge (\sigma \wedge \tau))$

• \Rightarrow

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\frac{((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \vdash ((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau)}{((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \vdash (\rho \wedge \sigma)} \text{ax} \quad \frac{\frac{((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \vdash (\rho \wedge \sigma) \wedge \tau}{((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \vdash \rho \wedge \sigma} \text{ax} \quad \frac{((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \vdash (\rho \wedge \sigma) \wedge \tau}{((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \vdash \tau} \text{ax}}{\frac{((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \vdash \rho \wedge \sigma}{((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \vdash \sigma \wedge \tau} \wedge_i} \wedge_i \\
\frac{\frac{((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \vdash \rho \wedge \sigma}{((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \vdash \sigma \wedge \tau} \wedge_i}{\frac{((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \vdash \rho \wedge (\sigma \wedge \tau)}{\vdash ((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau) \Rightarrow (\rho \wedge (\sigma \wedge \tau))} \Rightarrow_i} \Rightarrow_i
\end{array}$$

• \Leftarrow

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\frac{(\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \vdash \rho \wedge (\sigma \wedge \tau)}{(\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \vdash \rho} \text{ax} \quad \frac{\frac{(\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \vdash \rho \wedge (\sigma \wedge \tau)}{(\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \vdash \sigma \wedge \tau} \text{ax} \quad \frac{(\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \vdash \rho \wedge (\sigma \wedge \tau)}{(\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \vdash \tau} \text{ax}}{\frac{(\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \vdash \rho \wedge \sigma}{(\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \vdash \tau} \wedge_i} \wedge_i \\
\frac{\frac{(\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \vdash \rho \wedge \sigma}{(\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \vdash \tau} \wedge_i}{\frac{(\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \vdash (\rho \wedge \sigma) \wedge \tau}{\vdash (\rho \wedge (\sigma \wedge \tau)) \Rightarrow ((\rho \wedge \sigma) \wedge \tau)} \Rightarrow_i} \Rightarrow_i
\end{array}$$

11. Conmutatividad $\vee : (\rho \vee \sigma) \Rightarrow (\sigma \vee \rho)$

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\frac{(\rho \vee \sigma) \vdash (\rho \vee \sigma)}{(\rho \vee \sigma) \vdash \rho} \text{ax} \quad \frac{\frac{(\rho \vee \sigma), \rho \vdash \rho}{(\rho \vee \sigma), \rho \vdash (\sigma \vee \rho)} \text{ax} \quad \frac{\frac{(\rho \vee \sigma), \sigma \vdash \sigma}{(\rho \vee \sigma), \sigma \vdash (\sigma \vee \rho)} \text{ax}}{\frac{(\rho \vee \sigma) \vdash (\sigma \vee \rho)}{\vdash (\rho \vee \sigma) \Rightarrow (\sigma \vee \rho)} \Rightarrow_i} \vee_e
\end{array}$$

12. Asociatividad $\vee : ((\rho \vee \sigma) \vee \tau) \Longleftrightarrow (\rho \vee (\sigma \vee \tau))$

• \Rightarrow

$$\begin{array}{c}
\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash (\rho \vee \sigma) \vee \tau}{\Gamma, (\rho \vee \sigma) \vdash \rho \vee \sigma} \text{ax} \quad \frac{\frac{\Gamma, \rho \vdash \rho}{\Gamma, \rho \vdash \rho \vee (\sigma \vee \tau)} \text{ax} \quad \frac{\frac{\Gamma, \sigma \vdash \sigma}{\Gamma, \sigma \vdash \sigma \vee \tau} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, \tau \vdash \tau}{\Gamma, \tau \vdash \sigma \vee \tau} \text{ax}}{\frac{\Gamma, (\rho \vee \sigma) \vdash \rho \vee \sigma}{\Gamma, (\rho \vee \sigma) \vdash \rho \vee (\sigma \vee \tau)} \vee_e} \vee_e \\
\frac{\frac{\Gamma, (\rho \vee \sigma) \vdash \rho \vee \sigma}{\Gamma, (\rho \vee \sigma) \vdash \rho \vee (\sigma \vee \tau)} \vee_e}{\frac{((\rho \vee \sigma) \vee \tau) \vdash \rho \vee (\sigma \vee \tau)}{\vdash ((\rho \vee \sigma) \vee \tau) \Rightarrow (\rho \vee (\sigma \vee \tau))} \Rightarrow_i} \Rightarrow_i
\end{array}$$

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\Gamma, \sigma \vdash \sigma}{\Gamma, \sigma \vdash \sigma} \text{ax}}{\Gamma, \sigma \vdash \rho \vee \sigma} \vee_{i_2}}{\Gamma, \sigma \vdash (\rho \vee \sigma) \vee \tau} \vee_{i_1}}{\Gamma, (\sigma \vee \tau) \vdash \sigma \vee \tau} \text{ax}}{\Gamma, \tau \vdash \tau} \text{ax}}{\Gamma, \tau \vdash (\rho \vee \sigma) \vee \tau} \vee_{i_2}}{\Gamma, (\sigma \vee \tau) \vdash (\rho \vee \sigma) \vee \tau} \vee_e}{\frac{\frac{\frac{\frac{\frac{\Gamma, \rho \vdash \rho}{\Gamma, \rho \vdash \rho \vee \sigma} \vee_{i_1}}{\Gamma, \rho \vdash (\rho \vee \sigma) \vee \tau} \vee_{i_1}}{\Gamma \vdash \rho \vee (\sigma \vee \tau)} \text{ax}}{\Gamma, \rho \vdash (\rho \vee \sigma) \vee \tau} \vee_{i_1}}{\Gamma, (\rho \vee (\sigma \vee \tau)) \vdash (\rho \vee \sigma) \vee \tau} \Rightarrow_i}{\vdash (\rho \vee (\sigma \vee \tau)) \implies ((\rho \vee \sigma) \vee \tau)} \Rightarrow_i$$

2.2 Ejercicio 6

Imprescindible usar **lógica clásica**.

1. Absurdo clásico : $(\neg\tau \implies \perp) \implies \tau$

$$\frac{\frac{\frac{\Gamma \vdash \neg \tau \Rightarrow \perp}{\Gamma, \neg \tau \vdash \perp} \text{PBC} \quad \frac{\Gamma \vdash \neg \tau}{\vdash (\neg \tau \Rightarrow \perp)} \Rightarrow_i}{\vdash (\neg \tau \Rightarrow \perp) \Rightarrow \tau} \Rightarrow_e$$

2. Ley de Pierce : $((\tau \implies \rho) \implies \tau) \implies \tau$

Si lo queremos hacer con la intuicionista, nos vamos a quedar trabados acá

$$\frac{\frac{\Gamma \vdash (\tau \Rightarrow \rho) \Rightarrow \tau \quad \text{ax} \quad \frac{\Gamma, \tau \vdash \rho}{\Gamma \vdash (\tau \Rightarrow \rho)} \Rightarrow_i}{\frac{((\tau \Rightarrow \rho) \Rightarrow \tau) \vdash \tau}{\vdash ((\tau \Rightarrow \rho) \Rightarrow \tau) \Rightarrow \tau} \Rightarrow_i} \Rightarrow_e$$

Con la clásica ...

$$\frac{\frac{\Gamma, \neg\tau \vdash \perp}{((\tau \Rightarrow \rho) \Rightarrow \tau) \vdash \tau} \text{PBC}}{\vdash ((\tau \Rightarrow \rho) \Rightarrow \tau) \Rightarrow \tau} \Rightarrow_i$$

3. Tercero excluido : $\tau \vee \neg\tau$ Vamos a probar $PBC \implies LEM$

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\Gamma, \neg(\tau \vee \neg\tau), \neg\tau \vdash \neg\tau}{\Gamma, \neg(\tau \vee \neg\tau), \neg\tau \vdash (\tau \vee \neg\tau)} \vee_{i_2} \quad \frac{\Gamma, \neg(\tau \vee \neg\tau), \neg\tau \vdash \neg(\tau \vee \neg\tau)}{\Gamma, \neg(\tau \vee \neg\tau), \neg\tau \vdash \neg(\tau \vee \neg\tau)} \neg_e}{\Gamma, \neg(\tau \vee \neg\tau), \neg\tau \vdash \perp} \text{PBC} \quad \frac{\Gamma, \neg(\tau \vee \neg\tau) \vdash \tau}{\Gamma, \neg(\tau \vee \neg\tau) \vdash \tau \vee \neg\tau} \vee_{i_1}}{\Gamma, \neg(\tau \vee \neg\tau) \vdash \tau \vee \neg\tau} \neg_e \quad \frac{\Gamma, \neg(\tau \vee \neg\tau) \vdash \neg(\tau \vee \neg\tau)}{\Gamma, \neg(\tau \vee \neg\tau) \vdash \neg(\tau \vee \neg\tau)} \text{ax} \quad \frac{\Gamma, \neg(\tau \vee \neg\tau) \vdash \perp}{\vdash \tau \vee \neg\tau} \text{PBC}$$

4. Consecuencia milagrosa : $(\neg \tau \implies \tau) \implies \tau$

$$\frac{\frac{\frac{}{(\neg \tau \Rightarrow \tau), \neg \tau \vdash (\neg \tau \Rightarrow \tau)}{\text{ax}} \quad \frac{\frac{}{(\neg \tau \Rightarrow \tau), \neg \tau \vdash \neg \tau}}{\text{ax}}}{(\neg \tau \Rightarrow \tau), \neg \tau \vdash \tau} \Rightarrow_e \quad \frac{}{(\neg \tau \Rightarrow \tau), \neg \tau \vdash \neg \tau} \text{ax}}{\frac{}{(\neg \tau \Rightarrow \tau), \neg \tau \vdash \perp} \text{PBC} \quad \frac{}{(\neg \tau \Rightarrow \tau) \vdash \tau} \Rightarrow_i} \neg_e$$

5. Contraposición clásica : $(\neg\rho \implies \neg\tau) \implies (\tau \implies \rho)$

$$\frac{\frac{\frac{}{(\neg\rho \implies \neg\tau), \tau, \neg\rho \vdash \tau} \text{ax}}{(\neg\rho \implies \neg\tau), \tau, \neg\rho \vdash \neg\tau} \neg_e \quad \frac{\frac{\frac{}{(\neg\rho \implies \neg\tau), \tau, \neg\rho \vdash \neg\rho} \text{ax}}{(\neg\rho \implies \neg\tau), \tau, \neg\rho \vdash \neg\tau} \neg_e}{(\neg\rho \implies \neg\tau), \tau, \neg\rho \vdash \perp} \text{PBC} \quad \frac{}{(\neg\rho \implies \neg\tau), \tau \vdash \rho} \Rightarrow_i}{\frac{}{(\neg\rho \implies \neg\tau) \vdash (\tau \implies \rho)} \Rightarrow_i} \Rightarrow_i$$

6. Análisis de casos : $(\tau \implies \rho) \implies (\neg\tau \implies \rho) \implies \rho$

$$\frac{\frac{\frac{}{\Gamma \vdash \neg\tau \implies \rho} \text{ax}}{\Gamma \vdash \rho} \text{ax} \quad \frac{\frac{\frac{}{\Gamma \vdash \tau \implies \rho} \text{ax}}{\Gamma \vdash \neg\tau} \text{MT}}{\Gamma \vdash \neg\tau \implies \rho} \Rightarrow_e \quad \frac{}{\Gamma \vdash \neg\rho} \text{ax}}{\Gamma \vdash \neg\rho} \neg_e \quad \frac{\frac{\frac{}{(\tau \implies \rho), (\neg\tau \implies \rho), \neg\rho \vdash \perp} \text{PBC}}{(\tau \implies \rho), (\neg\tau \implies \rho) \vdash \rho} \Rightarrow_i}{(\tau \implies \rho) \vdash (\neg\tau \implies \rho) \implies \rho} \Rightarrow_i}{\vdash (\tau \implies \rho) \implies (\neg\tau \implies \rho) \implies \rho} \Rightarrow_i$$

7. Implicación vs disyunción : $(\tau \implies \rho) \iff (\neg\tau \vee \rho)$

- \implies falta !!

$$\frac{\frac{}{(\tau \implies \rho) \vdash (\neg\tau \vee \rho)} \neg \text{ax}}{\vdash (\tau \implies \rho) \implies (\neg\tau \vee \rho)} \Rightarrow_i$$

- \Leftarrow

$$\frac{\frac{\frac{}{(\neg\tau \vee \rho), \tau \vdash (\neg\tau \vee \rho)} \text{ax}}{(\neg\tau \vee \rho), \tau, \neg\tau, \neg\rho \vdash \tau} \text{ax} \quad \frac{\frac{}{(\neg\tau \vee \rho), \tau, \neg\tau, \neg\rho \vdash \neg\tau} \text{ax}}{(\neg\tau \vee \rho), \tau, \neg\tau, \neg\rho \vdash \perp} \text{PBC}}{\frac{}{(\neg\tau \vee \rho), \tau \vdash \rho} \Rightarrow_i} \Rightarrow_i \quad \frac{}{(\neg\tau \vee \rho), \tau, \rho \vdash \rho} \text{ax}}{\vdash (\neg\tau \vee \rho) \implies (\tau \implies \rho)} \Rightarrow_e$$

2.3 Ejercicio 7

1. **Weakening** : Si $\Gamma \vdash \sigma$ es válido, entonces $\Gamma, \tau \vdash \sigma$. Con inducción sobre el tamaño de la derivación

- Caso Base : $\Gamma \vdash \sigma$ es válido por *axioma*. Entonces, $\Gamma = \Gamma', \sigma$ y $\Gamma', \sigma \vdash \sigma$ es la derivación de $\Gamma \vdash \sigma$.
qvq $\Gamma, \tau \vdash \sigma$, en otras palabras, que $\Gamma', \sigma, \tau \vdash \sigma$. Esto vale por la siguiente derivación :

$$\frac{}{\Gamma', \sigma, \tau \vdash \sigma} \text{ax}$$

- Paso Inductivo :

(a) \Rightarrow_i : $\Gamma \vdash \sigma$ es válido y se demostró usando \implies . Entonces $\sigma = \rho \implies \sigma'$, es decir que la derivación de $\Gamma \vdash \sigma$ es :

$$\frac{\frac{}{\Gamma, \rho \vdash \sigma'}}{\Gamma \vdash \rho \implies \sigma'} \Rightarrow_i$$

Por H.I, la propiedad vale para las premisas, que en este caso la *única* es $\Gamma, \rho \vdash \sigma'$. Entonces, por HI $\Gamma, \rho \vdash \sigma'$. Luego ,

$$\frac{\frac{}{\Gamma, \rho \vdash \sigma'}}{\Gamma \vdash \rho \implies \sigma'} \text{HI}$$

Y entonces, $\Gamma, \tau \vdash \rho \implies \sigma'$ es válido.

(b) $\neg_i : \Gamma \vdash \sigma$ es válido y se demostró usando $\neg_i \implies \sigma = \neg\sigma'$. O sea, la derivación de $\Gamma \vdash \sigma$ es

$$\frac{\overline{\Gamma, \sigma' \vdash \perp}}{\Gamma \vdash \neg\sigma'} \neg_i$$

Por H.I, la propiedad vale para las premisas que en este caso, la única es $\Gamma, \sigma' \vdash \perp$. Entonces por H.I, $\Gamma, \sigma', \tau \vdash \perp$. Luego,

$$\frac{\overline{\Gamma, \sigma', \tau \vdash \perp}}{\Gamma, \tau \vdash \neg\sigma'} \text{HI} \neg_i$$

Y entonces, $\Gamma, \tau \vdash \sigma'$ es válido.

(c) $\neg_e : \Gamma \vdash \sigma$ es válido y se demostró usando $\neg_e \implies \sigma = \perp$. O sea, la derivación de $\Gamma \vdash \sigma$ es

$$\frac{\overline{\Gamma \vdash \rho} \quad \overline{\Gamma \vdash \neg\rho}}{\Gamma \vdash \perp} \neg_e$$

Por H.I, la propiedad vale para las premisas que son $\Gamma \vdash \rho$ y $\Gamma \vdash \neg\rho$. Entonces, por H.I, $\Gamma, \tau \vdash \rho$ y $\Gamma, \tau \vdash \neg\rho$. Luego,

$$\frac{\overline{\Gamma \vdash \rho} \text{HI} \quad \overline{\Gamma \vdash \neg\rho} \text{HI}}{\Gamma \vdash \perp} \neg_e$$

Y $\Gamma, \tau \vdash \sigma$ es válido

(d) $\Rightarrow_e : \Gamma \vdash \sigma$ es válido y se demostró usando \Rightarrow_e . O sea, la derivación de $\Gamma \vdash \sigma$ es

$$\frac{\overline{\Gamma \vdash \rho \implies \sigma} \quad \overline{\Gamma \vdash \rho}}{\Gamma \vdash \sigma} \Rightarrow_e$$

Por H.I, la propiedad vale para las premisas que son $\Gamma \vdash \rho \implies \sigma$ y $\Gamma \vdash \rho$. Entonces, por H.I, $\Gamma, \tau \vdash \rho \implies \sigma$ y $\Gamma, \tau \vdash \rho$. Luego,

$$\frac{\overline{\Gamma, \tau \vdash \rho \implies \sigma} \text{HI} \quad \overline{\Gamma, \tau \vdash \rho} \text{HI}}{\Gamma, \tau \vdash \sigma} \Rightarrow_e$$

Y $\Gamma, \tau \vdash \sigma$ es válido.

(e) $\vee_e : \Gamma \vdash \sigma$ es válido y se demostró usando \vee_e . O sea, la derivación de $\Gamma \vdash \sigma$ es

$$\frac{\overline{\Gamma \vdash \rho \vee \psi} \quad \overline{\Gamma, \rho \vdash \sigma} \quad \overline{\Gamma, \psi \vdash \sigma}}{\Gamma \vdash \sigma} \vee_e$$

Por H.I, la propiedad vale para las premisas que son $\Gamma \vdash \rho \vee \psi$, $\Gamma, \rho \vdash \sigma$, $\Gamma, \psi \vdash \sigma$. Entonces por H.I, $\Gamma, \tau \vdash \rho \vee \psi$, $\Gamma, \rho, \tau \vdash \sigma$ y $\Gamma, \psi, \tau \vdash \sigma$. Luego :

$$\frac{\overline{\Gamma, \tau \vdash \rho \vee \psi} \text{HI} \quad \overline{\Gamma, \rho, \tau \vdash \sigma} \text{HI} \quad \overline{\Gamma, \psi, \tau \vdash \sigma} \text{HI}}{\Gamma, \tau \vdash \sigma} \vee_e$$

Y $\Gamma, \tau \vdash \sigma$ es válido.

(f) $\vee_{i_1} : \Gamma \vdash \sigma$ es válido y se demostró usando \vee_{i_1} . Entonces $\sigma = \sigma_1 \vee \sigma_2$. O sea, la derivación de $\Gamma \vdash \sigma$ es

$$\frac{\overline{\Gamma \vdash \sigma_1}}{\Gamma \vdash \sigma_1 \vee \sigma_2} \vee_{i_1}$$

Por H.I, la propiedad vale para las premisas, en este caso la única es $\Gamma \vdash \sigma_1$. Entonces, por H.I $\Gamma, \tau \vdash \sigma_1$. Luego

$$\frac{\overline{\Gamma, \tau \vdash \sigma_1} \text{HI}}{\Gamma, \tau \vdash \sigma_1 \vee \sigma_2} \vee_{i_1}$$

Y entonces, $\Gamma, \tau \vdash \sigma_1 \vee \sigma_2$ es válido.

(g) $\vee_{i_1} : \Gamma \vdash \sigma$ es válido y se demostró usando \vee_{i_2} . Entonces $\sigma = \sigma_1 \vee \sigma_2$. O sea, la derivación de $\Gamma \vdash \sigma$ es

$$\frac{\overline{\Gamma \vdash \sigma_2}}{\Gamma \vdash \sigma_1 \vee \sigma_2} \vee_{i_2}$$

Por H.I, la propiedad vale para las premisas, en este caso la única es $\Gamma \vdash \sigma_2$. Entonces, por H.I $\Gamma, \tau \vdash \sigma_2$. Luego

$$\frac{\overline{\Gamma, \tau \vdash \sigma_2} \text{HI}}{\Gamma, \tau \vdash \sigma_1 \vee \sigma_2} \vee_{i_2}$$

Y entonces, $\Gamma, \tau \vdash \sigma_1 \vee \sigma_2$ es válido.

(h) $\wedge_i : \Gamma \vdash \sigma$ es válido y se demostró usando \wedge_i . Entonces, $\sigma = \sigma_1 \wedge \sigma_2$. O sea, la derivación de $\Gamma \vdash \sigma$ es

$$\frac{\overline{\Gamma \vdash \sigma_1} \quad \overline{\Gamma \vdash \sigma_2}}{\Gamma \vdash \sigma_1 \wedge \sigma_2} \wedge_i$$

Por H.I, la propiedad vale para las premisas que son $\Gamma \vdash \sigma_1$ y $\Gamma \vdash \sigma_2$. Entonces, por H.I, $\Gamma, \tau \vdash \sigma_1$ y $\Gamma, \tau \vdash \sigma_2$. Luego

$$\frac{\overline{\Gamma, \tau \vdash \sigma_1} \text{ HI} \quad \overline{\Gamma, \tau \vdash \sigma_2} \text{ HI}}{\Gamma, \tau \vdash \sigma_1 \wedge \sigma_2} \wedge_i$$

Y $\Gamma, \tau \vdash \sigma_1 \wedge \sigma_2$ es válido.

- (i) \wedge_{e1} $\Gamma \vdash \sigma$ es válido y se demostró usando \wedge_{e1} . O sea, la derivación de $\Gamma \vdash \sigma$ es

$$\frac{\overline{\Gamma \vdash \sigma \wedge \rho}}{\Gamma \vdash \sigma} \wedge_{e1}$$

Por H.I, la propiedad vale para las premisas que en este caso, única, $\Gamma \vdash \sigma \wedge \rho$. Entonces, por H.I, $\Gamma, \tau \vdash \sigma \wedge \rho$. Luego

$$\frac{\overline{\Gamma, \tau \vdash \sigma \wedge \rho} \text{ HI}}{\Gamma, \tau \vdash \sigma} \wedge_{e1}$$

Entonces $\Gamma, \tau \vdash \sigma$ es válido.

- (j) \wedge_{e1} $\Gamma \vdash \sigma$ es válido y se demostró usando \wedge_{e1} . O sea, la derivación de $\Gamma \vdash \sigma$ es

$$\frac{\overline{\Gamma \vdash \sigma \wedge \rho}}{\Gamma \vdash \sigma} \wedge_{e2}$$

Por H.I, la propiedad vale para las premisas que en este caso, única, $\Gamma \vdash \sigma \wedge \rho$. Entonces, por H.I, $\Gamma, \tau \vdash \sigma \wedge \rho$. Luego

$$\frac{\overline{\Gamma, \tau \vdash \sigma \wedge \rho} \text{ HI}}{\Gamma, \tau \vdash \sigma} \wedge_{e2}$$

Entonces $\Gamma, \tau \vdash \sigma$ es válido.

- (k) \perp_e $\Gamma \vdash \sigma$ es válido y se demostró usando \perp_e . O sea, la derivación $\Gamma \vdash \sigma$ es

$$\frac{\overline{\Gamma \vdash \perp}}{\Gamma \vdash \sigma} \perp_e$$

Por H.I, la propiedad vale para las premisas, en este caso, única $\Gamma \vdash \perp$. Entonces, por H.I, $\Gamma, \tau \vdash \perp$. Luego

$$\frac{\overline{\Gamma, \tau \vdash \perp} \text{ HI}}{\Gamma, \tau \vdash \sigma} \perp_e$$

Entonces, $\Gamma, \tau \vdash \sigma$ es válido.