

Percentage of susceptible Organisms Isolated, For Sputum, 01 n.a. 2568 - 31 n.a. 2568

Organism		TOTAL ISOLATE	BETA - LACTAMS															CARBAPENEMS			POLY MYXINS	QUINOLONES		AMINOGLYCOSIDES		GLYCOPEPTIDES		MISCELLANEOUS										
			PENICILIN	PENICILIN BY MIC	PENICILIN	PENICILIN BY MIC	AMPCILLIN	AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID	AMPCILLIN/SULBACTAM	PIPERACILIN/TAZOBACTAM	CEFAZOLIN	CEFUROXIME	CEFOPERAZONE/SULBACTAM	CEFTOXIME	CEFTAZIDIME	CEFTRIAXONE	CEFERIME	OXACILLIN	CEFOXITIN	ERTAPENEM	IMIPENEM	MEROPENEM	COLISTIN	CIPROFLOXACIN	LEVOFLOXACIN	AMIKACIN	GENTAMICIN	VANCOMYCIN	VANCOMYCIN BY MIC	CLINDAMYCIN	CLINDAMYCIN BY MIC	ERYTHROMYCIN	ERYTHROMYCIN BY MIC	CHLORAMPHENICOL	CO-TRIMOXAZOLE	TRIMETHOPRIM/SULFAMETHOXAZOLE	TETRACYCLINE	
Acinetobacter baumannii	17	-	-	-	-	-	-	-	5.9 (17)	-	-	0 (16)	-	5.9 (17)	-	-	-	-	-	5.9 (17)	5.9 (17)	0 (17)	11.8 (17)	11.8 (17)	35.3 (17)	5.9 (17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.4 (17)	-
Acinetobacter spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Enterobacter cloacae	1	-	-	-	-	-	0 (1)	-	100 (1)	-	-	-	-	100 (1)	100 (1)	-	-	-	100 (1)	-	100 (1)	-	100 (1)	100 (1)	100 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (1)	-		
Enterobacter spp.	1	-	-	-	-	-	0 (1)	-	100 (1)	-	-	-	-	100 (1)	100 (1)	-	-	-	100 (1)	100 (1)	100 (1)	0 (1)	100 (1)	100 (1)	100 (1)	100 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (1)	-		
Escherichia coli	4	-	-	-	-	-	66.7 (3)	-	75.0 (4)	-	-	-	-	50.0 (4)	50.0 (4)	-	-	-	75.0 (4)	75.0 (4)	100 (4)	25.0 (4)	50.0 (4)	50.0 (4)	75.0 (4)	25.0 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0 (4)	-		
Haemophilus influenzae	3	-	-	-	-	33.3 (3)	0 (2)	-	-	-	-	-	100 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.3 (3)	-	
Klebsiella aerogenes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Klebsiella pneumoniae	20	-	-	-	-	-	50.0 (20)	-	60.0 (20)	-	-	-	-	55.0 (20)	55.0 (20)	-	-	-	80.0 (20)	80.0 (20)	80.0 (20)	36.8 (19)	45.0 (20)	45.0 (20)	95.0 (20)	50.0 (20)	-	-	-	-	-	-	-	-	55.0 (20)	-		
Klebsiella spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Moraxella catarrhalis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Proteus mirabilis	2	-	-	-	-	-	100 (2)	-	50.0 (2)	-	-	-	-	50.0 (2)	50.0 (2)	-	-	-	100 (2)	-	100 (2)	0 (2)	100 (2)	100 (2)	50.0 (2)	100 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (2)	-		
Pseudomonas aeruginosa	16	-	-	-	-	-	-	-	83.8 (16)	-	-	-	-	81.2 (16)	-	-	-	-	-	60.0 (15)	68.8 (16)	25.0 (16)	87.5 (16)	87.5 (16)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Serratia marcescens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Salmonella, Typhoidal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Salmonella, Non-typhoidal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gram Positive																																						
Stenotrophomonas maltophilia	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.3 (6)	-	
Staphylococcus aureus	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90.0 (10)	-	100 (10)	-	100 (10)	-	100 (10)	-	100 (10)	-	66.7 (6)	-	
Streptococcus pneumoniae	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (3)	-	-	0 (3)	-	-	-	-	-	-	-	100 (3)	-	-	100 (3)	-	33.3 (3)	-	33.3 (3)	-	-	-	-	0 (3)	-	

%S

*** COLISTIN use %