

Percentage of susceptible Organisms Isolated, For All Specimen, 01 s.n. 2567 - 31 s.n. 2567

Organism	TOTAL ISOLATE	BETA - LACTAMS																CARBAPENEMS			POLY MYXINS	QUINOLONES			AMINOGLYCOSIDES		GLYCOPEPTIDES		MISCELLANEOUS														
		PENICILLIN	PENICILLIN BY MIC	AMPICILLIN	AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID	2-6 AMPICILLIN/SULBACTAM	5-6 PIPERACILLIN/TAZOBACTAM	CEFAZOLIN	CEFUROXIME	CEFOPERAZONE/SULBACTAM	CEFOTAXIME	CEFOTAXIME BY MIC	CEFTAZIDIME	CEFTAZIDIME BY MIC	CEFTRAZONE	CEFTRAZONE BY MIC	CEFERPIME	OXACILLIN	CEFOXITIN	ERTAPENEM	IMPENEM	MEROPENEM	COLISTIN	PROFLOXACIN	LEVOFLOXACIN	NORFLOXACIN	AMIKACIN	GENTAMICIN	GENTAMICIN HIGH LEVEL	VANCOMYCIN	VANCOMYCIN BY MIC	TEICoplanin	POSIFYCIN	CLINDAMYCIN	CLINDAMYCIN BY MIC	ERYTHROMYCIN	ERYTHROMYCIN BY MIC	NITROFURANTON	CHLORAMPHENICOL	CO-TRIMOXAZOLE	TETRACYCLINE		
Acinetobacter baumannii	6	-	-	-	-	2	50.0 (5)	-	2	-	-	-	50.0 (5)	-	-	-	-	-	-	50.0 (5)	50.0 (5)	50.0 (5)	5	90.0 (6)	50.0 (6)	-	50.0 (6)	50.0 (5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Acinetobacter spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Aeromonas hydrophila	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (2)	-	100 (2)	-	-	-	-	-	-	100 (2)	100 (2)	100 (2)	-	100 (2)	100 (2)	-	100 (2)	100 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Burkholderia cepacia complex	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Burkholderia mallei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Burkholderia pseudomallei	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (11)	-	-	-	-	-	-	-	0 (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Citrobacter freundii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Enterobacter cloacae	2	-	-	0 (2)	-	-	50.0 (2)	-	-	-	50.0 (2)	-	50.0 (2)	-	-	-	-	-	-	50.0 (2)	50.0 (2)	50.0 (2)	-	0 (2)	0 (2)	-	0 (2)	50.0 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterobacter spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Escherichia coli (all isolates)	84	-	-	15.5 (84)	-	-	88.1 (84)	-	-	-	64.3 (84)	-	73.8 (84)	-	-	-	-	-	-	90.5 (84)	90.5 (84)	91.7 (84)	-	0 (84)	0 (84)	-	0 (84)	69.0 (84)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Haemophilus influenzae (all isolates)	1	-	-	0 (1)	0 (1)	-	-	-	-	100 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Klebsiella aerogenes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Klebsiella oxytoca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Klebsiella pneumoniae (all isolates)	23	-	-	0 (23)	-	-	65.2 (23)	-	-	-	52.2 (23)	-	52.2 (23)	-	-	-	-	-	-	78.3 (23)	87.0 (23)	87.0 (23)	-	0 (23)	0 (23)	-	0 (23)	65.2 (23)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Morganella morganii	1	-	-	0 (1)	-	-	100 (1)	-	-	-	100 (1)	-	100 (1)	-	-	-	-	-	-	100 (1)	100 (1)	100 (1)	-	0 (1)	0 (1)	-	0 (1)	100 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Neisseria meningitidis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Neisseria gonorrhoeae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Proteus mirabilis	11	-	-	63.6 (11)	-	-	100 (11)	-	-	-	90.9 (11)	-	100 (11)	-	-	-	-	-	-	100 (11)	-	100 (11)	-	0 (11)	0 (11)	-	0 (11)	72.7 (11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Proteus vulgaris	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Providencia rettgeri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Providencia stuartii	3	-	-	0 (3)	-	-	100 (3)	-	-	-	100 (3)	-	100 (3)	-	-	-	-	-	-	100 (3)	100 (3)	100 (3)	-	0 (3)	0 (3)	-	0 (3)	0 (3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Providencia spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pseudomonas aeruginosa	9	-	-	-	-	-	55.6 (9)	-	-	-	-	-	55.6 (9)	-	-	-	-	-	-	44.4 (9)	44.4 (9)	77.8 (9)	44.4 (9)	44.4 (9)	-	55.6 (9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonella, Typhoidal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Salmonella spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Serratia marcescens	2	-	-	0 (2)	-	-	100 (2)	-	-	-	100 (2)	-	100 (2)	-	-	-	-	-	-	100 (2)	100 (2)	100 (2)	-	0 (2)	0 (2)	-	0 (2)	100 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Shigella spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Stenotrophomonas maltophilia	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Vibrio cholerae (all serotypes)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vibrio cholerae O1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vibrio cholerae O139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vibrio cholerae non O1, non O139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vibrio parahaemolyticus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Vibrio spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Enterococcus faecalis	8	-	-	100 (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0 (8)	-	-	12.5 (8)	-	100 (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterococcus faecium	6	-	-	0 (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (6)	-	-	50.0 (6)	50.0 (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Enterococcus spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Staphylococcus aureus (all isolates)	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (10)	-	-	100 (10)	-	-	-	100 (9)	88.9 (9)	-	-	-	-	-	-		
Staphylococcus, coagulase negative	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Streptococcus agalactiae	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (1)	0 (1)	-	-	-	-		
Streptococcus,beta-hemolytic not Group A,B,D	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																			

%S