

Percentage of susceptible Organisms Isolated, For Urine, 01 n.n. 2567 - 31 n.n. 2567

Organism	TOTAL ISOLATE	BETA - LACTAMS														CARBAPENEMS			POLY MYXINS	QUINOLONES			AMINOGLYCOSIDES			GLYCOPEPTIDES		MISCELLANEOUS							
		PENICILLIN	AMPICILLIN	AMOXICILLIN/CLAVULANIC ACID	AMPCILLIN/SULBACTAM	PIPERACILLIN/TAZOBACTAM	CEFZOLIN	CEFUROXIME	CEFOPEAZONE/SULBACTAM	CEFOTAXIME	CEFTAZIDIME	CEFTRIAXONE	CEFEPIME	OXAICLIN	CEFOXITIN	ERTAPENEM	MIPENEM	MEROPENEM	COLISTIN	CIPROFLOXACIN	LEVOFLOXACIN	NORFLOXACIN	AMIKACIN	GENTAMICIN	*GENTAMICIN HIGH LEVEL	VANCOMYCIN	TEICOPLANIN	POSFOMYCIN	CLINDAMYCIN	ERYTHROMYCIN	NITROFURANTOIN	CHLORAMPHENICOL	CO-TRIMOXAZOLE	TETRACYCLINE	
Gram Negative	Acinetobacter baumannii	2	-	-	-	0 (1)	50.0 (2)	-	-	0 (1)	-	50.0 (2)	-	-	-	50.0 (2)	50.0 (2)	0 (2)	50.0 (2)	50.0 (2)	-	50.0 (2)	50.0 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Acinetobacter spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Enterobacter cloacae	1	-	0 (1)	-	0 (1)	-	-	-	0 (1)	0 (1)	-	-	-	0 (1)	0 (1)	0 (1)	-	0 (1)	0 (1)	-	0 (1)	0 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Enterobacter spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Escherichia coli	47	-	10.6 (47)	-	-	83.0 (47)	-	-	-	51.1 (47)	61.7 (47)	-	-	-	87.2 (47)	87.2 (47)	89.4 (47)	-	0 (47)	0 (47)	-	0 (47)	78.7 (47)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Klebsiella pneumoniae	10	-	0 (10)	-	-	60.0 (10)	-	-	-	60.0 (10)	60.0 (10)	-	-	-	80.0 (10)	90.0 (10)	90.0 (10)	-	0 (10)	0 (10)	-	0 (10)	80.0 (10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Klebsiella spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Morganella morganii	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Proteus mirabilis	4	-	25.0 (4)	-	-	100 (4)	-	-	-	75.0 (4)	100 (4)	-	-	-	100 (4)	-	100 (4)	-	0 (4)	0 (4)	-	0 (4)	25.0 (4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Pseudomonas aeruginosa	6	-	-	-	-	33.3 (6)	-	-	-	-	33.3 (6)	-	-	-	-	16.7 (6)	16.7 (6)	83.3 (6)	16.7 (6)	16.7 (6)	-	33.3 (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salmonella, Typhoidal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Salmonella, Non-typhoidal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gram Positive	Enterococcus faecalis	8	-	100 (8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.0 (8)	-	-	-	12.5 (8)	100 (8)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Enterococcus faecium	6	-	0 (6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0 (6)	-	-	-	50.0 (6)	50.0 (6)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Enterococcus spp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Staphylococcus aureus	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (1)	-	100 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Staphylococcus, coagulase negative	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (2)	-	100 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Streptococcus,?-hemolytic not Group A,B,D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Staphylococcus lugdunensis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Staphylococcus saprophyticus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Streptococcus agalactiae	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	100 (1)	0 (1)	-	-	-	-		

%S
 ≥ 90 80-89 70-79 50-69 < 50
 *** COLISTIN use %I