

Profesor Branko Jeren

transformacija

rad student

# Signali i sustavi

Profesor Branko Jeren

02. lipnja 2008.



Profesor Branko Jeren

transformaci

Definicija

#### Delilileija

konvergencije z–transforma z–transforma

Svojstva

Inverzna z-transformacij z-transformacij u analizi

Samostalni rad studenta

# Odziv diskretnog sustava na pobudu kompleksnom eksponencijalom

 pokazano je kako je odziv mirnog, linearnog, vremenski diskretnog sustava, na svevremensku eksponencijalu Uz<sup>n</sup>,

$$y(n) = H(z)Uz^n$$

pri čemu je

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

 za z, kao kompleksnu varijablu, H(z) je kompleksna funkcija



Profesor Branko Jeren

Definicija

### z – transformacija

sumaciju

$$H(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h(n)z^{-n}$$

možemo interpretirati kao transformaciju vremenske funkcije, impulsnog odziva h(n) diskretnog sustava, u kompleksnu funkciju H(z)

- ovako definiranu transformaciju nazivamo dvostrana ili bilateralna z-transformaciia
- z transformacija H(z) predstavlja, dakle, alternativni prikaz vremenskog niza h(n)



#### Profesor Branko Jeren

transformac

#### Definicija

Područje konvergencije z–transformacij z–transformacij

Svojstva z–transformaci

Inverzna z–transformacij z–transformacij u analizi

Samostalni rad studenta

#### z – transformacija

• za diskretni signal x(n), definira se dvostrana z-transformacija

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

z–transformacija označuje se simbolički kao

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(n)\}$$

ili još jednostavnije

$$x(n) \stackrel{z}{\longleftrightarrow} X(z)$$



Profesor Branko Jeren

Definicija

## z-transformacija - primjer 1

- neka je zadan vremenski diskretan signal, kao konačni niz,  $x(n) = \{1, 2, 3, 3, 2, 1\}, n > 0$
- slijedi kako je

$$X(z) = \sum_{n=0}^{5} x(n)z^{-n} = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 3z^{-3} + 2z^{-4} + z^{-5}$$

odnosno

$$X(z) = \frac{z^5 + 2z^4 + 3z^3 + 3z^2 + 2z + 1}{z^5}$$

- gornja sumacija konvergira, pa time X(z) poprima konačne vrijednosti, za sve  $z \in Kompleksni$  osim za z = 0
- primjer pokazuje kako je signalu x(n), zadanom u vremenskoj domeni, pridružena njegov alternativni prikaz ("slika") X(z), u z-domeni (frekvencijskoj domeni)



Profesor Branko Jeren

transform

Definicija

#### Područje

konvergencije z–transformacije z–transformacije osnovnih nizova Svojstva z–transformacije Inverzna z–transformacije u analizi

Samostalni rad studenta

#### z-transformacija - primjer 1

veza između

$$x(n) = \{\underline{1}, 2, 3, 3, 2, 1\}$$

Ì

$$X(z) = 1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 3z^{-3} + 2z^{-4} + z^{-5}$$

je očigledna:

koeficijent uz  $z^{-n}$  je vrijednost signala u koraku n, drugim riječima, eksponent od z sadrži vremensku informaciju potrebnu da bi se identificirali uzorci signala

• usporedimo prikaz x(n) u vremenskoj i frekvencijskoj domeni<sup>1</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>prikazuje se samo |X(z)|



#### Profesor Branko Jeren

Z-

Definicija

#### Definicija

konvergencije z–transformaci z–transformaci


Svojstva z–transforma


z-transforma

z-transformac z-transformac u analizi linearnih susta

Samostalni rad studenta

## z – transformacija





• polovi i nule X(z) su

$$p_1 = 0;$$
  $z_1 = -1.0000 = e^{j\pi}$ 

$$p_2 = 0;$$
  $z_2 = +j1.0000 = e^{j\frac{\pi}{2}}$ 

$$p_3 = 0;$$
  $z_3 = -j1.0000 = e^{-j\frac{\pi}{2}}$ 

$$p_4 = 0;$$
  $z_4 = -0.5000 + j0.8660 = e^{j\frac{2\pi}{3}}$ 

$$p_5 = 0;$$
  $z_5 = -0.5000 - j0.8660 = e^{-j\frac{2\pi}{3}}$ 



Profesor Branko Jeren

transforr

Samostalni rad studenta

#### z-transformacija - primjer 2

određuje se z–transformacija niza

$$x(n) = \alpha^n \mu(n)$$

• signal x(n) čini beskonačni broj uzoraka

$$x(n) = \{\underline{1}, \alpha, \alpha^2, \alpha^3, \ldots\}$$

iz definicije z–transformacije slijedi

$$X(z) = \sum_{n = -\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} = \sum_{n = -\infty}^{\infty} \alpha^{n} \mu(n)z^{-n} = \sum_{n = 0}^{\infty} \alpha^{n}z^{-n}$$
$$X(z) = 1 + \alpha z^{-1} + \alpha^{2}z^{-2} + \alpha^{3}z^{-3} + \dots$$

što je sukladno prije izrečenoj interpretaciji z-transformacije



Profesor Branko Jeren

transforn

Definicija

#### Područie

konvergencije z–transformacije z–transformacije osnovnih nizova Svojstva z–transformacije Inverzna z–transformacije z–transformacije u analizi linearnih sustavi

Samostalni rad studenta

### z-transformacija - primjer 2

u

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n$$

prepoznaje se geometrijski red

• da bi X(z) konvergirao mora biti  $|\sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n| < \infty$  a to će biti za

$$|\alpha z^{-1}| < 1 \Leftrightarrow |z| > |\alpha|$$

tada je

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n = \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}} = \frac{z}{z - \alpha}, \quad \text{ za } |z| > |\alpha|$$

• područje kompleksne ravnine,  $|z| > |\alpha|$ , za koje X(z) konvergira, nazivamo područje konvergencije,  $\mathcal{PK}$ , z-transformacije



Profesor Branko Jeren

Ztransformacii

Definicija

Područje konvergencije

konvergencije z–transformacije

osnovnih ni

Svojstva z-transform


z-transform: Inverzna

z–transforma u analizi

Samostalni

# Područje konvergencije z-transformacije

- z-transformacija je racionalna funkcija
- z-transformacija niza  $x(n) = \alpha^n \mu(n)$  ima jednu **nulu** u z=0 i jedan **pol** u  $z=\alpha$





Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

ztransformaci

Područje

konvergencije z–transformacije

osnovnih niz

Svojstva


z-transforma

z-transformaci z-transformaci u analizi

Samostalni rad studenta

### z-transformacija - primjer 3

• određuje se z–transformacija niza  $x(n) = \alpha^n \mu(n) = 0.75^n \mu(n)$ 



• z-transformacija je

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^n \mu(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (0.75 z^{-1})^n = \frac{z}{z - 0.75}$$

za 
$$|0.75z^{-1}| < 1 \Leftrightarrow |z| > |0.75|$$



Profesor Branko Jeren

7-

transform

Područje konvergencije

z–transformacije

osnovnih nizo

Svoistva

z-transform

2—transionii

z-transforma z-transforma


u analizi linearnih sustav

Samostalni rad studenta

### z-transformacija - primjer 4

• određuje se z-transformacija niza  $x(n) = -\alpha^n \mu(-n-1) = -0.75^n \mu(-n-1)$ 

n	<i>x</i> ( <i>n</i> )
≥ 0	0
-1	-1.3333
-2	-1.7778
-3	-2.3704
-4	-3.1605
-5	-4.2140
-6	-5.6187
-7	-7.4915
-8	-9.9887
-9	-13.3183
-10	-17.7577





Profesor Branko Jeren

ztransfo

Područje konvergencije

z-transformacije z-transformacija

osnovnih ni Svoistva

z-transform

z-transformac

Samostalni rad studenta

#### z-transformacija - primjer 4

z–transformacija je

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} -\alpha^n \mu(-n-1) z^{-n} = -\sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha^n z^{-n} =$$
$$= -\sum_{n=1}^{\infty} \alpha^{-n} z^n = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha^{-1} z)^n$$

ako je  $|\alpha^{-1}z| < 1 \Leftrightarrow |z| < |\alpha|$  tada gornja suma konvergira i vrijedi:

$$X(z)=1-\frac{1}{1-\alpha^{-1}z}=\frac{1}{1-\alpha z^{-1}}=\frac{z}{z-\alpha}$$
 za  $|z|<|\alpha|$ 



Profesor Branko Jeren

ztransformac

Područje konvergencije z–transformacije

z-transforma

Svojstva

z-transform


z-transforma z-transforma

u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

# Područje konvergencije z-transformacije

- z-transformacija je racionalna funkcija
- z-transformacija niza  $x(n) = -\alpha^n \mu(-n-1)$  ima jednu **nulu** u z=0 i jedan **pol** u  $z=\alpha$





Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

Z-

Definicija Područje konvergencije z–transformacije

osnovnih nizo
Svojstva
z–transforma

Inverzna z–transformaci z–transformaci u analizi

Samostalni rad studenta

## Područje konvergencije z-transformacije

• usporedbom primjera 3 i primjera 4

$$\alpha^n \mu(n) \stackrel{z}{\longleftrightarrow} \frac{z}{z-\alpha} \quad \text{za } |z| > |\alpha|$$

odnosno

$$-\alpha^n \mu(-n-1) \stackrel{z}{\longleftrightarrow} \frac{z}{z-\alpha}$$
 za  $|z| < |\alpha|$ 

zaključujemo kako dva različita signala, jedan strogo kauzalni a drugi strogo nekauzalni, imaju identične izraze za z–transformaciju i kako se njihova razlika očituje samo u području konvergencije,  $\mathcal{PK}$ ,

- područje konvergencije  $\mathcal{PK}$ , z–transformacije, je važna i nužna informacija i tek definirano  $\mathcal{PK}$  daje jednoznačnu vezu između niza i njegove z–transformacije
- stoga, z–transformacija mora biti uvijek zadana s njezinim  $\mathcal{PK}$



Profesor Branko Jeren

ztransforma

Definicija Područie

Područje konvergencije z–transformacije

Svojstva z–transformaci Inverzna z–transformaci z–transformaci

Samostalni rad studenta

## z-transformacija - primjer 5

• određuje se z-transformacija niza

$$x(n) = \alpha^n \mu(n) + \beta^n \mu(-n-1)$$

• iz definicije z–transformacije slijedi

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n z^{-n} + \sum_{n=-\infty}^{-1} \beta^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha z^{-1})^n + \sum_{m=1}^{\infty} (\beta^{-1} z)^m$$

- prva suma konvergira za  $|\alpha z^{-1}|$  ili  $|z| > |\alpha|$
- druga suma konvergira za  $|eta^{-1}z| < 1$  ili |z| < |eta|
- ullet u određivanju konvergencije X(z) postoje dva slučaja
  - $|\beta| < |\alpha|$  ne postoji područje preklapanja područja konvergencije i ne postoji X(z)
  - $|\beta| > |\alpha|$  postoji prsten u z–ravnini u kojem obje sume konvergiraju i on predstavlja područje konvergencije X(z)



Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

2007/2008

ztransformaci Definicija

Područje konvergencije z–transformac

z-transformacije z-transformacija

osnovnih ni


Svojstva z–transform

Inverzna z–transforma

u analizi linearnih sustav

Samostalni rad studenta

## z-transformacija - primjer 5



pa je z-transformacija niza  $x(n) = \alpha^n \mu(n) + \beta^n \mu(-n-1)$ 

$$X(z) = \frac{1}{1 - \alpha z^{-1}} - \frac{1}{1 - \beta z^{-1}} = \frac{z}{z - \alpha} - \frac{z}{z - \beta}$$

uz područje konvergencije z—transformacije  $|\alpha| < |z| < |\beta|$ 



2007/2008 Cjelina 16.

Profesor Branko Jeren

ztransformaci

Područje konvergencije z–transformacije z–transformacija

osnovnih nizo Svojstva z–transforma

Inverzna z–transformacij z–transformacij u analizi

Samostalni rad studenta

## z-transformacija kauzalnih nizova

z-transformacija kauzalnih nizova definirana je kao

$$X: \mathcal{PK}(x) \rightarrow Kompleksni$$

$$\forall z \in \mathcal{PK}(x), \quad X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n}$$

gdje je područje konvergencije,  $\mathcal{PK}(x) \subset \textit{Kompleksni}$ , definirano<sup>2 3</sup> s

$$\mathcal{PK}(x) = \left\{ z = re^{j\omega} \in Kompleksni \middle| \sum_{n=0}^{\infty} |x(n)r^{-n}| < \infty \right\}$$

 ovako definirana X(z) naziva se jednostrana z-transformacija

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>apsolutna kovergencija sume garantira i konvergenciju X(z)<sup>3</sup>iz  $\sum_{n=0}^{\infty} |x(n)z^{-n}|$  a uz,  $z = re^{j\omega}$ , za koji suma konvergira, vrijedi  $\sum_{n=0}^{\infty} |x(n)(re^{j\omega})^{-n}| = \sum_{n=0}^{\infty} |x(n)r^{-n}| = \sum_{n=0}^{\infty} |x(n)r^{-n}|$ 



Profesor Branko Jeren

transformacija
Definicija
Područje
konvergencije
z-transformacije
zosnovnih nizova
Svojstva
z-transformacije
Inverzna
z-transformacija
u analizi
u analizi

Samostalni rad studenta

### z-transformacija kauzalnih nizova

- jednostrana z

   transformacija limitirana je samo na kauzalne signale i sustave
- kako je u ovom predmetu većina pozornosti okrenuta kauzalnim signalima i sustavima u nastavku se razmatra uglavnom jednostrana z-transformacija
- sukladno većini literature pod nazivom z–transformacija podrazumijevati će se jednostrana z–transformacija, a u slučaju dvostrane transformacije to će biti posebno istaknuto



Profesor Branko Jeren

Z-

Definicija Područie

Područje konvergencije z–transformaci

z-transformacija osnovnih nizova

Svojstva z–transformacijo Inverzna

z-transformaci z-transformaci u analizi

Samostalni rad studenta

#### z-transformacija osnovnih nizova

$$\mathcal{Z}\{\delta(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} \delta(n)z^{-n} = 1, \quad |z| > 0$$

$$\mathcal{Z}\{\mu(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} \mu(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (z^{-1})^n = \frac{1}{1-z^{-1}} = \frac{z}{z-1},$$

$$za |z| > 1$$

$$\mathcal{Z}\{a^{n}\mu(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} a^{n} z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} = \frac{1}{1 - \left(\frac{z}{a}\right)^{-1}} =$$
$$= \frac{1}{1 - az^{-1}} = \frac{z}{z - a}, \qquad |z| > |a|$$



Profesor Branko Jeren

transformac

Područje konvergencije

z-transformacije z-transformacija osnovnih nizova

Svojstva

z-transformaci

z-transformac u analizi

Samostalni rad studenta

#### z-transformacija osnovnih nizova

$$\begin{split} \mathcal{Z}\{\cos(\omega_0 n)\mu(n)\} &= \sum_{n=0}^{\infty} \cos(\omega_0 n)\mu(n)z^{-n} = \\ &= \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} e^{j\omega_0 n}z^{-n} + \frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty} e^{-j\omega_0 n}z^{-n} = \\ &= \frac{1}{2}\frac{1}{1 - e^{j\omega_0}z^{-1}} + \frac{1}{2}\frac{1}{1 - e^{-j\omega_0}z^{-1}} = \\ &= \frac{1}{2}\frac{1 - e^{-j\omega_0}z^{-1} + 1 - e^{j\omega_0}z^{-1}}{1 - e^{j\omega_0}z^{-1} - e^{-j\omega_0}z^{-1} + z^{-2}} \Rightarrow \end{split}$$

$$\mathcal{Z}\{\cos(\omega_0 n)\mu(n)\} = \frac{1 - z^{-1}\cos(\omega_0)}{1 - 2z^{-1}\cos(\omega_0) + z^{-2}} \qquad |z| > 1$$



Profesor Branko Jeren

ztransformaci

Područje konvergencije

z-transformacija osnovnih nizova

Svojstva z–transformaci

Inverzna z–transformaci

z–transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

## Tablica osnovnih z-transformacija<sup>4</sup>

	x(n)	X(z)
1	$\delta(n)$	1
2	$\delta(n-m)$	$z^{-m}$
3	$\mu(n)$	$\frac{z}{z-1}$
4	$n\mu(n)$	$\frac{z}{(z-1)^2}$
5	$n^2\mu(n)$	$\left \begin{array}{c} \frac{z(z+1)}{(z-1)^3} \end{array}\right $
6	$n^3\mu(n)$	$\frac{z(z^2+4z+1)}{(z-1)^4}$
7	$a^n\mu(n)$	$\left  \begin{array}{c} \underline{z} \\ \overline{z-a} \end{array} \right $
8	$na^n\mu(n)$	$\frac{az}{(z-a)^2}$
9	$n^2 a^n \mu(n)$	$\frac{az(z+a)}{(z-a)^3}$
10	$\frac{\frac{n(n-1)(n-2)\cdots(n-m+1)}{a^m m!}a^n\mu(n)}{a^m m!}$	$\frac{z}{(z-a)^{m+1}}$

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>izvor:B.P. Lathi:Linear Systems and Signals str. 498 = >



Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

transformacija
Definicija
Područje
konvergencije
z–transformacija
z–transformacija

osnovnih nizova Svoistva

z-transformac

z-transformac z-transformac u analizi

Samostalni rad studenta

# Tablica osnovnih z-transformacija<sup>5</sup>

	x(n)	X(z)
11	$\cos(\omega_0 n)\mu(n)$	$\frac{z(z-\cos(\omega_0))}{z^2-2\cos(\omega_0)z+1}$
12	$\sin(\omega_0 n)\mu(n)$	$\frac{\sin(\hat{\omega_0})z'}{z^2-2\cos(\omega_0)z+1}$
13	$a^n \cos(\omega_0 n) \mu(n)$	$\frac{z(z-a\cos(\omega_0))}{z^2-2a\cos(\omega_0)z+a^2}$
14	$a^n \sin(\omega_0 n) \mu(n)$	$\frac{a\sin(\omega_0)z}{z^2-2a\cos(\omega_0)z+a^2}$

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>izvor: A.V.Oppenheim, A. S. Willsky: Signals and Systems str. 655 990



Profesor Branko Jeren

ztransforma

Definicija Područje konvergencije z–transformacije z–transformacije

#### Svojstva z-transformacije

Inverzna z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

#### z-transformacija – linearnost

neka je  $w(n) = ax(n) \pm by(n)$ tada je z-transformacija od w(n)

$$W(z) = aX(z) + bY(z), \qquad \forall z \in \mathcal{PK}(w) \text{ sadrži } \mathcal{PK}(x) \cap \mathcal{PK}(y)$$

područje konvergencije od W(z) mora uključiti područja konvergencije od X(z) i Y(z) linearnost z–transformacije proizlazi iz definicije

$$W(z) = \sum_{n=0}^{\infty} w(n)z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} [ax(n) \pm by(n)]z^{-n} =$$

$$= a\sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n} \pm b\sum_{n=0}^{\infty} y(n)z^{-n} = aX(z) \pm bY(z)$$



Profesor Branko Jeren

transformacij.
Definicija
Područje
konvergencije
z–transformacij
z–transformacij

#### Svojstva z–transformacije

Inverzna z-transformacij z-transformacij u analizi linearnih sustav

Samostalni rad studenta

z-transformacija – pomak unaprijed za j-koraka neka je  $X(z) = \mathcal{Z}\{x(n)\}$  tada je, uz j > 0,

$$\mathcal{Z}\{x(n+j)\} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n+j)z^{-n} = |n+j| = m$$

$$= \sum_{m=j}^{\infty} x(m)z^{-m+j} = z^{j} \sum_{m=j}^{\infty} x(m)z^{-m} =$$

$$= z^{j} \Big[ \underbrace{\sum_{m=j}^{\infty} x(m)z^{-m} + \sum_{m=0}^{j-1} x(m)z^{-m}}_{X(z)} - \sum_{m=0}^{j-1} x(m)z^{-m} \Big] \Rightarrow$$

$$\mathcal{Z}\{x(n+j)\} = z^{j} \Big[X(z) - \sum_{m=0}^{j-1} x(m)z^{-m}\Big]$$

za 
$$j = 1$$
,  $\mathcal{Z}\{x(n+1)\} = zX(z) - zx(0)$   
za  $j = 2$ ,  $\mathcal{Z}\{x(n+2)\} = z^2X(z) - z^2x(0) - zx(1)$ 



Profesor Branko Jeren

ztransformacij Definicija Područje konvergencije z-transformaci

#### Svojstva z–transformacije

Inverzna z-transformacij z-transformacij u analizi linearnih sustav

Samostalni rad studenta

z-transformacija – kašnjenje za j-koraka neka je  $X(z) = \mathcal{Z}\{x(n)\}$  tada je, uz j > 0,

$$\mathcal{Z}\{x(n-j)\} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n-j)z^{-n} = |n-j| = m$$

$$= \sum_{m=-j}^{\infty} x(m)z^{-m-j} = z^{-j} \sum_{m=-j}^{\infty} x(m)z^{-m} =$$

$$= z^{-j} \Big[ \sum_{m=0}^{\infty} x(m)z^{-m} + \sum_{m=-j}^{-1} x(m)z^{-m} \Big] \Rightarrow$$

$$Z\{x(n-j)\} = z^{-j} \Big[X(z) + \sum_{m=-j}^{-1} x(m)z^{-m}\Big]$$

za j = 1 i j = 2 vrijedi

$$\mathcal{Z}\{x(n-1)\} = z^{-1} [X(z) + zx(-1)] = z^{-1}X(z) + x(-1)$$

$$\mathcal{Z}\{x(n-2)\} = z^{-2} [X(z) + zx(-1) + z^2x(-2)] =$$

$$= z^{-2}X(z) + z^{-1}x(-1) + x(-2)$$

2007/2008 Cielina 16. Profesor

Branko Jeren

Svoistva z-transformacije

z-transformacija - konvolucijska sumacija kauzalnih nizova za y(n) = h(n) \* u(n), te  $U(z) = \mathcal{Z}\{u(n)\}\ i\ H(z) = \mathcal{Z}\{h(n)\}$ , vrijedi<sup>6</sup>

$$Y(z) = \mathcal{Z}\{y(n)\} = \mathcal{Z}\{u(n) * h(n)\} =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \left[ \sum_{j=0}^{\infty} u(j)h(n-j) \right] z^{-n} = \sum_{j=0}^{\infty} u(j) \sum_{n=0}^{\infty} h(n-j)z^{-n} =$$

$$= \left| n - j = m \right| = \sum_{j=0}^{\infty} u(j) \sum_{m=-j}^{\infty} h(m)z^{-(m+j)} =$$

$$= \sum_{j=0}^{\infty} u(j)z^{-j} \sum_{m=0}^{\infty} h(m)z^{-m} = U(z)H(z)$$

$$h(n) * u(n) \stackrel{z}{\longleftrightarrow} H(z)U(z)$$

h(m)=0 za m<0

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>pribrajajući nule, konvolucijsku sumaciju kauzalnih nizova  $\sum_{j=0}^n u(j)h(n-j)z^{-n}$  proširujemo u  $\sum_{j=0}^\infty u(j)h(n-j)z^{-n}$  (potreba izvoda).



Profesor Branko Jeren

transformaci

Područje konvergencije z–transformacij z–transformacij

#### Svojstva z–transformacije

Inverzna z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

z—transformacija — množenje s $a^n$ 

neka je  $X(z) = \mathcal{Z}\{x(n)\}$  tada je z-transformacija niza  $y(n) = a^n x(n)$ 

$$Y(z) = \mathcal{Z}\{y(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} a^n x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \left(\frac{z}{a}\right)^{-n} = X\left(\frac{z}{a}\right)$$

slično za  $y(n) = e^{j\omega_0 n} x(n)$  vrijedi

$$Y(z) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{j\omega_0 n} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n) \left(\frac{z}{e^{j\omega_0}}\right)^{-n} = X\left(ze^{-j\omega_0}\right)$$

korištenjem gornjeg svojstva proizlazi i svojstvo **modulacije** za  $y(n) = x(n)cos(\omega_0 n) = x(n)\frac{1}{2}[e^{-j\omega_0 n} + e^{j\omega_0 n}]$  slijedi

$$\mathcal{Z}\{x(n)cos(\omega_0 n)\} = \frac{1}{2}[X(ze^{j\omega_0}) + X(ze^{-j\omega_0})]$$



Profesor Branko Jeren

Ztransform

Definicija Područje konvergencije

konvergencije z–transformacije z–transformacije

#### Svojstva z–transformacije

Inverzna z-transformacij z-transformacij u analizi linearnih sustav

Samostalni rad studenta

#### z-transformacija – množenje s *n*

neka je  $X(z)=\mathcal{Z}\{x(n)\}$  tada je z–transformacija niza y(n)=nx(n)

$$Y(z) = \mathcal{Z}\{nx(n)\} = z\sum_{n=0}^{\infty} x(n)\underbrace{nz^{-n-1}}_{-\frac{d}{dz}z^{-n}} = z\sum_{n=0}^{\infty} x(n)\left(-\frac{d}{dz}z^{-n}\right) =$$

$$=-z\frac{d}{dz}\Big(\sum_{n=0}^{\infty}x(n)z^{-n}\Big)=-z\frac{d}{dz}X(z)$$

množenje s *n<sup>j</sup>* 

$$\mathcal{Z}\{n^{j}x(n)\} = \left(-z\frac{d}{dz}\right)^{j}X(z)$$



Profesor Branko Jeren

ztransform

Definicija Područje konvergencije z–transformacij z–transformacij

#### Svojstva z–transformacije

Inverzna z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustav

Samostalni rad studenta

## z-transformacija – početna vrijednost niza

neka je  $X(z) = \mathcal{Z}\{x(n)\}$  početna vrijednost niza izračunava se iz

$$X(z) = \mathcal{Z}\{x(n)\} = \sum_{n=0}^{\infty} x(n)z^{-n} = x(0) + \sum_{n=1}^{\infty} x(n)z^{-n}$$
$$\Rightarrow x(0) = \lim_{z \to \infty} X(z)$$



Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

ztransformac

Definicija Područje konvergencije z–transformacij z–transformacij

#### Svojstva z–transformacije

Inverzna z-transformacij z-transformacij u analizi linearnih sustav

Samostalni rad studenta

# z-transformacija – konačna vrijednost niza

neka je  $X(z)=\mathcal{Z}\{x(n)\}$  konačna vrijednost niza izračunava se iz

$$\lim_{n\to\infty} x(n) = \lim_{z\to 1} (1-z^{-1}) X(z), \text{ ako postoji } x(\infty)$$

limes za  $z \to 1$  ima smisla samo kada je točka z=1 locirana unutar područja konvergencije X(z)

dokaz započinjemo z-transformacijom niza  $\left[x(n)-x(n-1)\right]$ 

$$\mathcal{Z}\{x(n) - x(n-1)\} = X(z) - z^{-1}X(z) - x(-1) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} [x(n) - x(n-1)]z^{-n}$$

$$(1-z^{-1})X(z)-x(-1)=\lim_{N\to\infty}\sum_{n=0}^{N}[x(n)-x(n-1)]z^{-n}$$



Profesor Branko Jeren

Definicija
Područje
konvergencije
z-transformacij
zosnovnih nizove

#### Svojstva z–transformacije

Inverzna z-transformacij z-transformacij u analizi linearnih sustav

Samostalni rad studenta

# z-transformacija – konačna vrijednost niza uzmimo limes za $z \rightarrow 1$

$$\lim_{z \to 1} [(1-z^{-1})X(z)] - x(-1) = \lim_{z \to 1} \lim_{N \to \infty} \sum_{n=0}^{N} [x(n) - x(n-1)]z^{-n} =$$

$$= \lim_{N \to \infty} \lim_{z \to 1} \sum_{n=0}^{N} [x(n) - x(n-1)]z^{-n} =$$

$$= \lim_{N \to \infty} \sum_{n=0}^{N} [x(n) - x(n-1)] =$$

$$= \lim_{N \to \infty} [x(0) - x(-1) + x(1) - x(0) + x(2) - x(1) + \dots] =$$

$$= -x(-1) + \lim_{N \to \infty} x(N)$$

 $\lim_{z \to 1} (1 - z^{-1}) X(z) = \lim_{N \to \infty} x(N)$ 



Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

2007/2008

transformac

Područje konvergencije z–transformacij z–transformacij osnovnih nizova Svojstva

Inverzna z–transformacija z–transformacija u analizi

Samostalni rad studenta

# Inverzna z-transformacija – integralom po zatvorenoj krivulji

inverzna z–transformacija je dana kao

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

gdje je integral po zatvorenoj krivulji C koja zatvara ishodište i leži unutar područja konvergencije X(z)

 integral se izračunava primjenom Cauchy-evog teorema o reziduumima koji kazuje kako je integral, u pozitivnom smjeru duž zatvorene krivulje C, koja obuhvaća konačno izoliranih singularnih točaka (polova) jednak sumi residuuma u obuhvaćenim singularnim točkama, dakle,

$$x(n) = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z) z^{n-1} dz = \sum_{m=1}^n Res_m [X(z) z^{n-1}]$$

$$Res_m[X(z)z^{n-1}] = \lim_{z \to z_m} [X(z)z^{n-1}(z-z_m)]$$



Profesor Branko Jeren

ztransforma

Definicija Područje konvergencije z–transformaciji z–transformaciji osnovnih nizova Svojstva

Inverzna z–transformacija z–transformacija

Samostalni rad studenta

### Inverzna z-transformacija - drugi postupci

- inverzna z-transformacija, integralom po zatvorenoj krivulji, navedena je ovdje zbog cjelovitosti izlaganja
- u nastavku su daju dva jednostavna postupka inverzne z-transformacije koji ne traže dublje poznavanje teorije funkcije kompleksne varijable
- prvo se razmatra inverzna z–transformacija postupkom razvoja u red
- ullet pokazano je kako je z-transformacija kauzalnog niza x(n)

$$X(z) = x(0) + x(1)z^{-1} + x(2)z^{-2} + x(3)z^{-3} + \dots$$

pa je inverzna z–transformacija

$$x(n) = x(0)\delta(n) + x(1)\delta(n-1) + x(2)\delta(n-2) + x(3)\delta(n-3) + \dots$$



Profesor Branko Jeren

transformaci

Područje konvergencije z-transformacije z-transformacija osnovnih nizova Svojstva z-transformacije

#### Inverzna z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

## Inverzna z-transformacija – razvojem u red

- ullet kad je X(z) razlomljena racionalna funkcija, koeficijente prethodnog reda možemo dobiti jednostavnim dijeljenjem brojnika s nazivnikom
- ovo će biti ilustrirano narednim primjerom
- pokazano je da je  $X(z) = \mathcal{Z}\{(0.75)^n \mu(n)\} = \frac{1}{1 0.75z^{-1}}$
- razvoj u red za X(z) postižemo dijeljenjem brojnika s nazivnikom

$$(1+0\cdot z^{-1}): (1-0.75z^{-1}) = 1+0.75z^{-1} + (0.75)^{2}z^{-2} + (0.75)^{3}z^{-3} + \dots$$

$$\frac{\pm 1 \mp 0.75z^{-1}}{0.75z^{-1}}$$

$$\frac{\pm 0.75z^{-1} \mp (0.75)^{2}z^{-2}}{(0.75)^{2}z^{-2}}$$

$$\pm (0.75)^{2}z^{-2} \mp (0.75)^{3}z^{-3}$$

pa prepoznajemo

$$x(n) = \delta(n) + 0.75\delta(n-1) + (0.75)^{2}\delta(n-2) + (0.75)^{3}\delta(n-3) + \dots = (0.75)^{n}\mu(n)$$



Profesor Branko Jeren

transforma

Definicija Područje konvergencije z–transformacij z–transformacij osnovnih nizova Svojstva

Inverzna z–transformacija z–transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

### Inverzna z-transformacija - razvojem u red

- prijenosna funkcija H(z) predstavlja z-transformaciju impulsnog odziva h(n), sukladno tomu impulsni odziv je inverzna z-transformacija prijenosne funkcije
- za zadanu prijenosnu funkciju nalazimo impulsni odziv

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}{H(z)} = \mathcal{Z}^{-1}\left{\frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 0.8\sqrt{2}z^{-1} + 0.64z^{-2}}\right}$$

• inverznu z-transformaciju provodimo dijeljenjem brojnika H(z) s njezinim nazivnikom

$$(1+2z^{-1}): (1-1.1314z^{-1}+0.64z^{-2}) = 1+3.1314z^{-1}+2.9028z^{-2}+\dots$$

$$\frac{-1+1.1314z^{-1}-0.64z^{-2}}{+3.1314z^{-1}-0.64z^{-2}}$$

$$\frac{-3.1314z^{-1}+3.5428z^{-2}-2.0041z^{-3}}{+2.9028z^{-2}-2.0041z^{-3}}$$



Profesor Branko Jeren

transforma

Definicija Područje konvergencije z-transformacij z-transformacij osnovnih nizova

Inverzna z–transformacija z–transformacija

Samostalni rad studenta

#### Inverzna z-transformacija - razvojem u red

pa je inverzna transformacija

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}\{1 + 3.1314z^{-1} + 2.9028z^{-2} + \ldots\}$$

$$h(n) = \delta(n) + 3.1314\delta(n-1) + 2.9028\delta(n-2) + \dots$$

- ovim postupkom određivanja inverzne z-transformacije, moguće je brzo i jednostavno odrediti nekoliko prvih uzoraka signala,
- međutim ovdje je, iz poznatih uzoraka, teško prepoznati kompaktni izraz za impulsni odziv

$$h(n) = 4.6444(0.8)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - 1.3538\right)\mu(n)$$

i on će biti određen postupkom rastava na parcijalne razlomke



2007/2008 Cjelina 16. Profesor

Branko Jeren

transforma

Definicija Područje konvergencije z–transformaci

osnovnih nizova Svojstva z–transformacije

Inverzna z–transformacija z–transformacija u analizi

Samostalni rad studenta

### Inverzna z-transformacija – rastavom na parcijalne razlomke

• metoda inverzne z-transformacije rastavom na parcijalne razlomke temelji se na prikazu funkcije X(z) kao

$$X(z) = \alpha_1 X_1(z) + \alpha_2 X_2(z) + \dots + \alpha_K X_K(z)$$

gdje su  $X_1(z), X_2(z), \dots X_K(z)$  izrazi čije su inverzne transformacije  $x_1(n), x_2(n), \dots x_K(n)$  dane u tablici osnovnih z-transformacija

• ako je moguća takva dekompozicija tada se, korištenjem linearnosti, određuje inverzna transformacija X(z) kao

$$x(n) = \alpha_1 x_1(n) + \alpha_2 x_2(n) + \ldots + \alpha_K x_K(n)$$



Profesor Branko Jeren

transformac

Područje konvergencije z-transformacije z-transformaciji osnovnih nizova Svojstva z-transformacije

#### Inverzna z-transformacija z-transformacija u analizi

u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

### Inverzna z-transformacija – rastavom na parcijalne razlomke

• X(z) je razlomljena racionalna funkcija i možemo je prikazati kao

$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \ldots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_N z^{-N}}$$

- za N > M radi se o pravoj razlomljenoj racionalnoj funkciji koju je moguće rastaviti na parcijalne razlomke
- u slučaju  $M \geq N$ , X(z) je neprava razlomljena racionalna funkcija, pa je prije rastave na parcijalne razlomke potrebno, dijeljenjem brojnika i nazivnika, X(z) dovesti u oblik

$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = c_0 + c_1 z^{-1} + \ldots + c_{M-N} z^{-(M-N)} + \underbrace{\frac{B_1(z)}{A(z)}}_{\substack{\text{prava} \\ \text{razlomliena}}}$$



Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

transformaci

Područje konvergencije z–transformacije z–transformacija osnovnih nizova Svojstva

Inverzna z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

#### Inverzna z-transformacija – primjer

• neka je z-transformacija kauzalnog niza x(n), neprava razlomljena racionalna funkcija X(z)

$$X(z) = \frac{1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3}}{1 - 0.2z^{-1} - 0.06z^{-2}}$$

- u ovom primjeru je M>N pa je, prije rastava na parcijalne razlomke, potrebno modificirati X(z) na sumu polinoma i prave funkcije
- to se postiže dijeljenjem polinoma u brojniku s polinomom u nazivniku<sup>7</sup>
- dakle iz  $(4z^{-3} + 3z^{-2} + 2z^{-1} + 1) : (-0.06z^{-2} 0.2z^{-1} + 1)$  slijedi

$$X(z) = -66.6667z^{-1} + 61.1111 + \frac{-60.1111 + 74.7777z^{-1}}{1 - 0.2z^{-1} - 0.06z^{-2}}$$

 $<sup>^{7}</sup>$ u obrnutom poretku kako bi eliminirali članove z  $\stackrel{-2}{>}$  i z  $\stackrel{-3}{>}$   $\stackrel{-2}{>}$   $\stackrel{-2}{>}$   $\stackrel{-2}{>}$ 



Profesor Branko Jeren

ztransforma

Područje konvergencije z–transformacij z–transformacij

osnovnih nizova Svojstva z–transformacij Inverzna

z–transformacija z–transformacija u analizi

Samostalni rad studenta

#### Inverzna z-transformacija - primjer

• X(z) je priređen za rastav na parcijalne razlomke

$$X(z) = 61.1111 - 66.6667z^{-1} + \underbrace{\frac{-60.1111 + 74.7777z^{-1}}{1 - 0.2z^{-1} - 0.06z^{-2}}}_{\text{prava funkcija}}$$

 rastavom na parcijalne razlomke, što se pokazuje na narednim prikaznicama, slijedi

$$X(z) = 61.1111 - 66.6667z^{-1} + \frac{113.4889}{1 - 0.3z^{-1}} + \frac{-173.6}{1 + 0.2z^{-1}}$$

pa je, uvidom u tablice, inverzna z-transformacija

$$x(n) = 61.1111\delta(n) - 66.6667\delta(n-1) + + 113.4889(0.3)^n \mu(n) - 173.6(-0.2)^n \mu(n)$$



2007/2008 Cielina 16. Profesor

Branko Jeren

#### Inverzna z-transformaciia

#### Inverzna z-transformacija - primjer

 provieru dobivenog rezultata možemo učiniti postupkom dijeljenjem brojnika i nazivnika X(z), dakle,

$$(1+2z^{-1}+3z^{-2}+4z^{-3}):(1-0.1z^{-1}-0.06z^{-2})=$$

$$=1+2.1z^{-1}+3.27z^{-2}+4.453z^{-3}+0.6415z^{-4}+\dots$$

pa je inverzna transformacija

$$x(n) = \delta(n) + 2.1\delta(n-1) + 3.27\delta(n-2) + + 4.453\delta(n-3) + 0.6415\delta(n-4) + \dots$$

dok 
$$x(n) = 61.1111\delta(n) - 66.6667\delta(n-1) +$$
  
  $+ 113.4889(0.3)^n \mu(n) - 173.6(-0.2)^n \mu(n)$ 

za  $n = 0, 1, 2, 3, 4, \dots$  daje uzorke 1, 2.1, 3.27, 4.453, 0.6415, ...



2007/2008 Cjelina 16.

Profesor Branko Jeren

transforma

Definicija Područje konvergencije z–transformacije z–transformacije osnovnih nizova

Inverzna z-transformacija z-transformacija u analizi

Samostalni rad studenta

### Inverzna z-transformacija – rastavom na parcijalne razlomke

ullet neka je X(z) prava razlomljena racionalna funkcija

$$X(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \ldots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_N z^{-N}}$$

gdje je N > M

• postupak rastava na parcijalne razlomke pojednostavljujemo množenjem brojnika i nazivnika sa  $z^N$ , što rezultira u

$$X(z) = \frac{B_1(z)}{A_1(z)} = \frac{b_0 z^N + b_1 z^{N-1} + \ldots + b_M z^{N-M}}{z^N + a_1 z^{N-1} + \ldots + a_N}$$



Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

2007/2008

transformaci

Područje konvergencije z–transformacija osnovnih nizova

Inverzna z–transformacija z–transformacija

Samostalni rad studenta

### Inverzna z-transformacija – rastavom na parcijalne razlomke

ullet ovako transformiranu X(z) možemo prikazati kao

$$X(z) = \frac{B_1(z)}{A_1(z)} = \frac{B_1(z)}{(z - p_1)(z - p_2) \cdots (z - p_N)}$$

 inverznu z-transformaciju rastavom na parcijalne razlomke započinjemo definiranjem pomoćne funkcije

$$X_1(z)=\frac{X(z)}{z}$$

• funkcija  $X_1(z)$  se rastavlja na parcijalne razlomke, pa za jednostruke polove slijedi

$$X_1(z) = \frac{c_1}{z - p_1} + \frac{c_2}{z - p_2} + \ldots + \frac{c_N}{z - p_N}$$



Profesor Branko Jeren

ztransforma

Područje konvergencije z–transformacij z–transformacij

Svojstva z–transformacij

Inverzna z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

### Inverzna z-transformacija – rastavom na parcijalne razlomke

• X(z) je tada

$$X(z) = zX_1(z) = \frac{c_1z}{z - p_1} + \frac{c_2z}{z - p_2} + \ldots + \frac{c_Nz}{z - p_N}$$

pri čemu se koeficijenti  $c_i, i=1,2,\ldots,N$  određuju iz

$$c_i = \lim_{z \to p_i} \left\{ (z - p_i) \frac{X(z)}{z} \right\}$$

• iz tablice z-transformacija prepoznaju se članovi x(n)

$$x(n) = [c_1(p_1)^n + c_2(p_2)^n + \ldots + c_N(p_N)^n]\mu(n)$$



Signali i sustavi školska godina 2007/2008 Cielina 16.

Profesor Branko Jeren

transformac Definicija

Područje konvergencije z–transformacij z–transformacij osnovnih nizova

z–transformaci Inverzna

z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

## Inverzna z-transformacija – rastavom na parcijalne razlomke

• za višestruke polove X(z) je

$$X(z) = \frac{B_1(z)}{A_1(z)} = \frac{B_1(z)}{(z - p_1)^r (z - p_{r+1}) \cdots (z - p_N)}$$

• pomoćna funkcija  $X_1(z)$  se rastavlja na parcijalne razlomke oblika

$$X_1(z) = \frac{c_{11}}{z - p_1} + \frac{c_{12}}{(z - p_1)^2} + \dots + \frac{c_{1r}}{(z - p_1)^r} + \frac{c_{r+1}}{z - p_{r+1}} + \frac{c_{r+2}}{z - p_{r+2}} + \dots + \frac{c_N}{z - p_N}$$

$$c_{1j} = \frac{1}{(r-j)!} \lim_{z \to p_1} \left\{ \frac{d^{r-j}}{dz^{r-j}} (z - p_1)^r \frac{X(z)}{z} \right\}$$
(1)

$$c_i = \lim_{z \to p_i} \left\{ (z - p_i) \frac{X(z)}{z} \right\} \tag{2}$$



Signali i sustavi školska godina 2007/2008 Cielina 16.

Profesor Branko Jeren

Ztransforma

transformaci

Područje
konvergencije
z–transformaciji
z–transformaciji
osnovnih nizova

z-transformacij Inverzna z-transformacij

z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

### Inverzna z-transformacija – rastavom na parcijalne razlomke

za zadanu prijenosnu funkciju nalazimo impulsni odziv

$$h(n) = \mathcal{Z}^{-1}\{H(z)\} = \mathcal{Z}^{-1}\left\{\frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 0.8\sqrt{2}z^{-1} + 0.64z^{-2}}\right\}$$

$$H(z) = \frac{1 + 2z^{-1}}{1 - 0.8\sqrt{2}z^{-1} + 0.64z^{-2}} = \frac{z^2 + 2z}{z^2 - 0.8\sqrt{2}z + 0.64}$$
$$p_{1,2} = 0.5657 \pm j0.5657 = 0.8e^{\pm j\frac{\pi}{4}}$$

 inverznu z–transformaciju provodimo rastavom na parcijalne razlomke

$$\frac{H(z)}{z} = \frac{c_1}{z - p_1} + \frac{c_2}{z - p_2}$$



Profesor Branko Jeren

transformac

Definicia

Područje konvergencije z–transformaci

osnovnih nizi Svojstva

z-transforma Inverzna

z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

### Inverzna z-transformacija – rastavom na parcijalne razlomke

• konstante  $c_1$  i  $c_2$  određujemo iz

$$c_{1} = \lim_{z \to p_{1}} \left\{ (z - p_{1}) \frac{H(z)}{z} \right\} = \lim_{z \to p_{1}} \left\{ (z - p_{1}) \frac{z + 2}{(z - p_{1})(z - p_{2})} \right\} =$$

$$= \frac{p_{1} + 2}{p_{1} - p_{2}} = \frac{0.5657 + j0.5657 + 2}{0.5657 + j0.5657 - 0.5657 + j0.5657} =$$

$$= 0.5000 - j2.2678 = 2.3222e^{-j1.3538}$$

$$c_{2} = \lim_{z \to p_{2}} \left\{ (z - p_{2}) \frac{H(z)}{z} \right\} = \lim_{z \to p_{2}} \left\{ (z - p_{2}) \frac{z + 2}{(z - p_{1})(z - p_{2})} \right\} =$$

$$= \frac{p_{2} + 2}{p_{2} - p_{1}} = \frac{0.5657 - j0.5657 + 2}{0.5657 - j0.5657 - 0.5657 - j0.5657} =$$

$$= 0.5000 + j2.2678 = 2.3222e^{j1.3538}$$



Profesor Branko Jeren

transfo

Definicija
Područje
konvergencije
z–transformacijo
z–transformacijo

Svojstva z–transformac Inverzna

z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

### Inverzna z-transformacija – rastavom na parcijalne razlomke

H(z) pišemo kao

$$H(z) = \frac{c_1 z}{z - p_1} + \frac{c_2 z}{z - p_2}$$

i inverzna z-transformacija je

$$h(n) = c_1(p_1)^n \mu(n) + c_2(p_2)^n \mu(n) =$$

$$= 2.3222e^{-j1.3538}(0.8)^n e^{j\frac{\pi}{4}n} + 2.3222e^{j1.3538}(0.8)^n e^{-j\frac{\pi}{4}n} =$$

$$= 4.6444(0.8)^n \cos\left(\frac{\pi}{4}n - 1.3538\right)\mu(n)$$



Profesor Branko Jeren

ztransforma

Područje konvergencije z–transformacije z–transformacija osnovnih nizova Svojstva z–transformacije Inverzna

z-transformacija u analizi

linearnih sustava Samostalni rad studenta

## Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava - prijenosna funkcija

- određuje se prijenosna funkcija mirnog, linearnog, vremenski diskretnog sustava, primjenom z–transformacije
- neka je sustav opisan jednadžbom diferencija

$$y(n)+a_1y(n-1)+\ldots+a_{N-1}y(n-N+1)+a_Ny(n-N) = b_0u(n)+b_1u(n-1)+\ldots+b_{M-1}u(n-M+1)+b_Mu(n-M)$$

• z–transformacijom ove jednadžbe, uzimajući u obzir da je sustav miran, i koristeći svojstvo  $\mathcal{Z}\{x(n-j)\}=z^{-j}X(z)$  slijedi

$$Y(z) + a_1 z^{-1} Y(z) + \ldots + a_{N-1} z^{-N+1} Y(z) + a_N z^{-N} Y(z) =$$

$$= b_0 U(z) + b_1 z^{-1} U(z) + \ldots + b_{M-1} z^{-(M-1)} U(z) + b_M z^{-M} U(z)$$



Cielina 16. Profesor Branko Jeren

z-transformaciia u analizi linearnih sustava

Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava prijenosna funkcija

$$[1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_{N-1} z^{-N+1} + a_N z^{-N}] Y(z) =$$

$$= [b_0 + b_1 z^{-1} + \ldots + b_{M-1} z^{-(M-1)} + b_M z^{-M}] U(z)$$

odnosno

$$Y(z) = \underbrace{\frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \ldots + b_{M-1} z^{-(M-1)} + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_{N-1} z^{-(N-1)} + a_N z^{-N}}_{H(z)} U(z)$$

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + \ldots + b_M z^{-M}}{1 + a_1 z^{-1} + \ldots + a_N z^{-N}} = \frac{b_0 z^N + b_1 z^{N-1} + \ldots + b_M}{z^N + a_1 z^{N-1} + \ldots + a_N}$$

pa, prijenosnu funkciju diskretnog sustava, H(z), definiramo kao omjer z-transformacija odziva i pobude, uz početne uvjete jednake nuli

$$H(z) = \frac{Y(z)}{U(z)} = \frac{\mathcal{Z}\{y(n)\}}{\mathcal{Z}\{u(n)\}_{n}}$$



Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

transformacija

Definicija
Područje
konvergencije
z-transformacije
z-transformacija
osnovnih nizova
Svojstva
z-transformacije
Inverzna
z-transformacija
z-transformacija

Samostalni rad studenta

u analizi

#### Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava

 primjenu z-transformacije u analizi linearnih sustava ilustriramo primjerom sustava opisanog jednadžbom diferencija

$$y(n) - 0.8\sqrt{2}y(n-1) + 0.64y(n-2) = u(n)$$

- sustav je pobuđen s  $u(n)=-0.2cos(\frac{\pi}{8}n)\cdot \mu(n)$  a početni uvjeti su y(-1)=-2 i y(-2)=-1.5
- z–transformacija jednadžbe je

$$Y(z) - 0.8\sqrt{2}[z^{-1}Y(z) + y(-1)] + + 0.64[z^{-2}Y(z) + z^{-1}y(-1) + y(-2)] = U(z)$$

$$[1 - 0.8\sqrt{2}z^{-1} + 0.64z^{-2}]Y(z) =$$

$$= U(z) + 0.8\sqrt{2}y(-1) - 0.64y(-2) - 0.64y(-1)z^{-1}$$



Profesor Branko Jeren

ztransform

Definicija Područje konvergencije z–transformacij z–transformacij

Svojstva z–transformaci Inverzna

z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

#### Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava

$$Y(z) = \underbrace{\frac{1}{1 - 0.8\sqrt{2}z^{-1} + 0.64z^{-2}}}_{\text{odziv mirnog sustava}} U(z) + \underbrace{\frac{1}{1 - 0.8\sqrt{2}y(-1) - 0.64y(-2) - 0.64y(-1)z^{-1}}}_{\text{odziv nepobudenog sustava}}$$

množenjem brojnika i nazivnika sa  $z^2$  i uvrštenjem zadanih početnih uvjeta y(-1)=-2 i y(-2)=-1.5

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 0.8\sqrt{2}z + 0.64}U(z) + \frac{-1.3028z^2 + 1.28z}{z^2 - 0.8\sqrt{2}z + 0.64}$$



Profesor Branko Jeren

transform

Područje konvergencije z–transformacije z–transformacija osnovnih nizova Svojstva

Svojstva z–transformacije Inverzna z–transformacija z–transformacija

z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

#### Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava

• z-transformacija zadane pobude  $u(n) = -0.2cos(\frac{\pi}{8}n) \cdot \mu(n)$  je (iz tablice z-transformacija)

$$U(z) = \frac{-0.2z(z - \cos(\frac{\pi}{8}))}{z^2 - 2\cos(\frac{\pi}{8})z + 1}$$

pa je totalni odziv sustava na danu pobudu

$$Y(z) = \frac{-0.2z^{3}(z - \cos(\frac{\pi}{8}))}{(z^{2} - 0.8\sqrt{2}z + 0.64)(z^{2} - 2\cos(\frac{\pi}{8})z + 1)} + \frac{-1.3028z^{2} + 1.28z}{z^{2} - 0.8\sqrt{2}z + 0.64}$$



Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

2007/2008

ztransformaci Definicija Područje konvergencije

z–transformacij osnovnih nizova Svojstva z–transformacij Inverzna

z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

#### Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava

$$Y(z) = \underbrace{\frac{-0.2z^{3}(z - \cos(\frac{\pi}{8}))}{(z - 0.8e^{j\frac{\pi}{4}})(z - 0.8e^{-j\frac{\pi}{4}})(z - e^{j\frac{\pi}{8}})(z - e^{-j\frac{\pi}{8}})}_{Y_{m}(z)} + \underbrace{\frac{-1.3028z^{2} + 1.28z}{(z - 0.8e^{j\frac{\pi}{4}})(z - 0.8e^{-j\frac{\pi}{4}})}_{Y_{0}(z)}}$$

rastavom na parcijalne razlomke

$$Y(z) = \frac{c_1 z}{z - 0.8e^{j\frac{\pi}{4}}} + \frac{c_2 z}{z - 0.8e^{-j\frac{\pi}{4}}} + \frac{c_3 z}{z - e^{j\frac{\pi}{8}}} + \frac{c_4 z}{z - e^{-j\frac{\pi}{8}}} + \frac{c_4 z}{z - e^{-j\frac{\pi}{8}}} + \frac{c_5 z}{z - 0.8e^{j\frac{\pi}{4}}} + \frac{c_6 z}{z - 0.8e^{-j\frac{\pi}{4}}}$$



Profesor Branko Jeren

ztransforma

Definicija
Područje
konvergencije
z–transformacije
z–transformacije
osnovnih nizova

z-transformacije Inverzna z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

#### Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava

 inverznom z–transformacijom će totalni odziv, u vremenskoj domeni, biti

$$y(n) = \left[c_1(0.8)^n e^{j\frac{\pi}{4}n} + c_2(0.8)^n e^{-j\frac{\pi}{4}n} + c_3 e^{j\frac{\pi}{8}n} + c_4 e^{-j\frac{\pi}{8}n}\right] \mu(n) + \left[c_5(0.8)^n e^{j\frac{\pi}{4}n} + c_6(0.8)^n e^{-j\frac{\pi}{4}n}\right] \mu(n)$$

•  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $c_3$  i  $c_4$  određujemo iz  $\frac{Y_m(z)}{z}$ , a  $c_5$  i  $c_6$  iz  $\frac{Y_0(z)}{z}$   $c_1 = \lim_{z \to 0.8e^{j\frac{\pi}{4}}} \left\{ \underbrace{(z - 0.8e^{j\frac{\pi}{4}})}_{(z - 0.8e^{j\frac{\pi}{4}})} \underbrace{(z - 0.8e^{-j\frac{\pi}{4}})(z - e^{j\frac{\pi}{8}})(z - e^{-j\frac{\pi}{8}})}_{(z - 0.8e^{-j\frac{\pi}{4}})} \right\}$ 

$$c_1 = 0.1858e^{j0.6757}$$

$$c_5 = \lim_{z \to 0.8e^{j\frac{\pi}{4}}} \left\{ \underbrace{(z - 0.8e^{j\frac{\pi}{4}}) \frac{-1.3028z + 1.28}{(z - 0.8e^{j\frac{\pi}{4}})(z - 0.8e^{-j\frac{\pi}{4}})}} \right\} = 0.8091e^{-j2.5066}$$



2007/2008 Cjelina 16.

Profesor Branko Jeren

ztransformac

Definicija
Područje
konvergencije
z–transformacija
z–transformacija
osnovnih nizova

Svojstva z–transformaci

Inverzna z–transformacii

z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

#### Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava

 $c_1 = 0.1858e^{j0.6757}$ 

 $c_2 = 0.1858e^{-j0.6757}$ 

 $c_3 = 0.2452e^{-j3.0935} = -0.2452e^{j0.04809}$ 

 $c_4 = 0.2452e^{j0.3.0935} = -0.2452e^{-j0.04809}$ 

 $c_5 = 0.8091e^{-j2.5066}$ 

 $c_6 = 0.8091e^{j2.5066}$ 



Profesor Branko Jeren

Z-

Definicija Područje

konvergencije z–transformacij z–transformacij osnovnih nizova

Svojstva z–transformac

Inverzna z–transformaci

z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

#### Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava

$$y_m(n) = \left[0.1858e^{j0.6757}(0.8)^n e^{j\frac{\pi}{4}n} + 0.1858e^{-j0.6757}(0.8)^n e^{-j\frac{\pi}{4}n} - 0.2452e^{j0.04809}e^{j\frac{\pi}{8}n} - 0.2452e^{-j0.04809}e^{-j\frac{\pi}{8}n}\right]\mu(n)$$

$$y_0(n) = \left[0.8091e^{-j2.5066}(0.8)^n e^{j\frac{\pi}{4}n} + 0.8091e^{j2.5066}(0.8)^n e^{-j\frac{\pi}{4}n}\right] \mu(n)$$

$$y(n) = y_0(n) + y_m(n)$$
  

$$y(n) = 1.6182 \cdot 0.8^n \cos(\frac{\pi}{4}n - 2.5066)\mu(n) +$$

odziv nepobuđenog sustava

$$+0.3716 \cdot 0.8^{n} cos(\frac{\pi}{4}n + 0.6759)\mu(n) - 0.4904 cos(\frac{\pi}{8}n + 0.04809)\mu(n)$$

odziv mirnog sustava



Profesor Branko Jeren

transformaci Definicija

Područje konvergencije z–transformacije z–transformacija osnovnih nizova

Svojstva z–transformacije Inverzna z–transformacija z–transformacija

linearnih sustava Samostalni rad studenta

u analizi

#### Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava

analiziran je odziv diskretnog sustava opisanog jednadžbom diferencija

$$y(n) - 0.8\sqrt{2}y(n-1) + 0.64y(n-2) = u(n)$$

- sustav je bio pobuđen s  $u(n) = -0.2cos(\frac{\pi}{8}n) \cdot \mu(n)$  a početni su uvjeti bili y(-1) = -2 i y(-2) = -1.5
- učinimo li pomak u vremenu za dva koraka, supstitucijom n=n+2, dobivamo jednadžbu diferencija oblika

$$y(n+2) - 0.8\sqrt{2}y(n+1) + 0.64y(n) = u(n+2)$$
 (3)

- ova jednadžba opisuje isti sustav i na zadanu pobudu  $u(n) = -0.2cos(\frac{\pi}{8}n) \cdot \mu(n)$ , daje isti odziv
- u izračunu odziva potrebno je poznavati početne uvjete y(0) i y(1), i njih je potrebno odrediti iz zadanih početnih uvjeta y(-1) = -2 i y(-2) = -1.5



Profesor Branko Jeren

ztransform

transformacija
Definicija
Područje
konvergencije
z–transformacije
z–transformacije
osnovnih nizova
Svojstva
z–transformacije

z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

#### Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava

• iz

$$y(n+2) - 0.8\sqrt{2}y(n+1) + 0.64y(n) = u(n+2)$$

za n = -2 slijedi,

$$y(0)-0.8\sqrt{2}y(-1)+0.64y(-2) = \underbrace{u(0)}_{-0.2} \Rightarrow y(0) = -1.5028$$

za 
$$n=-1$$
 je

$$y(1)-0.8\sqrt{2}y(0)+0.64y(-1) = \underbrace{u(1)}_{-0.1848} \Rightarrow y(1) = -0.6050$$



Profesor Branko Jeren

transformaci
Definicija
Područje
konvergencije
z-transformac
osnovnih nizo

Svojstva z-transformaciji Inverzna

z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

#### Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava

• z-transformacija jednadžbe je

$$z^{2}Y(z) - z^{2}y(0) - zy(1) - z0.8\sqrt{2}Y(z) + z0.8\sqrt{2}y(0) +$$

$$+ 0.64Y(z) = z^{2}U(z) - z^{2}u(0) - zu(1)$$

$$[z^{2} - 0.8\sqrt{2}z + 0.64]Y(z) =$$

$$= z^{2}U(z) - z^{2}u(0) - zu(1) + z^{2}y(0) + zy(1) - z0.8\sqrt{2}y(0)$$

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 0.8\sqrt{2}z + 0.64} U(z) +$$

$$+ \frac{-z^2 u(0) - zu(1) + z^2 y(0) + zy(1) - z0.8\sqrt{2}y(0)}{z^2 - 0.8\sqrt{2}z + 0.64}$$



Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

2007/2008

transformac

Područje konvergencije z–transformacije z–transformacija osnovnih nizova Svojstva z–transformacije

Inverzna z-transformacija z-transformacija u analizi linearnih sustava

Samostalni rad studenta

#### Primjena z-transformacije u analizi linearnih sustava

• uvrštenjem izračunatih y(0)=-1.5028 i y(1)=-0.6050 slijedi

$$Y(z) = \frac{z^2}{z^2 - 0.8\sqrt{2}z + 0.64}U(z) + \frac{-1.3028z^2 + 1.28z}{z^2 - 0.8\sqrt{2}z + 0.64}$$

što je identično prije izvedenoj z–transformaciji totalnog odziva



Profesor Branko Jeren

ztransforma

Samostalni

rad studen

primjene z-transformacije u analizi linearnih sustava

Primjer inverzne

### Primjeri primjene z-transformacije u analizi linearnih sustava

izračunava se odziv sustava za generiranje jeke opisanog jednadžbom

$$y(n) - 0.6y(n-4) = u(n), \qquad n \in Cjelobrojni$$

na pobudu

$$u(n) = \begin{cases} 0 & \text{za } n < 0 \\ 1 & \text{za } n = 0, 1 \\ 0 & \text{za } n > 1 \end{cases}$$

neka je sustav miran dakle

$$y(-1) = y(-2) = y(-3) = y(-4) = 0$$



Profesor Branko Jeren

ztransforma

Samostalni rad student

Primjeri primjene z–transformacije u analizi

u analizi linearnih sustava Primier inverzne

### Primjeri primjene z-transformacije u analizi linearnih sustava

• podsjetimo se da je z-transformacija

$$\mathcal{Z}{y(n-j)} = z^{-j} \left[ Y(z) + \sum_{m=-j}^{-1} y(m)z^{-m} \right]$$

• kako su y(-1) = y(-2) = y(-3) = y(-4) = 0 i j = 4 slijedi

$$\mathcal{Z}\{y(n-4)\}=z^{-4}Y(z)$$

• iz  $u(n) = \delta(n) + \delta(n-1)$  slijedi

$$U(z) = 1 + z^{-1}$$

• z-transformacija zadane jednadžbe diferencija je

$$Y(z) - 0.6z^{-4}Y(z) = U(z)$$



Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

2007/2008

ztransformac

Samostalni

Primjeri primjene z–transformacije u analizi

u analizi linearnih sustava

Primjer inverzne z-transformacije

### Primjeri primjene z-transformacije u analizi linearnih sustava

pa je

$$Y(z) = \frac{1}{1 - 0.6z^{-4}}U(z) = \frac{1 + z^{-1}}{1 - 0.6z^{-4}} = \frac{z^4 + z^3}{z^4 - 0.6}$$

rastavljamo na parcijalne razlomke funkciju

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{z^3 + z^2}{z^4 - 0.6}$$

korijeni<sup>8</sup> polinoma u nazivniku su

$$p_1 = -0.8801, \ p_2 = -j0.8801, \ p_3 = +j0.8801, \ p_4 = 0.8801$$

 $<sup>^{8}</sup>$ Korištenjem Matlab naredbe – roots([1  $0\cdot00\cdot0\cdot-0.6$ ])  $^{4}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{2}$   $^{3}$   $^{4}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$   $^{5}$ 



Profesor Branko Jeren

Ztransforma

Samostalni rad student:

Primjeri primjene z-transformacije u analizi linearnih sustava

Primjer inverzne z–transformacije

### Primjeri primjene z-transformacije u analizi linearnih sustava

rastav na parcijalne razlomke je

$$\frac{Y(z)}{z} = \frac{z^3 + z^2}{z^4 - 0.6} =$$

$$= \frac{z^3 + z^2}{(z + 0.8801)(z - j0.8801)(z + j0.8801)(z - 0.8801)} =$$

$$= \frac{c_1}{z + 0.8801} + \frac{c_2}{z + j0.8801} + \frac{c_3}{z - j0.8801} + \frac{c_4}{z - 0.8801}$$

određujemo konstante

$$c_1 = \left\{ \underbrace{(z + 0.8801)}_{(z + 0.8801)(z^2 + 0.8801^2)(z - 0.8801)} \right\}_{z = -0.8801} =$$

$$= -0.0341$$



Profesor Branko Jeren

Z-

Samoetalni

rad student

Primjeri primjene z–transformacije u analizi

linearnih sustava Primier inverzne

### Primjeri primjene z-transformacije u analizi linearnih sustava

$$c_{2} = \left\{ \underbrace{(z + j0.8801)}_{(\underline{z} + j0.8801)(z^{2} - 0.8801^{2})(z - j0.8801)} \right\}_{z = -j0.8801} = 0.2500 + j0.2841 = 0.3784e^{j0.8491}$$

$$c_{3} = \left\{ \underbrace{(z = j0.8801)}_{z = j0.8801} \underbrace{\frac{z^{3} + z^{2}}{(z^{2} - 0.8801^{2})(z + j0.8801)}} \right\}_{z = j0.8801} = 0.2500 - j0.2841 = 0.3784e^{-j0.8491}$$

$$c_4 = \left\{ \underbrace{(z - 0.8801)}_{(z - 0.8801)(z^2 + 0.8801^2)(z + 0.8801)} \right\}_{z = 0.8801} = 0.5341$$



Branko Jeren

Z-

Samostalni

Primjeri primjene

z-transformacije u analizi linearnih sustava Primier inverzne

z–transformacije

# Primjeri primjene z-transformacije u analizi linearnih sustava

$$Y(z) = \frac{c_1 z}{z + 0.8801} + \frac{c_2 z}{z + j0.8801} + \frac{c_3 z}{z - j0.8801} + \frac{c_4 z}{z - 0.8801} =$$

$$= \frac{-0.0341 z}{z + 0.8801} + \frac{0.3784 e^{j0.8491} z}{z + j0.8801} +$$

$$+ \frac{0.3784 e^{-j0.8491} z}{z - j0.8801} + \frac{0.5341 z}{z - 0.8801}$$

$$y(n) = -0.0341(-0.8801)^{n} + 0.3784e^{j0.8491}(-j0.8801)^{n} + 0.3784e^{-j0.8491}(j0.8801)^{n} + 0.5341(0.8801)^{n} \quad n \ge 0$$

$$y(n) = -0.0341(-0.8801)^{n} + 0.3784e^{j0.8491}0.8801^{n}e^{-j\frac{\pi}{2}n} + 0.3784e^{-j0.8491}0.8801^{n}e^{j\frac{\pi}{2}n} + 0.5341(0.8801)^{n} \quad n \ge 0$$

$$= -0.0341(-0.8801)^{n} + 0.5341(0.8801)^{n} + 0.7568(0.8801)^{n} + 0.7568(0.8801)^{n} \cos(\frac{\pi}{2}n - 0.8491) \ge n \ge 0$$



Profesor Branko Jeren

transformacij

Samostalni rad studenta

primjene z–transformacije u analizi

linearnih sustava
Primjer inverzne
z-transformacije

Primjer inverzne z-transformacije

• određuje se inverzna z-transformacija kauzalnog signala x(n)

$$X(z) = \frac{-1 + 0.5z^{-1} + 0.25z^{-2}}{(1 + 0.25z^{-1})(1 + 0.5z^{-1})^2} = \frac{-z^3 + 0.5z^2 + 0.25z}{(z + 0.25)(z + 0.5)^2}$$

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{-z^2 + 0.5z + 0.25}{(z + 0.25)(z + 0.5)^2} = \frac{c_1}{z + 0.25} + \frac{c_{21}}{z + 0.5} + \frac{c_{22}}{(z + 0.5)^2}$$

koeficijent  $c_1$  možemo odrediti pomoću izraza (2)

$$c_1 = \left\{ \underbrace{(z + 0.25)}_{z + 0.25} \frac{-z^2 + 0.5z + 0.25}{(z + 0.25)(z + 0.5)^2} \right\}_{z = -0.25} = 1$$

a koeficijente  $c_{21}$  i  $c_{22}$  iz (1), uz r=2 i za j=1,2,

$$c_{2j} = \frac{1}{(r-j)!} \lim_{z \to -0.5} \left\{ \frac{d^{r-j}}{dz^{r-j}} (z + 0.5)^r \frac{X(z)}{z} \right\}$$



Profesor Branko Jeren

ztransforma

Samostalni

Primjeri primjene z–transformacije u analizi

u analizi linearnih sustava Primjer inverzne z-transformacije Primjer inverzne z-transformacije

$$c_{22} = \left\{ \underbrace{(z + 0.5)^2}_{(z + 0.5)^2(z + 0.25)} \right\}_{z = -0.5} = 1$$

$$c_{21} = \left\{ \frac{d}{dz} (z + 0.5)^2 \frac{-z^2 + 0.5z + 0.25}{(z + 0.5)^2 (z + 0.25)} \right\}_{z = -0.5} =$$

$$= \left\{ \frac{(-2z + 0.5)(z + 0.25) - (-z^2 + 0.5z + 0.25)}{(z + 0.25)^2} \right\}_{z = -0.5} = -2$$

- pokazuje se i drugi način određivanja koeficijenta  $c_1, c_{21}$  i  $c_{22}$
- koeficijente c<sub>1</sub>, c<sub>21</sub> i c<sub>22</sub> zamjenjujemo s A, B i C (radi bolje preglednosti jednačaba)



školska godina 2007/2008 Cjelina 16. Profesor

Branko Jeren

Z-

transionnac

Primjeri primjene z–transformacije u analizi linearnih sustava

Primjer inverzne z-transformacije

### Primjer inverzne z-transformacije

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{-z^2 + 0.5z + 0.25}{(z + 0.25)(z + 0.5)^2} = \frac{A}{z + 0.25} + \frac{B}{z + 0.5} + \frac{C}{(z + 0.5)^2}$$
$$= \frac{A(z + 0.5)^2 + B(z + 0.25)(z + 0.5) + C(z + 0.25)}{(z + 0.25)(z + 0.5)^2}$$

$$\frac{-z^2 + 0.5z + 0.25}{(z + 0.25)(z + 0.5)^2} =$$

$$= \frac{(A+B)z^2 + (A+0.75B+C)z + (0.25A+0.125B+0.25C)}{(z + 0.25)(z + 0.5)^2}$$

pa izjednačavanjem lijeve i desne strane slijedi

$$A + B = -1$$

$$A + 0.75B + C = 0.5$$

$$0.25A + 0.125B + 0.25C = 0.25$$



Cjelina 16.

Profesor
Branko Jeren

2007/2008

ztransformac

Samostalni rad student

primjeri primjene z–transformacij u analizi

u analizi linearnih sustava Primjer inverzne z–transformacije

#### Primjer inverzne z-transformacije

• rješenja prethodnih jednadžbi su  $A=1,\ B=-2$  i C=1, pa je rastav na parcijalne razlomke

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{z + 0.25} + \frac{-2}{z + 0.5} + \frac{1}{(z + 0.5)^2} \Rightarrow X(z) = \frac{z}{z + 0.25} + \frac{-2z}{z + 0.5} + \frac{z}{(z + 0.5)^2}$$

podsjetimo se da je

$$\mathcal{Z}\lbrace a^n\mu(n)\rbrace = rac{z}{z-a} \ \mathrm{i} \ \mathcal{Z}\lbrace na^n\mu(n)\rbrace = rac{az}{(z-a)^2}$$

$$X(z) = \frac{z}{z - (-0.25)} + -2\frac{z}{z - (-0.5)} - 2\frac{(-0.5)z}{(z - (-0.5))^2}$$

pa je inverzna transformacija

$$x(n) = (-0.25)^n \mu(n) - 2(-0.5)^n \mu(n) - 2n(-0.5)^n \mu(n)$$