

# 概率论与数理统计总结

刘阳

2019 年 6 月 6 日

## 目录

<b>1 第一章 概率论的基本概念</b>	<b>3</b>
1.1 随机试验 . . . . .	3
1.2 样本空间、随机事件 . . . . .	3
1.2.1 样本空间 . . . . .	3
1.2.2 随机事件 . . . . .	3
1.2.3 事件间的关系与事件的运算 . . . . .	3
1.3 频率与概率 . . . . .	4
1.3.1 频率 . . . . .	4
1.3.2 概率 . . . . .	5
1.4 等可能概型（古典概型） . . . . .	5
1.5 条件概率 . . . . .	6
1.5.1 条件概率 . . . . .	6
1.5.2 乘法定理 . . . . .	6
1.5.3 全概率公式和贝叶斯公式 . . . . .	6
1.6 独立性 . . . . .	7
<b>2 第二章 随机变量及其分布</b>	<b>7</b>
2.1 随机变量 . . . . .	7
2.2 离散型随机变量及其分布率 . . . . .	7
2.2.1 (0-1) 分布 . . . . .	7
2.2.2 伯努利试验、二项分布 . . . . .	8
2.2.3 泊松分布 . . . . .	8
2.3 随机变量的分布函数 . . . . .	8
2.4 连续型随机变量及其概率密度 . . . . .	8

目录	2
2.4.1 均匀分布	9
2.4.2 指数分布	9
2.4.3 正态分布	9
2.5 随机变量的函数的分布	10
<b>3 第三章 多维随机变量及其分布</b>	<b>10</b>
3.1 二维随机变量	10
3.2 边缘分布	12
3.3 条件分布	12
3.4 相互独立的随机变量	12
3.5 两个随机变量的函数的分布	12
<b>4 第四章 随机变量的数字特征</b>	<b>12</b>
4.1 数学期望	12
4.2 方差	12
4.3 协方差及相关系数	12
4.4 矩、协方差矩阵	12
<b>5 第五章 大数定律及中心极限定理</b>	<b>12</b>
5.1 大数定律	12
5.2 中心极限定理	12
<b>6 第六章 样本及抽样分布</b>	<b>12</b>
6.1 随机样本	12
6.2 直方图和箱线图	12
6.3 抽样分布	12
<b>7 第七章 参数估计</b>	<b>12</b>
7.1 点估计	12
7.2 基于截尾样本的最大似然估计	12
7.3 估计量的评选标准	12
7.4 区间估计	12
7.5 正态总体均值与方差的区间估计	12
7.6 (0-1) 分布参数的区间估计	12
7.7 单侧置信区间	12

# 1 第一章 概率论的基本概念

## 1.1 随机试验

随机试验: 1. 可以在相同条件下重复地进行;  
2. 每次试验的可能结果不止一个, 并且能事先明确实验的所有可能结果;  
3. 进行一次实验之前不能确定哪一个结果会出现.

## 1.2 样本空间、随机事件

### 1.2.1 样本空间

随机试验  $E$  的所有可能结果组成的集合称为 **随机试验**.  
样本空间的元素, 即  $E$  的每个结果称为 **样本点**.

### 1.2.2 随机事件

试验  $E$  的样本空间  $S$  的子集称为 **随机事件**, 简称 **事件**.  
每次试验中, 当且仅当这一子集的一个样本点出现称为 **事件发生**.  
有一个样本点组成的单点集称为 **基本事件**.  
样本空间  $S$  包含所有的样本点, 它是  $S$  自身的子集, 在每次试验中它总是发生的,  $S$  成为 **必然事件**.  
空集  $\emptyset$  不包含任何样本点, 它也作为样本空间的子集, 他在每次试验中都不发生,  $\emptyset$  称为 **不可能事件**.

### 1.2.3 事件间的关系与事件的运算

1. 若  $A \subset B$ , 则称事件  $B$  包含事件  $A$ , 这指的是事件  $A$  发生必导致事件  $B$  发生.  
若  $A \subset B$  且  $B \subset A$ , 即  $A = B$ , 则称事件  $A$  与事件  $B$  **相等**.
2. 事件  $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$  称为事件  $A$  与事件  $B$  的 **和事件**. 当且仅当  $A, B$  中至少一个发生时, 事件  $A \cup B$  发生.  
类似地, 称  $\bigcup_{k=1}^n A_k$  为  $n$  个事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  的 **和事件**; 称  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$  为可列个事件  $A_1, A_2, \dots$  的 **和事件**.
3. 事件  $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$  称为事件  $A$  与事件  $B$  的 **积事件**. 当且仅当  $A, B$  同时发生时, 事件  $A \cap B$  发生.  $A \cap B$  也记作  $AB$ .

类似地, 称  $\bigcap_{k=1}^n A_k$  为  $n$  个事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  的 **积事件**; 称  $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$  为可列个事件  $A_1, A_2, \dots$  的积事件.

4. 事件  $A - B = \{x | x \in A, x \notin B\}$  称为事件  $A$  与事件  $B$  的 **差事件**. 当且仅当  $A$  发生、 $B$  不发生时事件  $A - B$  发生.
5. 若  $A \cap B = \emptyset$  则称事件  $A$  与事件  $B$  是 **互不相容的**, 或 **互斥的**. 这指的是事件  $A$  与事件  $B$  不能同时发生. 基本事件也是两两互不相容的.
6. 若  $A \cup B = S$  且  $A \cap B = \emptyset$ , 则称事件  $A$  与事件  $B$  互为 **逆事件**. 又称事件  $A$  与事件  $B$  互为 **对立事件**. 这指的是对每次试验而言, 事件  $A, B$  中必有一个发生, 且仅有一个发生.  $A$  的对立事件记为  $\bar{A}$ .  $\bar{A} = S - A$

交换律:  $A \cup B = B \cup A$ ;  
 $A \cap B = B \cap A$ .

结合律:  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$ ;  
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$ .

分配律:  $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ;  
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ .

德摩根律:  $A \cup B = \bar{\bar{A} \cap \bar{B}}$ ;  $A \cap B = \bar{\bar{A} \cup \bar{B}}$ .

## 1.3 频率与概率

### 1.3.1 频率

在相同条件下, 进行了  $n$  次试验, 在这  $n$  次试验中, 事件  $A$  发生的次数为  $n_A$  称为事件  $A$  发生的 **频数**. 比值  $\frac{n_A}{n}$  称为事件  $A$  发生的 **频率**, 并记成  $f_n(A)$

- 性质:
1.  $0 \leq f_n(A) \leq 1$ ;
  2.  $f_n(S) = 1$ ;
  3. 若  $A_1, A_2, \dots, A_k$  是两两互不相容的事件, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k).$$

### 1.3.2 概率

设  $E$  是随机试验,  $S$  是它的样本空间. 对于  $E$  的每一事件  $A$  赋予一个实数, 记为  $P(A)$ , 称为事件  $A$  的 **概率**, 如果集合函数  $P(\cdot)$  满足以下条件:

1. **非负性:** 对于每一个事件  $A$ , 有  $P(A) \geq 0$ ;
2. **规范性:** 对于必然事件  $S$ , 有  $P(S) = 1$ ;
3. **可列可加性:** 设  $A_1, A_2, \dots$  是两两互不相容的事件, 即对于  $A_i A_j = \emptyset$ ,  $i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$ , 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots.$$

性质: 1.  $P(\emptyset) = 0$ .

2. 若  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是两两互不相容的事件, 则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

3. 设  $A, B$  是两个事件, 若  $A \subset B$ , 则有

$$P(B - A) = P(B) - P(A);$$

$$P(B) \geq P(A).$$

4. 对于任一事件  $A$ , 有

$$P(A) \leq 1.$$

5. 对于任意两事件  $A, B$  有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

### 1.4 等可能概型 (古典概型)

1. 试验的样本空间只包含有限个元素.
2. 试验中每个基本事件发生的可能性相同.

具有以上两个特点的试验称为 **等可能概型**. 它在概率论发展初期曾是主要的研究对象, 所以也成为 **古典概型**.

设试验的样本空间为  $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  若  $A$  包含  $k$  个基本事件则有:

$$P(A) = \sum_{j=1}^k P(\{e_{i_j}\}) = \frac{k}{n} = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{S \text{ 中基本事件的总数}}.$$

**超几何分布**的概率公式:

$$p = \frac{\binom{D}{k} \binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

## 1.5 条件概率

### 1.5.1 条件概率

设  $A, B$  是两个事件, 且  $P(A) > 0$ , 称

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件  $A$  发生下事件  $B$  发生的 **条件概率**.

### 1.5.2 乘法定理

设  $P(A) > 0$  则有

$$P(AB) = P(B|A)P(A).$$

### 1.5.3 全概率公式和贝叶斯公式

**全概率公式:** 设试验  $E$  的样本空间为  $S$ ,  $A$  为  $E$  的事件,  $B_1, B_2, \dots, B_n$  为  $S$  的一个划分, 且  $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ , 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n).$$

**贝叶斯 ( Bayes ) 公式:** 设试验  $E$  的样本空间为  $S$ ,  $A$  为  $E$  的事件,  $B_1, B_2, \dots, B_n$  为  $S$  的一个划分, 且  $P(A) > 0, P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ , 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

### 1.6 独立性

设  $A, B$  两事件如果满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件  $A, B$  **相互独立**, 简称  $A, B$  **独立**.

定理: 1. 设  $A, B$  是两事件, 且  $P(A) > 0$ . 若  $A, B$  相互独立, 则  $P(B|A) = P(B)$ . 反之亦然.

2. 若事件  $A$  与  $B$  相互独立, 则下列各对事件也相互独立:  $A$  与  $\bar{B}$ ,  $\bar{A}$  与  $B$ ,  $\bar{A}$  与  $\bar{B}$ .

一般, 设  $A_1, A_2, \dots, A_n$  是  $n(n \geq 2)$  个事件, 如果对于其中任意 2 个, 任意 3 个,  $\dots$ , 任意  $n$  个事件的积事件的概率, 都等于各事件概率之积, 则称事件  $A_1, A_2, \dots, A_n$  相互独立.

推论: 1. 若事件  $A_1, A_2, \dots, A_n(n \geq 2)$  相互独立, 则其中任意  $k(2 \leq k \leq n)$  个事件也是相互独立的.

2. 若  $n$  个事件  $A_1, A_2, \dots, A_n(n \geq 2)$  相互独立, 则将  $A_1, A_2, \dots, A_n$  中任意多个事件换成它们各自的对立事件, 所得的  $n$  个事件仍相互独立.

## 2 第二章 随机变量及其分布

### 2.1 随机变量

设随机试验的样本空间为  $S = \{e\}$ .  $X = X(e)$  是定义在样本空间上的单值函数. 称  $X = X(e)$  为 **随机变量**.

### 2.2 离散型随机变量及其分布率

#### 2.2.1 (0-1) 分布

设随机变量  $X$  只可能取 0 与 1 两个值, 它的分布律是

$$P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k = 0, 1 \quad (0 < p < 1)$$

则称  $X$  服从以  $p$  为参数的 (0-1) 分布或 **两点分布**

### 2.2.2 伯努利试验、二项分布

设试验  $E$  只有两个可能结果:  $A$  及  $\bar{A}$ , 则称  $E$  为 **伯努利 (Bernoulli) 试验**.

将  $E$  独立重复地进行  $n$  次, 则称这一串重复的独立试验为  **$n$  重伯努利试验**.

以  $X$  表示  $n$  重伯努利试验中事件  $A$  发生的次数, 每次伯努利试验中  $A$  事件发生的概率为  $p$  称随机变量  $X$  服从参数为  $n, p$  的 **二项分布**, 并记为  $X \sim b(n, p)$ . 它的分布律是

$$P\{x = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

### 2.2.3 泊松分布

设随机变量  $X$  的所有可能取的值为  $0, 1, 2, \dots$ , 而取各个值的概率为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中  $\lambda > 0$  是常数. 则称  $X$  服从参数为  $\lambda$  的 **泊松分布**, 记为  $X \sim \pi(\lambda)$

**泊松定理:** 设  $\lambda > 0$  是一个常数,  $n$  是任意正整数, 设  $np_n = \lambda$ , 则对于任意固定的非负整数  $k$  有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

一般, 当  $n \geq 20, p \leq 0.05$  时用  $\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} (\lambda = np)$  作为  $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$  的近似值效果颇佳.

## 2.3 随机变量的分布函数

设  $X$  是一个随机变量,  $x$  是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}, -\infty < x < \infty$$

称为  $X$  的 **分布函数**.

## 2.4 连续型随机变量及其概率密度

如果对于随机变量  $X$  的分布函数  $F(x)$ , 存在非负可积函数  $f(x)$ , 使对于任意实数  $x$  有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$



则称  $X$  为 **连续型随机变量**, 其中函数  $f(x)$  称为  $X$  的 **概率密度函数**, 简称 **概率密度**.

### 2.4.1 均匀分布

若连续型随机变量  $X$  具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则称  $X$  在区间  $(a, b)$  上服从 **均匀分布**. 记为  $X \sim U(a, b)$

### 2.4.2 指数分布

若连续型随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中  $\theta > 0$  为常数, 则称  $X$  服从参数为  $\theta$  的 **指数分布**.

### 2.4.3 正态分布

若连续型随机变量  $X$  的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty$$

其中  $\mu, \sigma (\sigma > 0)$  为常数, 则称  $X$  服从参数为  $\mu, \sigma$  的 **正态分布** 或 **高斯 (Gauss)** 分布, 记为  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ .

性质: 1. 曲线关于  $x = \mu$  对称. 这表明对于任意  $h > 0$  有

$$P\{\mu - h < X \leq \mu\} = P\{\mu < X \leq \mu + h\}.$$

2. 当  $x = \mu$  时取到最大值

$$f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}.$$

特别, 当  $\mu = 0, \sigma = 1$  时称随机变量  $X$  服从 **标准正态分布**. 其概率密度和分布函数分别用  $\varphi(x), \Phi(x)$  表示, 即有

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

易知

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x).$$

引理: 若  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ , 则  $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$ .

## 2.5 随机变量的函数的分布

设随机变量  $X$  具有概率密度  $f_X(x)$ ,  $-\infty < x < \infty$ , 又设函数  $g(x)$  处处可导且恒有  $g'(x) > 0$  (或恒有  $g'(x) < 0$ ). 则  $Y = g(X)$  是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中  $\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}$ ,  $\beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}$ ,  $h(y)$  是  $g(x)$  的反函数.

# 3 第三章 多维随机变量及其分布

## 3.1 二维随机变量

一般, 设  $E$  是一个随机试验, 它的样本空间是  $S = \{e\}$ , 设  $X = X(e)$  和  $Y = Y(e)$  是定义在  $S$  上的随机变量, 由它们构成的一个向量  $(X, Y)$ , 叫做 **二维随机向量**或 **二维随机变量**.

设  $(X, Y)$  是二维随机变量, 对于任意实数  $x, y$ , 二元函数

$$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} \stackrel{\text{记成}}{=} P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为二维随机变量  $(X, Y)$  的分布函数, 或称为随机变量  $X$  和  $Y$  的 **联合分布函数**.

性质: 1.  $F(x, y)$  是变量  $x$  和  $y$  的不减函数, 即对于固定的  $y$ , 当  $x_2 > x_1$  时,  $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$ ; 对于任意固定的  $x$ , 当  $y_2 > y_1$  时,  $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$ .

2.  $0 \leq F(x, y) \leq 1$ , 且

对于任意固定的  $y$ ,  $F(-\infty, y) = 0$ ,

对于任意固定的 $y, F(x, -\infty) = 0,$

$$F(-\infty, -\infty) = 0, F(\infty, \infty) = 1$$

3.  $F(x+0, y) = F(x, y), F(x, y+0) = F(x, y)$  , 即  $F(x, y)$  关于  $x$  右连续, 关于  $y$  也右连续.

4. 对于任意  $(x_1, y_1), (x_2, y_2), x_1 < x_2, y_1 < y_2$  , 下述不等式成立:

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0.$$

如果二维随机变量  $(X, Y)$  全部可能取到的值是有限对或可列无限多对, 则称  $(X, Y)$  是 **离散型的随机变量**.

我们称  $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$  为二位离散型随机变量  $(X, Y)$  的 **分布律**, 或称随机变量  $X$  和  $Y$  的 **联合分布律**.

对于二维随机变量  $(X, Y)$  的分布函数  $F(x, y)$  , 如果存在非负可积函数  $f(x, y)$  , 使对于任意  $x, y$  有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv,$$

则称  $(X, y)$  是 **连续型的二维随机变量**, 函数  $f(x, y)$  称为二维随机变量  $(X, Y)$  的 **概率密度**, 或称为随机变量  $X$  和  $Y$  的 **联合概率密度**.

概率密度  $f(x, y)$  具有以下性质: 1.  $f(x, y) \geq 0$

$$2. \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} dx dy = F(\infty, \infty) = 1.$$

3. 设  $G$  是  $xOy$  平面上的区域, 点  $(X, Y)$  落在  $G$  内的概率为

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy.$$

4. 若  $f(x, y)$  在点  $(x, y)$  连续, 则有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y).$$

设  $E$  是一个随机试验, 它的样本空间是  $S = \{e\}$  , 设  $X_1 = X_1(e), X_2 = X_2(e), \dots, X_n = X_n(e)$  是定义在  $S$  上的随机变量, 由它们构成的一个  $n$  维向量  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  叫做  **$n$  维随即向量**或  **$n$  维随机变量**.

对于任意  $n$  个实验  $x_1, x_2, \dots, x_n, n$  元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

称为  $n$  维随机变量  $(X_1, X_2, \dots, X_n)$  的 **分布函数**, 或随机变量  $X_1, X_2, \dots, X_n$  的 **联合分布函数**.

3.2 边缘分布

3.3 条件分布

3.4 相互独立的随机变量

3.5 两个随机变量的函数的分布

4 第四章 随机变量的数字特征

4.1 数学期望

4.2 方差

4.3 协方差及相关系数

4.4 矩、协方差矩阵

5 第五章 大数定律及中心极限定理

5.1 大数定律

5.2 中心极限定理

6 第六章 样本及抽样分布

6.1 随机样本

6.2 直方图和箱线图

6.3 抽样分布

7 第七章 参数估计

7.1 点估计

7.2 基于截尾样本的最大似然估计

7.3 估计量的评选标准

7.4 区间估计

7.5 正态总体均值与方差的区间估计

7.6 (0-1) 分布参数的区间估计

7.7 单侧置信区间