

概率论与数理统计总结

刘阳

2019 年 6 月 7 日

目录

1 第一章 概率论的基本概念	3
1.1 随机试验	3
1.2 样本空间、随机事件	3
1.2.1 样本空间	3
1.2.2 随机事件	3
1.2.3 事件间的关系与事件的运算	3
1.3 频率与概率	4
1.3.1 频率	4
1.3.2 概率	5
1.4 等可能概型（古典概型）	5
1.5 条件概率	6
1.5.1 条件概率	6
1.5.2 乘法定理	6
1.5.3 全概率公式和贝叶斯公式	6
1.6 独立性	7
2 第二章 随机变量及其分布	7
2.1 随机变量	7
2.2 离散型随机变量及其分布率	7
2.2.1 (0-1) 分布	7
2.2.2 伯努利试验、二项分布	8
2.2.3 泊松分布	8
2.3 随机变量的分布函数	8
2.4 连续型随机变量及其概率密度	8

目录	2
2.4.1 均匀分布	9
2.4.2 指数分布	9
2.4.3 正态分布	9
2.5 随机变量的函数的分布	10
3 第三章 多维随机变量及其分布	10
3.1 二维随机变量	10
3.2 边缘分布	12
3.3 条件分布	13
3.4 相互独立的随机变量	13
4 第四章 随机变量的数字特征	14
4.1 数学期望	14
4.2 方差	15
4.3 协方差及相关系数	15
4.4 矩、协方差矩阵	16
5 第五章 大数定律及中心极限定理	18
5.1 大数定律	18
5.2 中心极限定理	18
6 第六章 样本及抽样分布	18
6.1 随机样本	18
6.2 直方图和箱线图	18
6.3 抽样分布	18
7 第七章 参数估计	18
7.1 点估计	18
7.2 基于截尾样本的最大似然估计	18
7.3 估计量的评选标准	18
7.4 区间估计	18
7.5 正态总体均值与方差的区间估计	18
7.6 (0-1) 分布参数的区间估计	18
7.7 单侧置信区间	18

1 第一章 概率论的基本概念

1.1 随机试验

随机试验: 1. 可以在相同条件下重复地进行;
2. 每次试验的可能结果不止一个, 并且能事先明确实验的所有可能结果;
3. 进行一次实验之前不能确定哪一个结果会出现.

1.2 样本空间、随机事件

1.2.1 样本空间

随机试验 E 的所有可能结果组成的集合称为 **随机试验**.
样本空间的元素, 即 E 的每个结果称为 **样本点**.

1.2.2 随机事件

试验 E 的样本空间 S 的子集称为 **随机事件**, 简称 **事件**.
每次试验中, 当且仅当这一子集的一个样本点出现称为 **事件发生**.
有一个样本点组成的单点集称为 **基本事件**.
样本空间 S 包含所有的样本点, 它是 S 自身的子集, 在每次试验中它总是发生的, S 成为 **必然事件**.
空集 \emptyset 不包含任何样本点, 它也作为样本空间的子集, 他在每次试验中都不发生, \emptyset 称为 **不可能事件**.

1.2.3 事件间的关系与事件的运算

1. 若 $A \subset B$, 则称事件 B 包含事件 A , 这指的是事件 A 发生必导致事件 B 发生.
若 $A \subset B$ 且 $B \subset A$, 即 $A = B$, 则称事件 A 与事件 B **相等**.
2. 事件 $A \cup B = \{x | x \in A \text{ 或 } x \in B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的 **和事件**. 当且仅当 A, B 中至少一个发生时, 事件 $A \cup B$ 发生.
类似地, 称 $\bigcup_{k=1}^n A_k$ 为 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 的 **和事件**; 称 $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 A_1, A_2, \dots 的 **和事件**.
3. 事件 $A \cap B = \{x | x \in A \text{ 且 } x \in B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的 **积事件**. 当且仅当 A, B 同时发生时, 事件 $A \cap B$ 发生. $A \cap B$ 也记作 AB .

类似地, 称 $\bigcap_{k=1}^n A_k$ 为 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 的 **积事件**; 称 $\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k$ 为可列个事件 A_1, A_2, \dots 的积事件.

4. 事件 $A - B = \{x | x \in A, x \notin B\}$ 称为事件 A 与事件 B 的 **差事件**. 当且仅当 A 发生、 B 不发生时事件 $A - B$ 发生.
5. 若 $A \cap B = \emptyset$ 则称事件 A 与事件 B 是 **互不相容的**, 或 **互斥的**. 这指的是事件 A 与事件 B 不能同时发生. 基本事件也是两两互不相容的.
6. 若 $A \cup B = S$ 且 $A \cap B = \emptyset$, 则称事件 A 与事件 B 互为 **逆事件**. 又称事件 A 与事件 B 互为 **对立事件**. 这指的是对每次试验而言, 事件 A, B 中必有一个发生, 且仅有一个发生. A 的对立事件记为 \bar{A} . $\bar{A} = S - A$

交换律: $A \cup B = B \cup A$;
 $A \cap B = B \cap A$.

结合律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap C$;
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup C$.

分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;
 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

德摩根律: $A \cup B = \bar{A} \cap \bar{B}$; $A \cap B = \bar{A} \cup \bar{B}$.

1.3 频率与概率

1.3.1 频率

在相同条件下, 进行了 n 次试验, 在这 n 次试验中, 事件 A 发生的次数为 n_A 称为事件 A 发生的 **频数**. 比值 $\frac{n_A}{n}$ 称为事件 A 发生的 **频率**, 并记成 $f_n(A)$

- 性质:
1. $0 \leq f_n(A) \leq 1$;
 2. $f_n(S) = 1$;
 3. 若 A_1, A_2, \dots, A_k 是两两互不相容的事件, 则

$$f_n(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = f_n(A_1) + f_n(A_2) + \dots + f_n(A_k).$$

1.3.2 概率

设 E 是随机试验, S 是它的样本空间. 对于 E 的每一事件 A 赋予一个实数, 记为 $P(A)$, 称为事件 A 的 **概率**, 如果集合函数 $P(\cdot)$ 满足以下条件:

1. **非负性:** 对于每一个事件 A , 有 $P(A) \geq 0$;
2. **规范性:** 对于必然事件 S , 有 $P(S) = 1$;
3. **可列可加性:** 设 A_1, A_2, \dots 是两两互不相容的事件, 即对于 $A_i A_j = \emptyset$, $i \neq j, i, j = 1, 2, \dots$, 有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots.$$

性质: 1. $P(\emptyset) = 0$.

2. 若 A_1, A_2, \dots, A_n 是两两互不相容的事件, 则有

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n).$$

3. 设 A, B 是两个事件, 若 $A \subset B$, 则有

$$P(B - A) = P(B) - P(A);$$

$$P(B) \geq P(A).$$

4. 对于任一事件 A , 有

$$P(A) \leq 1.$$

5. 对于任意两事件 A, B 有

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB).$$

1.4 等可能概型 (古典概型)

1. 试验的样本空间只包含有限个元素.
2. 试验中每个基本事件发生的可能性相同.

具有以上两个特点的试验称为 **等可能概型**. 它在概率论发展初期曾是主要的研究对象, 所以也成为 **古典概型**.

设试验的样本空间为 $S = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 若 A 包含 k 个基本事件则有:

$$P(A) = \sum_{j=1}^k P(\{e_{i_j}\}) = \frac{k}{n} = \frac{A \text{ 包含的基本事件数}}{S \text{ 中基本事件的总数}}.$$

超几何分布的概率公式:

$$p = \frac{\binom{D}{k} \binom{N-D}{n-k}}{\binom{N}{n}}.$$

1.5 条件概率

1.5.1 条件概率

设 A, B 是两个事件, 且 $P(A) > 0$, 称

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

为在事件 A 发生下事件 B 发生的 **条件概率**.

1.5.2 乘法定理

设 $P(A) > 0$ 则有

$$P(AB) = P(B|A)P(A).$$

1.5.3 全概率公式和贝叶斯公式

全概率公式: 设试验 E 的样本空间为 S , A 为 E 的事件, B_1, B_2, \dots, B_n 为 S 的一个划分, 且 $P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$P(A) = P(A|B_1)P(B_1) + P(A|B_2)P(B_2) + \dots + P(A|B_n)P(B_n).$$

贝叶斯 (Bayes) 公式: 设试验 E 的样本空间为 S , A 为 E 的事件, B_1, B_2, \dots, B_n 为 S 的一个划分, 且 $P(A) > 0, P(B_i) > 0 (i = 1, 2, \dots, n)$, 则

$$P(B_i|A) = \frac{P(A|B_i)P(B_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

1.6 独立性

设 A, B 两事件如果满足等式

$$P(AB) = P(A)P(B)$$

则称事件 A, B **相互独立**, 简称 A, B **独立**.

定理: 1. 设 A, B 是两事件, 且 $P(A) > 0$. 若 A, B 相互独立, 则 $P(B|A) = P(B)$. 反之亦然.

2. 若事件 A 与 B 相互独立, 则下列各对事件也相互独立: A 与 \bar{B} , \bar{A} 与 B , \bar{A} 与 \bar{B} .

一般, 设 A_1, A_2, \dots, A_n 是 $n(n \geq 2)$ 个事件, 如果对于其中任意 2 个, 任意 3 个, \dots , 任意 n 个事件的积事件的概率, 都等于各事件概率之积, 则称事件 A_1, A_2, \dots, A_n 相互独立.

推论: 1. 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n(n \geq 2)$ 相互独立, 则其中任意 $k(2 \leq k \leq n)$ 个事件也是相互独立的.

2. 若 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n(n \geq 2)$ 相互独立, 则将 A_1, A_2, \dots, A_n 中任意多个事件换成它们各自的对立事件, 所得的 n 个事件仍相互独立.

2 第二章 随机变量及其分布

2.1 随机变量

设随机试验的样本空间为 $S = \{e\}$. $X = X(e)$ 是定义在样本空间上的单值函数. 称 $X = X(e)$ 为 **随机变量**.

2.2 离散型随机变量及其分布率

2.2.1 (0-1) 分布

设随机变量 X 只可能取 0 与 1 两个值, 它的分布律是

$$P\{X = k\} = p^k(1-p)^{1-k}, k = 0, 1 \quad (0 < p < 1)$$

则称 X 服从以 p 为参数的 (0-1) 分布或 **两点分布**.

2.2.2 伯努利试验、二项分布

设试验 E 只有两个可能结果: A 及 \bar{A} , 则称 E 为 **伯努利 (Bernoulli) 试验**.

将 E 独立重复地进行 n 次, 则称这一串重复的独立试验为 **n 重伯努利试验**.

以 X 表示 n 重伯努利试验中事件 A 发生的次数, 每次伯努利试验中 A 事件发生的概率为 p 称随机变量 X 服从参数为 n, p 的 **二项分布**, 并记为 $X \sim b(n, p)$. 它的分布律是

$$P\{x = k\} = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, k = 0, 1, 2, \dots, n$$

2.2.3 泊松分布

设随机变量 X 的所有可能取的值为 $0, 1, 2, \dots$, 而取各个值的概率为

$$P\{X = k\} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $\lambda > 0$ 是常数. 则称 X 服从参数为 λ 的 **泊松分布**, 记为 $X \sim \pi(\lambda)$

泊松定理: 设 $\lambda > 0$ 是一个常数, n 是任意正整数, 设 $np_n = \lambda$, 则对于任意固定的非负整数 k 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} p_n^k (1 - p_n)^{n-k} = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

一般, 当 $n \geq 20, p \leq 0.05$ 时用 $\frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} (\lambda = np)$ 作为 $\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$ 的近似值效果颇佳.

2.3 随机变量的分布函数

设 X 是一个随机变量, x 是任意实数, 函数

$$F(x) = P\{X \leq x\}, -\infty < x < \infty$$

称为 X 的 **分布函数**.

2.4 连续型随机变量及其概率密度

如果对于随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 存在非负可积函数 $f(x)$, 使对于任意实数 x 有

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则称 X 为 **连续型随机变量**, 其中函数 $f(x)$ 称为 X 的 **概率密度函数**, 简称 **概率密度**.

2.4.1 均匀分布

若连续型随机变量 X 具有概率密度

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

则称 X 在区间 (a, b) 上服从 **均匀分布**. 记为 $X \sim U(a, b)$

2.4.2 指数分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 为常数, 则称 X 服从参数为 θ 的 **指数分布**.

2.4.3 正态分布

若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < \infty$$

其中 $\mu, \sigma (\sigma > 0)$ 为常数, 则称 X 服从参数为 μ, σ 的 **正态分布** 或 **高斯 (Gauss)** 分布, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

性质: 1. 曲线关于 $x = \mu$ 对称. 这表明对于任意 $h > 0$ 有

$$P\{\mu - h < X \leq \mu\} = P\{\mu < X \leq \mu + h\}.$$

2. 当 $x = \mu$ 时取到最大值

$$f(\mu) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}.$$

特别, 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时称随机变量 X 服从 **标准正态分布**. 其概率密度和分布函数分别用 $\varphi(x), \Phi(x)$ 表示, 即有

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}},$$

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt.$$

易知

$$\Phi(-x) = 1 - \Phi(x).$$

引理: 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$.

2.5 随机变量的函数的分布

设随机变量 X 具有概率密度 $f_X(x)$, $-\infty < x < \infty$, 又设函数 $g(x)$ 处处可导且恒有 $g'(x) > 0$ (或恒有 $g'(x) < 0$). 则 $Y = g(X)$ 是连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X[h(y)]|h'(y)|, & \alpha < y < \beta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$$

其中 $\alpha = \min\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $\beta = \max\{g(-\infty), g(\infty)\}$, $h(y)$ 是 $g(x)$ 的反函数.

3 第三章 多维随机变量及其分布

3.1 二维随机变量

一般, 设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, 设 $X = X(e)$ 和 $Y = Y(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个向量 (X, Y) , 叫做 **二维随机向量**或 **二维随机变量**.

设 (X, Y) 是二维随机变量, 对于任意实数 x, y , 二元函数

$$F(x, y) = P\{(X \leq x) \cap (Y \leq y)\} \stackrel{\text{记成}}{=} P\{X \leq x, Y \leq y\}$$

称为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 或称为随机变量 X 和 Y 的 **联合分布函数**.

性质: 1. $F(x, y)$ 是变量 x 和 y 的不减函数, 即对于固定的 y , 当 $x_2 > x_1$ 时, $F(x_2, y) \geq F(x_1, y)$; 对于任意固定的 x , 当 $y_2 > y_1$ 时, $F(x, y_2) \geq F(x, y_1)$.

2. $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且

对于任意固定的 y , $F(-\infty, y) = 0$,

对于任意固定的 y , $F(x, -\infty) = 0$,

$$F(-\infty, -\infty) = 0, F(\infty, \infty) = 1$$

3. $F(x+0, y) = F(x, y), F(x, y+0) = F(x, y)$, 即 $F(x, y)$ 关于 x 右连续, 关于 y 也右连续.

4. 对于任意 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 下述不等式成立:

$$F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) + F(x_1, y_1) - F(x_1, y_2) \geq 0.$$

如果二维随机变量 (X, Y) 全部可能取到的值是有限对或可列无限多对, 则称 (X, Y) 是 **离散型的随机变量**.

我们称 $P\{X = x_i, Y = y_j\} = p_{ij}, i, j = 1, 2, \dots$ 为二位离散型随机变量 (X, Y) 的 **分布律**, 或称随机变量 X 和 Y 的 **联合分布律**.

对于二维随机变量 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$, 如果存在非负可积函数 $f(x, y)$, 使对于任意 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv,$$

则称 (X, y) 是 **连续型的二维随机变量**, 函数 $f(x, y)$ 称为二维随机变量 (X, Y) 的 **概率密度**, 或称为随机变量 X 和 Y 的 **联合概率密度**.

性质: 1. $f(x, y) \geq 0$

$$2. \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} dx dy = F(\infty, \infty) = 1.$$

3. 设 G 是 xOy 平面上的区域, 点 (X, Y) 落在 G 内的概率为

$$P\{(X, Y) \in G\} = \iint_G f(x, y) dx dy.$$

4. 若 $f(x, y)$ 在点 (x, y) 连续, 则有

$$\frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y} = f(x, y).$$

设 E 是一个随机试验, 它的样本空间是 $S = \{e\}$, 设 $X_1 = X_1(e), X_2 = X_2(e), \dots, X_n = X_n(e)$ 是定义在 S 上的随机变量, 由它们构成的一个 n 维向量 (X_1, X_2, \dots, X_n) 叫做 **n 维随即向量**或 **n 维随机变量**.

对于任意 n 个实验 x_1, x_2, \dots, x_n, n 元函数

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = P\{X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n\}$$

称为 n 维随机变量 (X_1, X_2, \dots, X_n) 的 **分布函数**, 或随机变量 X_1, X_2, \dots, X_n 的 **联合分布函数**.

3.2 边缘分布

二维随机变量 (X, Y) 作为一个整体, 具有分布函数 $F(x, y)$. 而 X 和 Y 都是随机变量, 各自也有分布函数, 将它们分别记为 $F_X(x), F_Y(y)$, 依次称为二维随机变量 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的 **边缘分布函数**.

对于离散型随机变量可得

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \sum_{x_i \leq x} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$$

X 的分布律为

$$P\{X = x_i\} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}, \quad i = 1, 2, \dots$$

同样 Y 的分布律为

$$P\{Y = y_j\} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}, \quad j = 1, 2, \dots$$

记

$$p_{i\cdot} = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = P\{X = x_i\}, \quad i = 1, 2, \dots,$$

$$p_{\cdot j} = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij} = P\{Y = y_j\}, \quad j = 1, 2, \dots,$$

分别称 $p_{i\cdot} (i = 1, 2, \dots)$ 和 $p_{\cdot j} (j = 1, 2, \dots)$ 为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的 **边缘分布律**.

对于连续型随机变量 (X, Y) 设它的概率密度为 $f(x, y)$, 由于

$$F_X(x) = F(x, \infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy \right] dx,$$

X 是一个连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dy.$$

同样, Y 也是一个连续型随机变量, 其概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx.$$

分别称 $f_X(x)$, $f_Y(y)$ 为 (X, Y) 关于 X 和关于 Y 的 **边缘概率密度**.

3.3 条件分布

设 (X, Y) 是二位离散型随机变量, 对于固定的 j , 若 $P\{Y = y_j\} > 0$, 则称

$$P\{X = x_i | Y = y_j\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{Y = y_j\}} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot j}}, \quad i = 1, 2, \dots$$

为在 $Y = y_j$ 条件下随机变量 X 的 **条件分布律**.

同样, 对于固定的 i , 若 $P\{X = x_i\} > 0$, 则称

$$P\{Y = y_j | X = x_i\} = \frac{P\{X = x_i, Y = y_j\}}{P\{X = x_i\}} = \frac{p_{ij}}{p_{i \cdot}}, \quad j = 1, 2, \dots$$

为在 $X = x_i$ 条件下随机变量 Y 的 **条件分布律**.

设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y)$, (X, Y) 关于 Y 的边缘概率密度为 $f_Y(y)$. 若对于固定的 y , $f_Y(y) > 0$, 则称 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在 $Y = y$ 的条件下 X 的 **条件概率密度**, 记为

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)},$$

类似地, 可以定义

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}.$$

3.4 相互独立的随机变量

设 $F(x, y)$ 及 $F_X(x), F_Y(y)$ 分别是二维随机变量 (X, Y) 的分布函数及边缘分布函数. 若对于所有 x, y 有

$$P\{X \leq x, Y \leq y\} = P\{X \leq x\}P\{Y \leq y\},$$

即

$$F(x, y) = F_X(x)F_Y(y),$$

则称随机变量 X 和 Y 是相互独立的.

定理: 设 (X_1, X_2, \dots, X_n) 和 (Y_1, Y_2, \dots, Y_n) 相互独立, 则 $X_i (i = 1, 2, \dots, m)$ 和 $Y_j (j = 1, 2, \dots, n)$ 相互独立. 又若 h, g 是连续函数, 则 $g(X_1, X_2, \dots, X_m)$ 和 $g(Y_1, Y_2, \dots, Y_n)$ 相互独立.

4 第四章 随机变量的数字特征

4.1 数学期望

设离散型随机变量 X 的分布律为

$$P\{X = x_k\} = p_k \quad k = 1, 2, \dots$$

若级数

$$\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$$

绝对收敛, 则称级数 $\sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k$ 的和为随机变量 X 的 **数学期望**, 记为 $E(X)$. 即

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} x_k p_k.$$

设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, 若积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

绝对收敛, 则称积分 $\int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$ 的值为随机变量 X 的 **数学期望**, 记为 $E(X)$. 即

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx.$$

数学期望简称 **期望**, 又称 **均值**.

性质: 1. 设 C 是常数, 则有 $E(C) = C$.

2. 设 X 是随机变量, C 是常数, 则有

$$E(CX) = CE(X).$$

3. 设 X, Y 是两个随机变量, 则有

$$E(X + Y) = E(X) + E(Y).$$

这一性质可以推广到任意有限多个随机变量之和的情况.

4. 设 X, Y 是相互独立的随机变量, 则有

$$E(XY) = E(X)E(Y).$$

这一性质可以推广到任意有限个相互独立的随机变量之积的情况.

4.2 方差

设 X 是一个随机变量, 若 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 存在, 则称 $E\{[X - E(X)]^2\}$ 为 X 的 **方差**, 记为 $D(X)$ 或 $Var(X)$, 即

$$D(X) = Var(X) = E\{[X - E(X)]^2\}.$$

在应用上还引入量 $\sqrt{D(X)}$, 记为 $\sigma(X)$, 称为 **标准差**或 **均方差**.

性质: 1. 设 C 是常数, 则有 $E(C) = 0$.

2. 设 X 是随机变量, C 是常数, 则有

$$D(CX) = C^2 D(X),$$

$$D(X + C) = D(X).$$

3. 设 X, Y 是两个随机变量, 则有

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2E\{(X - E(X))(Y - E(Y))\}.$$

特别, 若 X, Y 相互独立, 则有

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y).$$

这一性质可以推广到任意有限多个相互独立的随机变量之和的情况.

4. $D(X) = 0$ 的充要条件是 X 以概率为 1 取常数 $E(X)$, 即

$$P\{X = E(X)\} = 1.$$

4.3 协方差及相关系数

量 $E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}$ 称为随机变量 X 与 Y 的 **协方差**, 记为 $Cov(X, Y)$, 即

$$Cov(X, Y) = E\{[X - E(X)][Y - E(Y)]\}.$$

而

$$\rho_{XY} = \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$$

称为随机变量 X 与 Y 的 **相关系数**.

由定义知

$$Cov(X, Y) = Cov(Y, X),$$

$$\text{Cov}(X, X) = D(X).$$

对于任意两个随机变量 X 和 Y ，下列等式成立：

$$D(X + Y) = D(X) + D(Y) + 2\text{Cov}(X, Y).$$

将 $\text{Cov}(X, Y)$ 的定义式展开，易得

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

我们常常利用这一式子计算协方差.

性质: 1. $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$, a, b 是常数.

2. $\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$.

定理: 1. $|\rho_{XY}| \leq 1$.

2. $|\rho_{XY}| = 1$ 的充要条件是，存在常数 a, b 使

$$P\{Y = a + bX\} = 1.$$

当 $|\rho_{XY}| = 1$ 时，称 X 和 Y **不相关**.

4.4 矩、协方差矩阵

设 X 和 Y 是随机变量，若

$$E(X^k), \quad k = 1, 2, \dots$$

存在，称它为 X 的 k **阶原点矩**，简称 k 阶矩. 若

$$E\{[X - E(X)]^k\}, \quad k = 2, 3, \dots$$

存在，称它为 X 的 k **阶中心矩**. 若

$$E(X^k Y^l), \quad k, l = 1, 2, \dots$$

存在，称它为 X 和 Y 的 $k + l$ **阶混合矩**. 若

$$E\{[X - E(X)]^k [Y - E(Y)]^l\}, \quad k, l = 1, 2, \dots$$

存在，称它为 X 和 Y 的 $k + l$ **阶混合中心矩**.

显然， X 的数学期望 $E(X)$ 是 X 的一阶原点矩，方差 $D(X)$ 是 X 的二阶中心矩，协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 是 X 和 Y 的二阶混合中心矩.

设 n 维随机变量 (X_1, X_2, \dots, X_n) 的二阶混合中心矩

$$c_{ij} = \text{Cov}(X_i, X_j) = E\{[X_i - E(X_i)][X_j - E(X_j)]\}, i, j = 1, 2, \dots, n$$

都存在, 则称矩阵

$$C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & c_{n2} & \cdots & c_{nn} \end{pmatrix}$$

为 n 维随机变量 (X_1, X_2, \dots, X_n) 的 **协方差矩阵**. 由于 $c_{ij} = c_{ji}$ ($i \neq j; i, j = 1, 2, \dots, n$), 因而上述矩阵是一个对阵矩阵.

5 第五章 大数定律及中心极限定理

5.1 大数定律

5.2 中心极限定理

6 第六章 样本及抽样分布

6.1 随机样本

6.2 直方图和箱线图

6.3 抽样分布

7 第七章 参数估计

7.1 点估计

7.2 基于截尾样本的最大似然估计

7.3 估计量的评选标准

7.4 区间估计

7.5 正态总体均值与方差的区间估计

7.6 (0-1) 分布参数的区间估计

7.7 单侧置信区间